



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 ESCUELA DE INGENIERÍA
 DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC1253 — Matemáticas Discretas — 1' 2019

Tarea 2 – Respuesta Pregunta 2

Sea \mathcal{I} una interpretación tal que:

- $\mathcal{I}(\text{dom})$ es finito, con más de un elemento
 $\mathcal{I}(=)$ x es igual a y
 $\mathcal{I}(<)$ si x es par entonces y es impar
 con x y y el elemento previo y posterior al operador, respectivamente, ámbos dentro de $\mathcal{I}(\text{dom})$

Tenemos que φ comprende las siguientes oraciones:

1. $\varphi_1 := (\forall x. \neg(x < x)) \wedge (\forall x. \exists y. x < y)$

Se tiene que $x < x$ es falso en cualquier caso (x sólo puede ser par o impar, no ámbos), por lo que $\forall x. \neg(x < x)$ es verdadero.

Por otro lado, se tiene que $\forall x. \exists y. x < y$ es verdadero dado que si x es impar, $x < y$ es verdadero, y si x es par, siempre habrá un y impar en el dominio.

2. $\varphi_2 := (\forall x. \neg(x < x)) \wedge (\forall x. \exists y. x < y) \wedge (\forall x. \forall y. (x < y \rightarrow \neg(y < x)))$

Se tiene que si x es impar, $\forall x. \forall y. (x < y \rightarrow \neg(y < x))$ será verdadero. Si x es par y y es par, también será verdadero.

Si x es par y y impar, se tiene que $y < x$ es falso, por lo que $\neg(y < x)$ será verdadero y todo el predicado también lo será.

3. $\varphi_3 := (\forall x. \neg(x < x)) \wedge (\forall x. \exists y. x < y) \wedge (\forall x. \forall y. (x < y \rightarrow \neg(y < x))) \wedge (\exists x. \forall y. ((\neg(x = y)) \rightarrow x < y))$

Se tiene que si $\neg(x = y)$, es decir, x es distinto de y , entonces $x < y$. Esto es verdadero porque si y es par, cualquier valor impar para x satisface la oración, y si y es impar, cualquier valor par para x hace $x < y$ verdadero.

Por lo tanto, se puede concluir que $\mathcal{I} \models \varphi$.