```
Dd[fn_, n_, k_, s_] := Sum[(fn[m] ^ (k - j)) Binomial[k, j] Dd[fn, n / (m^ (k - j)), j, m + 1],
   {m, s, n^ (1 / k)}, {j, 0, k - 1}]
Dd[fn_, n_, 0, s_] := 1
dd[fn_, n_, k_] := Dd[fn, n, k, 2] - Dd[fn, n - 1, k, 2]
fulld[fn_, n_, k_, t_] := Sum[fn[j] Dd[fn, n / j, k - 1, 2], {j, t + 1, n^ (1 / 2)}] +
   Sum[Sum[fn[m], {m, Floor[n / (j + 1)] + 1, n / j}] Dd[fn, j, k - 1, 2],
    {j, 1, n / Floor[n^ (1 / 2)] - 1}] +
   Sum[dd[fn, j, k - 1] Sum[fn[m], {m, 2, n / j}], {j, 2, t}] +
   Sum[fn[s] dd[fn, j, m] Dd[fn, n / (j s), k - m - 1, 2],
    {j, 2, t}, {s, Floor[t / j] + 1, Floor[n / j] ^ (1 / 2)}, {m, 1, k - 2}] +
   Sum[(Sum[fn[m], {m, Floor[n / (j (s + 1))] + 1, n / (j s)}])
     (Sum[dd[fn, j, m] Dd[fn, s, k - m - 1, 2], {m, 1, k - 2}]),
    {j, 2, t}, {s, 1, Floor[n / j] / Floor[Floor[n / j] ^ (1 / 2)] - 1}]
fulld[fn_, n_, 1, t_] := Sum[fn[j], {j, 2, n}]


id[n_] := 1
Dd[ id, 1000, 3, 2]

11 217

fulld[ id, 1000, 3, 9]

11 217
```