explain-math example

Matthew Gleich

0.1 Basic Math Example

$$
\begin{aligned}
\text{Statement} :: \lbrace & -2(x+2) = 6 \\
\text{Distribute out -2} :: \begin{cases} (-2 \cdot x) + (-2 \cdot 2) = 6 \\ -2x - 4 = 6 \end{cases} \\
\text{Remove -4 from the left} :: \begin{cases} -2x - 4 + 4 = 6 + 4 \\ -2x = 10 \end{cases} \\
\text{Remove -2 from the left} :: \begin{cases} \frac{-2x}{-2} = \frac{10}{-2} \\ \frac{-2x}{-2} = \frac{10}{-2} \\ x = -5 \end{cases}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{gathered}
\ddots \downarrow \iddots \\
\textit{sol.} \\
x = -5
\end{gathered}
$$

0.2 Basic Physics Example

$$
\begin{aligned}
\text{Formula} :: \lbrace & p = mv \\
\text{Variables} :: \begin{cases} p = ?\ \text{kg}\ \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ m = 3.0\ \text{k.g} \\ v = 5.0\ \text{m/s East} \end{cases} \\
\text{Plug \& solve} :: \lbrace & p = 3 \cdot 5
\end{aligned}
$$

$$
\begin{gathered}
\ddots \downarrow \iddots \\
\textit{sol.} \\
p = 15\ \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}
\end{gathered}
$$