explain-math example

Matthew Gleich

0.1 Basic Math Example

$$\text{Initial Statement :: } \left\{ -2(x+2) = 6 \right.$$

$$\text{Distribute out -2 :: } \begin{cases} (-2 \cdot x) + (-2 \cdot 2) = 6 \\ -2x - 4 = 6 \end{cases}$$

$$\text{Remove -4 from the left :: } \begin{cases} -2x - 4 + 4 = 6 + 4 \\ -2x = 10 \end{cases}$$

$$\text{Remove -2 from the left :: } \begin{cases} \dfrac{-2x}{-2} = \dfrac{10}{-2} \\ \dfrac{-2x}{-2} = \dfrac{10}{-2} \\ x = -5 \end{cases}$$

$$\therefore \downarrow \cdot \cdot$$

$$sol.$$

$$x = -5$$

0.2 Basic Physics Example

$$\text{Initial Formula :: } \left\{ p = mv \right.$$

$$\text{Variables :: } \begin{cases} p = ? \text{ kg } \dfrac{\text{m}}{\text{s}} \\ m = 3.0 \text{ k.g} \\ v = 5.0 \text{ m/s East} \end{cases}$$

$$\text{Plug \& solve :: } \left\{ p = 3 \cdot 5 \right.$$

$$\therefore \downarrow \cdot \cdot$$

$$sol.$$

$$p = 15 \text{ kg} \cdot \dfrac{\text{m}}{\text{s}}$$