

Bearbeitete Aufgaben A7, A8, A9

10/10*30=30

A7

a)

(i)

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{5 + (-1)^n + \frac{1}{n} \sin n}{n^2} \\ \frac{5 - 1 + \frac{1}{n} \cdot (-1)}{n^2} &\leq a_n = \frac{5 + (-1)^n + \frac{1}{n} \sin n}{n^2} \leq \frac{5 + 1 + \frac{1}{n} \cdot 1}{n^2} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 - 1 + \frac{1}{n} \cdot (-1)}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{1}{n}}{n^2} = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + 1 + \frac{1}{n} \cdot 1}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6 + \frac{1}{n}}{n^2} = 0 \end{aligned}$$

Durch Einschachtelungskriterium folgt, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

(ii)

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{n}{n^2 + 1} \cdot \frac{5 \sin(2n) - 2 \sin(3n)}{6 + \cos(4n) - \cos(5n)} \\ \frac{n}{n^2 + 1} \cdot \frac{5 \cdot (-1) - 2 \cdot 1}{6 + (-1) - 1} &\leq b_n = \frac{n}{n^2 + 1} \cdot \frac{5 \sin(2n) - 2 \sin(3n)}{6 + \cos(4n) - \cos(5n)} \leq \frac{n}{n^2 + 1} \cdot \frac{5 \cdot 1 - 2 \cdot (-1)}{6 + (-1) - 1} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2 + 1} \cdot \frac{5 \cdot (-1) - 2 \cdot 1}{6 + (-1) - 1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{n + \frac{1}{n}} \cdot \frac{-7}{4} = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2 + 1} \cdot \frac{5 \cdot 1 - 2 \cdot (-1)}{6 + (-1) - 1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{n + \frac{1}{n}} \cdot \frac{7}{4} = 0 \end{aligned}$$

Durch Einschachtelungskriterium folgt, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

b)

(i)

$$\begin{aligned} M &= \{0, +\infty\} \\ \limsup_n a_n &= +\infty \\ \liminf_n a_n &= 0 \end{aligned}$$

(ii)

$$M = \{-1, 1\}$$

$$\limsup_n a_n = 1$$

$$\liminf_n a_n = -1$$

(iii)

$$M = \{+\infty\}$$

$$\limsup_n a_n = +\infty$$

$$\liminf_n a_n = +\infty$$

(iv)

q	$-\infty < q < -1$	$q = -1$	$-1 < q < 1$	$q = 1$	$1 < q < +\infty$
M	$\{-\infty, +\infty\}$	$\{-1, 1\}$	$\{0\}$	$\{1\}$	$\{+\infty\}$
\limsup_n	$+\infty$	1	0	1	$+\infty$
\liminf_n	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$

A8

a)

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{2+k} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{2+k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{2}{k} + 1} = 1 \quad \checkmark$$

Da die Folge a_k gegen 1 konvergiert und somit keine Nullfolge ist, kann nach dem Divergenzkriterium die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{2+k}$ nur divergieren. \checkmark

b)

$$\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{k-1}{3k^2+2k} \right)^{\frac{k}{2}}$$

Wurzelkriterium, 2. Version: $\sqrt[k]{\left| \left(\frac{k-1}{3k^2+2k} \right)^{\frac{k}{2}} \right|} = \sqrt[k]{\left(\frac{k-1}{3k^2+2k} \right)^{\frac{k}{2}}} = \sqrt{\frac{k-1}{3k^2+2k}} = \frac{\sqrt{k-1}}{\sqrt{3k^2+2k}} \quad \checkmark$

$$= \frac{\sqrt{\frac{1}{k} - \frac{1}{k^2}}}{\sqrt{3 + \frac{2}{k}}} \xrightarrow{(k \rightarrow \infty)} 0 \quad \checkmark$$

Da $\sqrt[k]{|a_k|}$ gegen 0 konvergiert und $0 < 1$, ist die Reihe $\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{k-1}{3k^2+2k} \right)^{\frac{k}{2}}$ nach dem Wurzelkriterium 2. Version absolut konvergent. ✓

c)

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin k}{k^k}$$

Wurzelkriterium 2. Version:

$$0 \leq \sqrt[k]{\left| \frac{\sin k}{k^k} \right|} = \sqrt[k]{\frac{|\sin k|}{|k^k|}} = \frac{\sqrt[k]{|\sin k|}}{\sqrt[k]{k^k}} = \frac{\sqrt[k]{|\sin k|}}{k} \stackrel{(k \rightarrow \infty)}{\rightarrow} 0$$

Da $\sqrt[k]{\left| \frac{\sin k}{k^k} \right|}$ nach dem Einschachtelungskriterium gegen 0 konvergiert und $0 < 1$, ist die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin k}{k^k}$ nach dem Wurzelkriterium 2. Version absolut konvergent. ✓

d)

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k+2} - \sqrt{k-1}}{2^k} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\sqrt{k+2} - \sqrt{k-1})(\sqrt{k+2} + \sqrt{k-1})}{2^k \cdot (\sqrt{k+2} + \sqrt{k-1})} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+2 - k+1}{2^k \cdot (\sqrt{k+2} + \sqrt{k-1})} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{2^k \cdot (\sqrt{k+2} + \sqrt{k-1})} \end{aligned}$$

Quotientenkriterium 1. Version:

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| &= \left| \frac{\frac{3}{2^{k+1} \cdot (\sqrt{k+3} + \sqrt{k})}}{\frac{3}{2^k \cdot (\sqrt{k+2} + \sqrt{k-1})}} \right| = \left| \frac{2^k \cdot (\sqrt{k+2} + \sqrt{k-1})}{2^{k+1} \cdot (\sqrt{k+3} + \sqrt{k})} \right| = \left| \frac{2^k \cdot (\sqrt{k+2} + \sqrt{k-1})}{2^k \cdot 2 \cdot (\sqrt{k+3} + \sqrt{k})} \right| \\ &= \frac{\sqrt{k+2} + \sqrt{k-1}}{2 \cdot (\sqrt{k+3} + \sqrt{k})} \stackrel{✓}{\leq} \frac{\sqrt{k+2} + \sqrt{k}}{2 \cdot (\sqrt{k+2} + \sqrt{k})} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Da $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| < \frac{1}{2} < 1$ gilt, ist die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k+2} - \sqrt{k-1}}{2^k}$ nach dem Quotientenkriterium 1. Version absolut konvergent. ✓

A9

a)

(i)

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{4k+3}{3k^2-4} \quad a_k = \frac{4k+3}{3k^2-4} \geq \frac{4k}{3k^2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{k} \geq \frac{1}{k}$$

Die Reihe $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{4k+3}{3k^2-4}$ ist divergent, da zu dieser Reihe die Harmonische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ eine divergente Minorante ist.

(ii)

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4k^2+3}{3k^2-4}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4k^2+3}{3k^2-4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 + \frac{3}{k^2}}{3 - \frac{4}{k^2}} = \frac{3}{4}$$

Da die Folge $(a_k)_{k \in \mathbb{N}_0} = \left(\frac{4k^2+3}{3k^2-4} \right)_{k \in \mathbb{N}_0}$ gegen $\frac{3}{4}$ konvergiert und $\frac{3}{4} \neq 0$, ist die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4k^2+3}{3k^2-4}$ nach dem Divergenzkriterium divergent.

(iii)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} \quad a_k = \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{1}{k} \geq 0$$

Da die Harmonische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ eine divergente Minorante zur Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ ist, ist diese Reihe ebenfalls divergent.

b)

(i) Satz aus der Vorlesung: Jede beschränkte Folge hat (mindestens) einen Häufungspunkt.

(1.) $a_n = \sin n$ ist beschränkt ($\sin x \in [-1, 1]$) und muss somit mindestens einen Häufungspunkt haben.

(2.) $b_n = \sin n^2$ ist beschränkt ($\sin x \in [-1, 1]$) und muss somit mindestens einen Häufungspunkt haben.

(3.) $c_n = \frac{\sin n}{n}$ ist beschränkt ($\sin x \in [-1, 1] \rightsquigarrow \frac{-1}{1} = -1 \leq c_n = \frac{\sin n}{n} \leq 1 = \frac{1}{1}$) und muss somit mindestens einen Häufungspunkt haben.

(ii) Der Häufungspunkt für $c_n = \frac{\sin n}{n}$ ist 0. Für diese Folge ist das am einfachsten, da die anderen beiden Folgen mehr Häufungspunkte haben.