

# Notes on NEWUOA

Zaikun Zhang \*

June 7, 2021 7pm

---

**Algorithm 0.1**

<sup>?(alg:newuoa)?</sup>Input  $\Delta_0 \in (0, +\infty)$ ,  $m \in \{n+2, n+3, \dots, (n+1)(n+2)/2\}$ , and  $\mathcal{X}_0 \subset \mathbb{R}^n$  with  $x_0 \in \mathcal{X}_0$  and  $|\mathcal{X}_0| = m$ . Set  $Q_{-1} = 0$  and  $k = 0$ .

1.  $Q_k = \operatorname{argmin}\{\|\nabla^2 Q - \nabla^2 Q_{k-1}\|_{\mathbb{F}} : Q \in \mathcal{Q} \text{ and } Q(x) = f(x) \text{ for } x \in \mathcal{X}_k\}$ .
  2.  $x_k = \operatorname{argmin}\{f(x) : x \in \mathcal{X}_k\}$ ,  $x_k^+ = \operatorname{argmin}\{Q_k(x) : \|x - x_k\| \leq \Delta_k\}$ .
  3.  $\rho_k = [f(x_k) - f(x_k^+)]/[Q_k(x_k) - Q_k(x_k^+)]$ ; update  $\Delta_k$  according to  $\rho_k$ .
  4.  $x_k^- = \operatorname{argmin}\{K(\mathcal{X}_k \cup \{x_k^+\} \setminus \{x_k\}) : x \in \mathcal{X}_k\}$
- 

---

\*Hong Kong Polytechnic University, [zaikun.zhang@polyu.edu.hk](mailto:zaikun.zhang@polyu.edu.hk)