

Notes on NEWUOA

Zaikun Zhang *

June 8, 2021 1:07pm

Algorithm 0.1

^{?(alg:newuoa)?}Input $\Delta_0 \in (0, +\infty)$, $m \in \{n+2, n+3, \dots, (n+1)(n+2)/2\}$, and $\mathcal{X}_0 \subset \mathbb{R}^n$ with $x_0 \in \mathcal{X}_0$ and $|\mathcal{X}_0| = m$. Set $Q_{-1} = 0$ and $k = 0$.

- 1: $Q_k = \operatorname{argmin}\{\|\nabla^2 Q - \nabla^2 Q_{k-1}\|_F : Q \in \mathcal{Q} \text{ and } Q(x) = f(x) \text{ for } x \in \mathcal{X}_k\}$
 - 2: $x_k = \operatorname{argmin}\{f(x) : x \in \mathcal{X}_k\}$
 - 3: $x_k^+ = \operatorname{argmin}\{Q_k(x) : \|x - x_k\| \leq \Delta_k\}$
 - 4: **if** $\|x_k^+ - x_k\| \geq \eta\Delta_k$ **then**
 - 5: $x_k^- = \operatorname{argmin}\{\kappa(\mathcal{X}_k, x_k^+, x) : x \in \mathcal{X}_k \setminus \{x_k\}\}$
 - 6: $\kappa_k = \kappa(\mathcal{X}_k, x_k^+, x_k^-)$
 - 7: $\rho_k = [f(x_k) - f(x_k^+)]/[Q_k(x_k) - Q_k(x_k^+)]$
 - 8: Update Δ_k to Δ_{k+1} according to ρ_k
 - 9: **else**
 - 10: $\kappa_k = \infty$
 - 11: $\rho_k = -\infty$
 - 12: $\Delta_{k+1} = \theta\Delta_k$
 - 13: **end if**
 - 14: If $\rho_k > 0$ or $\kappa_k < \kappa_0$, then set $\mathcal{X}_{k+1} = \mathcal{X}_k \cup \{x_k^+\} \setminus \{x_k^-\}$. Otherwise, set $y_k^- = \operatorname{argmax}\{\|y - x_k\| : y \in \mathcal{X}_k\}$, $y_k^+ = \operatorname{argmin}\{\kappa(\mathcal{X}_k, y, y_k^-) : \|y - x_k\| \leq \Delta_k\}$, and $\mathcal{X}_{k+1} = \mathcal{X}_k \cup \{y_k^+\} \setminus \{y_k^-\}$. Increment k . Go to Step 1.
-

How to terminate? Is $\|\nabla Q_k(x_k)\| \leq \eta\Delta_k$ attainable? What about $\|\nabla Q_k(x_k)\| \leq \epsilon$?
What about $\|x_k^+ - x_k\| \leq \eta\Delta_k$?

*Hong Kong Polytechnic University, zaikun.zhang@polyu.edu.hk