

Notes on NEWUOA

Zaikun Zhang *

June 7, 2021 9:59pm

Algorithm 0.1

^{?(alg:newuoa)?}Input $\Delta_0 \in (0, +\infty)$, $m \in \{n+2, n+3, \dots, (n+1)(n+2)/2\}$, and $\mathcal{X}_0 \subset \mathbb{R}^n$ with $x_0 \in \mathcal{X}_0$ and $|\mathcal{X}_0| = m$. Set $Q_{-1} = 0$ and $k = 0$.

1. $Q_k = \operatorname{argmin}\{\|\nabla^2 Q - \nabla^2 Q_{k-1}\|_F : Q \in \mathcal{Q} \text{ and } Q(x) = f(x) \text{ for } x \in \mathcal{X}_k\}$.
 2. $x_k = \operatorname{argmin}\{f(x) : x \in \mathcal{X}_k\}$
 3. $x_k^+ = \operatorname{argmin}\{Q_k(x) : \|x - x_k\| \leq \Delta_k\}$, $x_k^- = \operatorname{argmin}\{\kappa(\mathcal{X}_k, x_k^+, x) : x \in \mathcal{X}_k \setminus \{x_k\}\}$
 4. $\rho_k = [f(x_k) - f(x_k^+)]/[Q_k(x_k) - Q_k(x_k^+)]$; update Δ_k according to ρ_k .
 5. If $\rho_k > \eta$ or $\kappa(\mathcal{X}_k, x_k^+, x_k^-) < \kappa_0$, then set $\mathcal{X}_{k+1} = \mathcal{X}_k \cup \{x_k^+\} \setminus \{x_k^-\}$. Otherwise, set $y_k^- = \operatorname{argmax}\{\|y - x_k\| : y \in \mathcal{X}_k\}$, $y_k^+ = \operatorname{argmin}\{\kappa(\mathcal{X}_k, y, y_k^-) : \|y - x_k\| \leq \bar{\Delta}_k\}$, and $\mathcal{X}_{k+1} = \mathcal{X}_k \cup \{y_k^+\} \setminus \{y_k^-\}$. Increment k . Go to Step 1.
-

*Hong Kong Polytechnic University, zaikun.zhang@polyu.edu.hk