Tyron

BIOESTIMULANTE ARRANCADOR **LÍQUIDO**

TYRON, es un bioestimulante formulado esencialmente para proveer de nutrientes y estimular el crecimiento de raíces en cultivos de siembra directa o en trasplantes de plantas provenientes de almácigo o invernaderos, logrando un crecimiento más rápido y vigoroso y un mejor establecimiento en campo. Se recomienda sea aplicado en el riego, en Drench y puede aplicarse vía foliar.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL		
INGREDIENTES ACTIVOS		% P/P
EXTRACTOS DE ORIGEN VEGETAL		30.00 %
ÁCIDOS FÚLVICOS		4.00 %
ZINC	COMO Zn	5.00 %
L-AMINOÁCIDOS		3.00 %
INOSITOL		0.50 %
INGREDIENTES INERTES		
ACONDICIONADORES Y DILUYENTES		57.50 %
TOTAL		100.00%

RECOMENDACIONES PARA SU USO

Para obtener resultados óptimos con **TYRON**, es recomendable que se aplique en los últimos 15 minutos de riego y si se aplica vía foliar lograr un buen cubrimiento de la superficie foliar utilizando un coadyuvante, para acondicionar la solución antes de su aplicación. Puede aplicarse hasta el día de su cosecha, asimismo no existe un periodo de reingreso al área tratada.

FITOTÓXICIDAD

TYRON, no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas.

PRESENTACIONES

225 ml

1 L



4 L

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

	CULTIVO	DOSIS L/Ha.	ÉPOCA DE APLICACIÓN
	Calabaza, Melón, Pepino y Sandía	0.25 - 1	1a. En el primer riego después de emergencia. 2a. 15 días después del primero. 3a. 15 días después del segundo.
	Cebolla	1 - 2	1a. En el primer riego después de emergencia. 2a. 15 días después del primero.
	Cítricos	2 - 3	1a. En el primer riego después de la plantación. 2a. 30 días después del primero. 3a. En primer riego de pos brotación.
	Ají, Pimientos y Tomate (Jitomate)	0.5 - 2	1a. En el primer riego después del trasplante. 2a. 15 días después del primero. 3a. 15 días después del segundo.
	Flores (Rosal y Clavel)	2 - 3	1a. En el primer riego después de la siembra. 2a. 30 días después del primero. 3a. Aplicar después de los picos de producción.
	Fresa	1 - 2	1a. En primer riego después de trasplante. 2a. 15 días después del primero.
	Papa	1 - 2	1a. Asperjar la semilla al momento de la siembra.
	Uva de mesa	2 - 3	1a. En el primer riego después de la plantación. 2a. 30 días después del primero. 3a. En primer riego de pos brotación.
	Banano	1 - 3	1a. Después del trasplante. 2a. Inicio de desarrollo del hijuelo (aplicación media luna). 3a. Aplicar en mezcla con el Nematicida y/o cuando se tengan problemas de nematodos en raíz.
	Arroz	1 - 2	1a. Inicio del macollamiento.
	Cacao	1 - 3	1a. Inicio del desarrollo de raíces. 2a. En prefloración.

REG. MAG.: 034382388
Categoría toxicológica IV (Ligeramente Tóxico)
V 0.1

QUIMICA SAGAL
Carretera Villa de García Km. 5 Tels: (81) 8335-2802
y (81) 8335-2742 FAX: (81) 8378-4014 A.P. 2062
C.P. 64000 Monterrey, N.L. México. sagal@intercable.net