Sagaquel MANGANESO

FERTILIZANTE MULTIQUELATADO LÍQUIDO

LÍQUIDO

SAGAQUEL MANGANESO es un fertilizante foliar y radicular líquido multiquelatado de manganeso de muy alta concentración que ha sido especialmente formulado para prevenir y corregir rápidamente las deficiencias de este elemento en los cultivos hortícolas, frutales, extensivos, ornamentales y forrajeros. Por su formulación ultra soluble a base de un complejo de varios agentes quelatantes y su alta concentración **SAGAQUEL MANGANESO** puede aplicarse vía foliar, así como también en forma radicular en los suelos con un pH ácido y neutro, a través de los sistemas de riego por goteo, cintilla, etc. obteniéndose una inmediata absorción y aprovechamiento del producto por la planta.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO		
Manganeso (Mn)	**No menos de**	**4.00%**
(4% Quelato de Manganeso)		
Agentes Quelatantes		
(EDTA, Ácidos Húmicos, Hectogluconato)		
INGREDIENTES INERTES		
Diluyentes y Acondicionadores	**No más de**	**96.00%**
TOTAL		**100.00%**

RECOMENDACIONES PARA SU USO

SAGAQUEL MANGANESO se puede aplicar durante todo el ciclo de vida de los cultivos hasta el día de la cosecha. Se recomienda aplicar las dosis bajas de **SAGAQUEL MANGANESO** cuando se realicen aplicaciones preventivas y las dosis altas cuando se realicen aplicaciones correctivas. Para obtener resultados óptimos cuando se aplica **SAGAQUEL MANGANESO** vía foliar es recomendable lograr un mejor cubrimiento de la superficie foliar utilizando un coadyuvante, para acondicionar el agua antes de su aplicación agregando después **SAGAQUEL MANGANESO** y los demás agroquímicos manteniendo una agitación constante.

FITOTÓXICIDAD

SAGAQUEL MANGANESO, no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas.

PRESENTACIONES

1 L



4 L

MICRONUTRIENTES MULTIQUELATADOS

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

	CULTIVO	DOSIS L/Ha.	ÉPOCA DE APLICACIÓN
	Cereales: Trigo, Arroz, Sorgo, Cebada y Avena	1 - 2	1a. Inicio de desarrollo vegetativo. 2a. Inicio de formación de grano. 3a. Subsecuentes cuando haya deficiencia.
	Pepino, Melón, Calabaza y Sandia	1 - 2	1a. 20 a 25 días después de siembra o trasplante. 2a. Inicio de desarrollo de fruta. 3a. Después del primer corte. 4a. Subsecuentes cuando haya deficiencias.
	Papa y otros tubérculos	1 - 3	1a. 20 días después del transplante. 2a. Antes de tuberizar.
	Tomate y Ají	1 - 2	1a. 20 a 25 días después del trasplante. 2a. Inicio de desarrollo de frutos. 3a. Después del primer corte. 4a. Subsecuentes cuando haya deficiencia.
	Cítricos: Limón, Toronja, Naranja, etc.	3 - 5 cc / L de agua	1a. Al inicio del rebrote de hojas. 2a. En pleno crecimiento vegetativo. 3a. Al crecimiento del fruto. 4a. Subsecuentes cuando haya deficiencia.
	Vid, Manzano, Durazno, Peral, Aguacate, Nogal y Palma Africana	3 - 5 cc / L de agua	1a. Inicio de rebrote de hojas. 2a. En pleno desarrollo vegetativo. 3a. Subsecuente cuando haya deficiencia.
	Soya y Frejol	1 - 2	1a. 15 a 20 días después de emergencia. 2a. Inicio de formación de vainas. 3a. Subsecuente cuando sea necesario.
	Papayo	1 - 3	1a. 20 días después del transplante. 2a. 20 días después. 3a. Inicio de crecimiento del fruto (cada fructificación). 4a. Después de cada corte y/o cuando haya deficiencias nutricionales.
	Banano	2 - 3	En plantilla aplicar sobre el follaje y a la raíz. En plantación establecida aplicar al hijuelo y la zona de raíces, siguiente a los 30 días de la primera.
	Cacao	2 - 3	1a. Aplicar en pleno desarrollo del área foliar. 2a. Repetir a los 21 días.
	Piña	4 - 5	1a. Inicio del desarrollo de Hojas. 2a. Repetir a los 28 días después. 3a. Prefloración.
	Ornamentales: Rosa, Crisantemo y Clavel	1 - 2	1a. Al inicio del rebrote de hojas. 2a. 10 a 15 días después. 3a. Subsecuentes cuando haya deficiencia.
	Café	1 - 2	Aplicar al inicio del crecimiento vegetativo. Repetir cuando se presenten deficiencias.
	Fresa	1 - 2	1a. Aplicar después de cada corte.

NOTA: Considerar las dosis bajas cuando área foliar y edad son menores y dosis altas cuando área foliar y edad de la planta es mayor. APLICACIONES AL SUELO EN EL AGUA DE RIEGO EN LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADOS (goteo, micro aspersión y aspersión) O AGUA RODADA. Aplicar 6 a 10 litros por hectárea dependiendo del cultivo, condiciones del suelo, edad y grado de deficiencia.

REG. MAG.: 03438389
Categoría toxicológica IV (Ligeramente Tóxico)
V 0.1

QUIMICA SAGAL
Carretera Villa de García Km. 5 Tels: (81) 8335-2802
y (81) 8335-2742 FAX: (81) 8378-4014 A.P. 2062
C.P. 64000 Monterrey, N.L. México. sagal@intercable.net