Algavit 5x

INFORMACIÓN GENERAL

ALGAVIT 5x, es un extracto concentrado de algas marinas, 100% orgánico a base de **5 distintas algas marinas: Sargassum** (rica en ácido algínico), **Laminaria y Egregia** (ricas en macronutrientes y micronutrientes) **Ascophyllum nodosum** (rica en hormonas naturales y materia orgánica) y **Macrocystis** (aporta bioactivadores metabólicos). Su formulación única de 5 algas marinas aporta en forma natural aminoácidos, además de aportar macro y micro elementos. Actúa estimulando el metabolismo de las plantas y equilibra sus funciones fisiológicas a nivel de la célula de manera integral desarrollando su potencial productivo al máximo frente a estrés ambiental y otros factores.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	
EXTRACTOS DE ALGAS MARINAS: 5 Extractos (Ascophyllum Nodosum, Sargassum, Laminaria, Egregia, y Macrocystis)	65 g/litro
AMINOÁCIDOS TOTALES	5.5%P/V
NITRÓGENO como (N)	81 g/litro
FÓSFORO asimilable P2O5	80 g/litro
POTASIO asimilable K2O	82 g/litro
ZINC como (Zn)	600mg/litro
MANGANESO como (Mn)	210mg/litro
BORO como (B)	200mg/litro
MOLIBDENO como (Mo)	160mg/litro

RECOMENDACIONES PARA SU USO

Para obtener resultados óptimos con **ALGAVIT 5x,** es recomendable lograr un mejor cubrimiento de la superficie foliar utilizando un coadyuvante, para acondicionar la solución antes de su aplicación. Puede aplicarse hasta el día de la cosecha, así mismo no existe un periodo de reingreso al área tratada.

FITOTOXICIDAD

ALGAVIT 5x, no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD

ALGAVIT 5x, es incompatible con productos alcalinos (pH>8) aceites y productos extremadamente ácidos. **ALGAVIT 5x,** trabaja mejor en pH neutros (6.5-7).

PRESENTACIONES

500ml

1L



4L

DOSIS POR CULTIVOS

CULTIVO	DOSIS	DESCARGA DE AGUA/HA	EPOCA DE APLICACIÓN	VÍA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Banano (*Musa acuminata AAA*)	2 l/ha	200 l/ha	Inicio del rebrote de los hijos, en prefloración	2 - 3 aplicaciones foliares
Tomate riñón *(Solanum lycopersicum)*	2 l/ha	200 l/ha	15 días del trasplante, en prefloración y crecimiento del fruto	2 - 3 aplicaciones foliares
Melón (*Cucumis melo*)	1 l/ha	200 l/ha	Inicio de floración, en cuajado y crecimiento del fruto	2 - 3 aplicaciones foliares
Limón - Naranja (*Citrus sp.*)	2 l/ha	400 l/ha	En prefloración, caída de pétalos, en crecimiento del fruto	3 - 4 aplicaciones foliares
Piña (*Ananas comosus*)	2 l/ha	400 l/ha	40 - 50 días después del trasplante, en prefloración	2 - 3 aplicaciones foliares
Cacao (*Theobroma cacao L)*			Durante el desarrollo del fruto	
Cebolla (*Allium cepa*)	1 l/ha	400 l/ha	4 - 6 hojas, repetir cada 15 días dos veces más	2 - 3 aplicaciones foliares
Papa (*Solanum tuberosum*)	2 l/ha	400 l/ha	25 - 30 días de la nacencia, formación y crecimiento de tubérculos	2 - 3 aplicaciones foliares
Brócoli *(Brassica oleracea var. italica)*	2 l/ha	200 l/ha	10 días después de la emergencia, inicio de la formación de la pella	2 - 3 aplicaciones foliares
Arveja (*Pisum sativum*)	1,5 l/ha	400 l/ha	15 días después de la germinación, en desarrollo de vainas	2 - 3 aplicaciones foliares
Arroz (*Oryza sativa*)	1 l/ha	200 l/ha	En pleno macollamiento, 15 días después	2 - 3 aplicaciones foliares
Uva (*Vitis vinifera*)	1 l/ha	400 l/ha	En prefloración, inicio de desarrollo de la baya	2 - 3 aplicaciones foliares
Fresa (*Fragaria vesca*)	1,5 l/ha	400 l/ha	30 - 40 días después del trasplante, inicio de la floración	2 aplicaciones foliares
Caña de azúcar (*Saccharum officinarum*)	1 l/ha	200 l/ha	Inicio de rebrote, crecimiento activo,	3 - 4 aplicaciones foliares
Rosas *(Rosa sp)*	2 ml/l	1500 l/ha	Brotación de plantas	3 - 4 aplicaciones foliares
	de agua		15 días después	
Palma africana (*Elaeis guinensis)*	2 l/ha	200 l/ha	40 - 50 días después del trasplante, en prefloración	3 - 4 aplicaciones foliares