Orofos Calcio

Tecnología Anti OX

FOSFITO ACTIVADO DE RÁPIDA ASIMILACIÓN

LÍQUIDO

OROFOS CALCIO, es un fertilizante concentrado que además de calcio contiene el fósforo en forma de ion fosfito de alta asimilación, por lo que además de nutrir, estimula la síntesis de fitoalexinas dando mayor resistencia a las plantas contra enfermedades fungosas, incrementa la asimilación y transporte de calcio en la planta. Interviene en los procesos de floración y cuajado de fruto. Desarrollado con la más avanzada tecnología antioxidante (**ANTI-OX**) propiedad de **QUÍMICA SAGAL** garantizamos su máxima eficiencia y la más alta calidad de fosfito en el mercado. **OROFOS CALCIO** corrige desordenes nutricionales provocados por la falta de calcio, en cultivos: depresión amarga en manzana ***(Bitter Pit)***, pudrición apical de fruto en tomate, chile, sandía ***(Blossom end rot)***, quemado de bordes en lechuga ***(Tip Burn)***, rajado en nectarina y naranja ***(Craking)***. **OROFOS CALCIO** tiene la ventaja de incorporarle a las plantas el fósforo en forma de ion fosfito, el cual tiene un átomo menos que los Fosfatos por lo que la asimilación del fosfito (**PO_3**) es más eficiente y rápida. Dando mayor consistencia a los frutos y alargando su vida de anaquel.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

			% P/V
INGREDIENTES ACTIVOS			
FÓSFORO DISPONIBLE	COMO P_2O_5	No menos de	18.50
CALCIO DISPONIBLE	COMO Ca	No menos de	5.80
INGREDIENTES INERTES			
PENETRANTES, DILUYENTES Y ACONDICIONADORES		No más de	75.70
TOTAL			100.00

RECOMENDACIONES PARA SU USO

Para obtener resultados óptimos de **OROFOS CALCIO**, es recomendable lograr un mejor cubrimiento de la superficie foliar utilizando un coadyuvante, para acondicionar la solución antes de su aplicación. Puede aplicarse hasta el día de la cosecha, así mismo no existe un período de reingreso al área tratada.

FITOTÓXICIDAD

OROFOS CALCIO, no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas.

PRESENTACIONES

500 ml

1 L



4 L

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

	CULTIVO	DOSIS L/Ha.	ÉPOCA DE APLICACIÓN
	HORTÍCOLAS (HOJA): Lechuga, Col, Repollo, etc.	1 a 3	1a. Inicio de desarrollo del cultivo. 2a. Al incremento activo de hojas. 3a. Subsecuentes cuando haya deficiencias y/o déficit de desarrollo.
	HORTÍCOLAS (FRUTO): Tomate, Ají, Melón, Sandía, etc.	1 a 3	1a. Al inicio de la floración. 2a. Al inicio del crecimiento del fruto. 3a. En pleno crecimiento del fruto. 4a. Subsecuentes cuando haya deficiencias y/o déficit de desarrollo.
	Naranja y Limón	2 a 3	1a. En prefloración. 2a. En inicio del desarrollo del fruto. 4a. Subsecuentes hasta el cambio de color.
	FRUTALES: Manzana, Durazno, Nectarina, Papaya, etc.	2 a 3	1a. Al inicio de la floración. 2a. Al inicio del crecimiento del fruto. 3a. Subsecuentes cada 15 días.
	Banano	2 a 3	1a. Desarrollo de primeras hojas (planta madre e hijuelo). 2a. Prefloración.
	Cacao	1 a 3	1a. Prefloración. 2a. En floración. 3a. Cuajado de frutos.
	Frutilla	1 a 2	1a. En floración. 2a. En cuajado de frutos. 3a. Durante el desarrollo de frutos.
	Ornamentales	2 a 3 cc/L de agua	1a. Al inicio de la brotación. 2a. En desarrollo de Hojas.
	Naranjilla	1 a 3	1a. En prefloración. 2a. Inicio de cuajado de frutos. 3a. En Desarrollo de frutos.
	Café	1 a 3	1a. En Floración. 2a. En inicio de cuajado de frutos.
	Palma Africana	1 a 2	1a. Al inicio del desarrollo del fruto. 2a. Repetir a los 15 a 21 días después.
Fertirrigación		4 a 5 L/Ha. por aplicación, realizando de 2 a 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.	

REG. MAG.: 034381614
Categoría toxicológica IV (Ligeramente Tóxico)
V 0.1

QUIMICA SAGAL
Carretera Villa de García Km. 5 Tels: (81) 8335-2802
y (81) 8335-2742 FAX: (81) 8378-4014 A.P. 2062
C.P. 64000 Monterrey, N.L. México. sagal@intercable.net