QUIMICA SAGAL S.A. DE C.V.

STRESSO

INFORMACIÓN GENERAL

STRESSO, es un bioestimulante orgánico vegetal, formado a base de un derivado de la cisteína y ácido fólico que actúan en forma múltiple sobre los procesos fisiológicos de las plantas dando origen a cultivos vigorosos bien desarrollados, con capacidad de producir mejores rendimientos. **STRESSO,** estimula los procesos fisiológicos de los cultivos, la aplicación de **STRESSO** aumenta la producción de azúcares, proteínas y vitaminas, mejorando la calidad de las cosechas y por ser un producto orgánico puede aplicarse con absoluta seguridad en todos los cultivos incluyendo los de exportación. **STRESSO,** ayuda a que la planta aproveche mejor los elementos nutritivos que tienen disponibles como son los fertilizantes o abonos orgánicos aplicados al suelo por lo tanto **STRESSO** nunca debe confundirse con un fertilizante.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL		
INGREDIENTES ACTIVOS		
Derivado de la L-cisteina equivalente a 50 grs. de I.A. / L	No menos de	5.00%
Ácido Fólico equivalente a 2 grs. de I.A. / L	No menos de	0.20%
INGREDIENTES INERTES		
Coadyuvantes, adherentes y penetrantes	No más de	94.80%
TOTAL		100.00%

RECOMENDACIONES PARA SU USO

STRESSO, puede ser aplicado con mochilas de mano o de motor, tractores, turbonebulizadores o aviones, o en el agua de riego. Por ser un producto natural su manejo es sencillo e inocuo, sin embargo, se recomienda seguir las recomendaciones de manejo y almacenamiento de bioestimulante vegetal. Mezcle el **STRESSO** siempre al último.

FITOTOXICIDAD

STRESSO, no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD

STRESSO, es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares, fungicidas, insecticidas y herbicidas utilizados en la agricultura. Sin embargo, es recomendable realizar pruebas previas antes de utilizarlo en la práctica.

PRESENTACIONES

200ml

1L

DOSIS POR CULTIVO

CULTIVO	DOSIS	DESCARGA DE AGUA/HA	EPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Arroz (*Oryza sativa*)	200 cc/ha	200 l/ha	Al macollamiento, en suelos salinos y falta de desarrollo.	REALIZAR DE 2 - 3 APLICACIONES FOLIARES
Banano (*Musa acuminata AAA*)	200 cc/ha	200 l/ha	En situaciones de estrés y a la parición.	
Brócoli (*Brassica oleracea var. Italica)*	400 cc/ha	400 l/ha	7 días del trasplante, a la formación de la pella, al engrose.	
Ajo (*Allium sativum)*	400 cc/ha	200 l/ha	15 días del trasplante, 15 días después y en formación de bulbo.	
Cebolla (*Alliun cepa*)	400 cc/ha	200 l/ha	15 días del trasplante, 15 días después y en formación de bulbo.	
Fresa (*Fragaria vesca*)	400 cc/ha	200 l/ha	10 - 15 días del trasplante, en floración y luego de cada cosecha.	
Limón (*Citrus x limon*)	400 cc/ha	400 l/ha	En Prefloración, Floración y cuajado de frutos.	
Maíz (*Zea mayz*)	200 cc/ha	200 l/ha	A la 4 y 8 hoja verdadera.	
Mango (*Mangifera indica*)	400 cc/ha	400 l/ha	Realizar 3 aplicaciones cada 15 días durante la floración	
Melón (*Cucumis melo*)	400 cc/ha	200 l/ha	En Prefloración, Floración y crecimiento de frutos.	
Sandía (*Citrullus lanatus*)	400 cc/ha	200 l/ha	En Prefloración, Floración y crecimiento de frutos.	
Pepino (*Cucumis sativus*)	400 cc/ha	200 l/ha	En Prefloración, Floración y crecimiento de frutos.	
Papa (*Solanum tuberosum*)	500 cc/ha	600 l/ha	A la brotación, inicio de tuberización, crecimiento del tubérculo.	
Tomate (*Solanum lycopersicon*)	400 cc/ha	600 l/ha	20 días antes de la floración, en formación de frutos, después de cada corte	
Pimiento (*Capsicum annuum*)	400 cc/ha	600 l/ha	20 días antes de la floración, en formación de frutos, después de cada corte	
Tabaco (*Nicotiana tabacum*)	400 cc/ha	400 l/ha	20 - 25 días del trasplante.	
Rosa *(Rosas sp.)*	1,5 l/ha	1500 l/ha	En situaciones de estrés.	
Aguacate (*Persea americana*)	1 l/ha	600 l/ha	Al inicio de la floración, repetir cada 30 días.	