

Corso di Laurea in Informatica	Analisi Matematica	codice 456810 18 maggio 2022
--------------------------------	--------------------	---------------------------------

1. La derivata della funzione $f(x) = x^{(x^x)}$ è

- (a) $x^{(x^x+x)} \left((\log x)^2 + \log x + \frac{1}{x} \right)$ (b) $x^{(x^x-1)} x^x$
(c) $x^{(x^x)} \log x$ (d) $x^{(x^x)} (x^{x-1} \log x)$

Soluzione:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x^{(x^x)} = e^{x^x \log x} = e^{e^{x \log x} \cdot \log x} \\
 f'(x) &= e^{e^{x \log x} \cdot \log x} \cdot \left[e^{x \log x} \cdot \left(\log x + x \cdot \frac{1}{x} \right) \cdot \log x + e^{x \log x} \cdot \frac{1}{x} \right] = \\
 &= x^{(x^x)} \cdot \left[x^x (\log x + 1) \cdot \log x + x^x \cdot \frac{1}{x} \right] = \\
 &= x^{(x^x)} \cdot x^x \left(\log^2 x + \log x + \frac{1}{x} \right) = x^{(x^x+x)} \left(\log^2 x + \log x + \frac{1}{x} \right)
 \end{aligned}$$

2. La funzione $f: \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = \frac{\tan x}{x(1 + \tan^2 x)}$

- (a) non ha asintoti (b) ha due asintoti verticali (c) ha un asintoto verticale (d) ha un asintoto obliquo

Soluzione:

$$f: (0, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{\tan x}{x(1+\tan^2 x)}$$

Dato che il dominio di f è limitato, f può avere solo asintoti verticali.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{0}{0(1+0)} \quad \text{indeterminata}$$

$$\frac{\tan x}{x(1+\tan^2 x)} = \frac{x+o(x^2)}{x(1+o(1))} = \frac{x(1+o(1))}{x(1+o(1))} \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow 0^+$$

quindi non c'è asintoto per $x \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \frac{+\infty}{\frac{\pi}{2}(1+\infty)} \quad \text{indeterminata}$$

$$f(x) = \frac{\tan x}{x(1+\tan^2 x)} = \frac{1}{x\left(\frac{1}{\tan x} + \tan x\right)} \xrightarrow{\text{per } x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{1}{\frac{\pi}{2}\left(\frac{1}{+\infty} + +\infty\right)} = \frac{1}{\frac{\pi}{2}(0+\infty)} = 0$$

quindi non c'è asintoto neanche per $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$.

f non ha asintoti.

$$3. \int_1^e \frac{\cos(\arctan(\log x))}{x(1+(\log x)^2)} dx =$$

$$(a) \sin(\arctan e) - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$(b) \sin e - \sin 1$$

$$\blacktriangleright (c) \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$(d) \frac{\sqrt{2}}{4e} - 1$$

Soluzione:

$$\int \frac{\cos(\operatorname{arctg}(\log x))}{x(1+\log^2 x)} dx$$

sostituzione $\log x = t \quad \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$
 $\frac{dx}{x} = dt$

$$= \int \frac{\cos(\operatorname{arctg} t)}{1+t^2} dt$$

sostituzione $z = \operatorname{arctg} t \quad \frac{dz}{dt} = \frac{1}{1+t^2}$
 $\frac{dt}{1+t^2} = dz$

$$= \int \cos z \, dz = \sin z + c = \sin(\operatorname{arctg} t) + c = \sin(\operatorname{arctg}(\log x)) + c$$

$$\Rightarrow \int_1^e \frac{\cos(\operatorname{arctg}(\log x))}{x(1+\log^2 x)} dx = \left[\sin(\operatorname{arctg}(\log x)) \right]_1^e =$$

$$= \sin(\operatorname{arctg}(\log e)) - \sin(\operatorname{arctg}(\log 1)) =$$

$$= \sin(\operatorname{arctg} 1) - \sin(\operatorname{arctg} 0) = \sin \frac{\pi}{4} - \sin 0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

4. $\int_0^\pi 3x \cos x \, dx =$

(a) π

(b) $\frac{3}{2}$

► (c) -6

(d) 0

Soluzione:

$$\int 3x \cos x \, dx$$

integrando per parti derivando x
e integrando $\cos x$

$$= 3 \int x \cos x \, dx = 3 \left(x \sin x - \int 1 \cdot \sin x \, dx \right) =$$

$$= 3(x \sin x + \cos x) + c$$

$$\Rightarrow \int_0^\pi 3x \cos x \, dx = \left[3(x \sin x + \cos x) \right]_0^\pi = 3(\pi \cdot \sin \pi + \cos \pi)$$

$$- 3(0 \cdot \sin 0 + \cos 0) = 3(-1) - 3 \cdot 1 = -6$$

5. $\int_{-1}^2 \frac{e^x - \cos x}{x \sin x} dx$

(a) converge

► (b) non esiste

(c) diverge negativamente

(d) diverge positivamente

Soluzione:

$$\int_{-1}^2 \frac{e^x - \cos x}{x \sin x} dx$$

La funzione $f(x) = \frac{e^x - \cos x}{x \sin x}$ non è definita per $x=0$.

Utilizzando la formula di Taylor per $x \rightarrow 0$, otteniamo

$$f(x) = \frac{1+x+o(x) - (1+o(x))}{x(x+o(x^2))} = \frac{x+o(x)}{x^2(1+o(x))} = \frac{1}{x} \frac{1+o(1)}{1+o(x)}$$

Dividiamo l'intervallo di integrazione nel punto $x=0$.

Usiamo il criterio di confronto asintotico con $g(x) = \frac{1}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Dato che $\int_0^2 \frac{1}{x} dx = +\infty$ avremo che

$$\int_0^2 f(x) dx = +\infty.$$

Dato che $\int_{-1}^0 \frac{1}{x} dx = -\infty$ allora anche $\int_{-1}^0 f(x) dx = -\infty$

Quindi $\int_{-1}^2 f(x) dx$ non esiste.

6. Sia $f(x) = x^3 e^{-x}$. Allora

(a) $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ esiste finito

(b) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 0$

(c) $\int_0^{+\infty} f(x) dx = +\infty$

► (d) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = -\infty$

Soluzione:

$$f(x) = x^3 e^{-x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \cdot e^{+\infty} = -\infty \cdot (+\infty) = -\infty$$

$$\text{quindi } \int_{-\infty}^0 f(x) dx = -\infty$$

$$\text{Se } x \geq 0 \quad f(x) \geq 0. \quad \text{Scegliamo } g(x) = \frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 e^{-x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5}{e^x} = 0$$

Dato che $\int_0^{+\infty} g(x) dx$ converge, per il criterio del confronto asintotico, anche $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ converge.

$$\text{Quindi } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = -\infty.$$

$$7. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{n^4 + n^2} - \sqrt[3]{n^4 + n^3}}{\sqrt[3]{n}} =$$

(a) 0

(b) $-\infty$

► (c) $-\frac{1}{3}$

(d) $\frac{1}{3}$

Soluzione:

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{\sqrt[3]{n^4+n^2} - \sqrt[3]{n^4+n^3}}{\sqrt[3]{n}} = \frac{[n^4(1+\frac{1}{n^2})]^{1/3} - [n^4(1+\frac{1}{n})]^{1/3}}{n^{1/3}} = \\
&= [n^{4/3}(1+\frac{1}{n^2})^{1/3} - n^{4/3}(1+\frac{1}{n})^{1/3}] n^{-1/3} = \\
&= n^{4/3} \left[1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) - \left(1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \right] n^{-1/3} = \\
&= n \left[-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] = -\frac{1}{3} + o(1) \\
\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= -\frac{1}{3}
\end{aligned}$$

avendo usato lo sviluppo di Taylor del binomiale
 $(1+t)^\alpha = 1 + \alpha t + o(t)$ per $t \rightarrow 0$ con $\alpha = \frac{1}{3}$.

8. La successione

$$a_n = e^{\frac{(-1)^n}{n}} \left(\sin \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \right) n^4$$

- (a) diverge a $-\infty$ (b) tende a 0 (c) tende a $\frac{1}{6}$ (d) non ha limite

Soluzione:

$$a_n = e^{\frac{(-1)^n}{n}} \left(\sin \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \right) n^4$$

$$\text{osserviamo che } \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{(-1)^n}{n}} = e^0 = 1$$

$$\text{inoltre } \sin \frac{1}{n} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^4}\right) - \frac{1}{n} = -\frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)$$

quindi

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \right) n^4 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^4}\right) \right) n^4 = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \left(-\frac{1}{6} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \cdot n^4 = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(-\frac{1}{6} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) = +\infty \left(-\frac{1}{6} \right) = -\infty.
\end{aligned}$$

quindi (a_n) diverge a $-\infty$.

9. La serie $\sum_{n \geq 1} \frac{n^3}{e^n} \left(\frac{2n+1}{2n} \right)^{n^2}$

- (a) converge assolutamente (b) converge ma non converge assolutamente
(c) diverge positivamente (d) diverge negativamente

Soluzione:

$$a_n = \frac{n^3}{e^n} \left(\frac{2n+1}{2n} \right)^{n^2} \geq 0 \quad \forall n \geq 1.$$

La serie è a termini positivi, proviamo il criterio della radice.

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{\sqrt[n]{n^3}}{e} \left(\frac{2n+1}{2n} \right)^n. \quad \text{Ricordiamo che } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3} = 1.$$

$$\left(\frac{2n+1}{2n} \right)^n = \left(1 + \frac{1}{2n} \right)^n = e^{n \log \left(1 + \frac{1}{2n} \right)} = e^{n \left(\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)} =$$

$$= e^{\frac{1}{2} (1 + o(1))} \rightarrow e^{1/2}$$

$$\text{quindi } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1 \cdot e^{1/2}}{e} = \frac{1}{e^{1/2}} < 1.$$

La serie converge per il criterio della radice, quindi converge anche assolutamente dato che è a termini positivi.

10. La serie $\sum_n \frac{\sin \left((2n+1) \frac{\pi}{2} \right) e^{-3n} \log^3 n}{2n+1}$

- (a) è indeterminata ► (b) converge assolutamente
(c) diverge a $-\infty$ (d) converge semplicemente ma non assolutamente

Soluzione:

$$a_n = \frac{\sin\left((2n+1)\frac{\pi}{2}\right) e^{-3n} \log^3 n}{2n+1}.$$

La serie è a segno variabile, proviamo la convergenza assoluta.

$$|a_n| = \frac{|\sin((2n+1)\frac{\pi}{2})| e^{-3n} \log^3 n}{2n+1} \leq \frac{e^{-3n} \log^3 n}{2n+1}$$

Usiamo ora il criterio della radice.

$$\sqrt[n]{\frac{e^{-3n} \log^3 n}{2n+1}} = \frac{e^{-3} \sqrt[n]{\log^3 n}}{\sqrt[n]{2n+1}} \rightarrow \frac{e^{-3} \cdot 1}{1} = \frac{1}{e^3} < 1$$

quindi la serie $\sum_n \frac{e^{-3n} \log^3 n}{2n+1}$ converge.

Per il criterio del confronto $\sum_n |a_n|$ converge
quindi la serie converge assolutamente.

11. L'insieme $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |\arctan(xy)| \leq 1\}$

- (a) non è chiuso (b) è aperto
► (c) non è limitato (d) ha complementare limitato

Soluzione:

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |\arctan(xy)| \leq 1\}.$$

Osserviamo che se $x=0 \Rightarrow |\arctan(xy)| = |\arctan 0| = 0 \leq 1$

quindi A contiene l'asse y , pertanto A non è limitato.

12. $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} \sqrt{\log(x^2 - y)} =$

- (a) non esiste (b) $+\infty$ (c) 0 (d) $-\infty$

Soluzione:

Consideriamo la curva $\gamma(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 - 1 \end{pmatrix}$ che è

una parabola, quindi $\lim_{t \rightarrow \infty} \gamma(t) = \infty$.

Consideriamo la restrizione di f a γ :

$$f(\gamma(t)) = \sqrt{\log(t^2 - (t^2 - 1))} = \sqrt{\log 1} = 0$$

quindi $\lim_{t \rightarrow \infty} f(\gamma(t)) = 0$.

Consideriamo ora la curva $\alpha(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 - 2 \end{pmatrix}$ che è un'altra parabola.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(\alpha(t)) = \lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt{\log(t^2 - (t^2 - 2))} = \lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt{\log 2} = \sqrt{\log 2} \neq 0$$

quindi $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} f(x,y)$ non esiste.