

1. L'insieme $A = \{x \in \mathbb{R} : ||x| - 2| < 3\}$ è

- (a) superiormente ma non inferiormente limitato (b) inferiormente ma non superiormente limitato
(c) né inferiormente né superiormente limitato ► (d) limitato

Soluzione:


Sia $f(x) = ||x| - 2| - 3$, quindi $A = \{x \in \mathbb{R} : f(x) < 0\}$.

Dato che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = |1 + \infty - 2| - 3 = +\infty - 3 = +\infty$

e che $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ (f è pari), ne segue che

$f(x) > 0$ sia in un intorno di $+\infty$ che in un intorno di $-\infty$. Come conseguenza otteniamo che A è limitato.

Senza uso dei limiti, il grafico di f si ottiene per via elementare



2. La funzione $f(x) = x^2 e^{\frac{1}{x}}$, nel suo insieme di definizione

- (a) è debolmente crescente (b) ha massimo ma non ha minimo
(c) ha minimo ma non ha massimo ► (d) è limitata inferiormente ma non ha minimo

Soluzione:

$$f(x) = x^2 e^{\frac{1}{x}}$$

f è definita $\forall x \neq 0$, inoltre $f(x) > 0 \quad \forall x \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \cdot e^{\frac{1}{0^-}} = 0 \cdot e^{-\infty} = 0$$

quindi $\inf(f) = 0$ ma non esiste nessun $x \neq 0$

t.c. $f(x) = 0 \Rightarrow f$ non ha minimo.

3. $\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{3}}} x^3 \cos(x^2) dx =$

(a) $\frac{\pi^2 \sqrt{3}}{72}$

(b) $\frac{\pi}{3} \left(\frac{3}{2} - \frac{\pi}{\sqrt{3}} \right)$

► (c) $\frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{\sqrt{3}} - 1 \right)$

(d) $\frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{3} \sin \sqrt{\frac{\pi}{3}} + \sqrt{3} \cos \sqrt{\frac{\pi}{3}} - \sqrt{3} \right)$

Soluzione:

Calcoliamo una primitiva con la sostituzione

$$x^2 = t \quad \frac{dt}{dx} = 2x \quad \frac{dt}{2} = x dx$$

$$\int x^3 \cos(x^2) dx = \int x^2 \cos(x^2) x dx = \int t \cos t \frac{dt}{2}$$

ora integriamo per parti derivando t e integrando $\cos t$

$$= \frac{1}{2} \left(t \sin t - \int 1 \cdot \sin t dt \right) = \frac{1}{2} (t \sin t + \cos t) + c =$$

$$= \frac{1}{2} (x^2 \sin(x^2) + \cos(x^2)) + c$$

Dal teorema di Torricelli otteniamo che

$$\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{3}}} x^3 \cos(x^2) dx = \left[\frac{1}{2} (x^2 \sin(x^2) + \cos(x^2)) \right]_0^{\sqrt{\frac{\pi}{3}}} =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{3} - 0 - \cos 0 \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{3} \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2\sqrt{3}} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{\sqrt{3}} - 1 \right)$$

4. $\int_{-2}^2 e^{|x+1|} dx =$

► (a) $e^3 + e - 2$

(b) $e^3 - \frac{1}{e}$

(c) 0

(d) $e^3 - e$

Soluzione:

$$|x+1| = \begin{cases} x+1 & \text{se } x \geq -1 \\ -x-1 & \text{se } x < -1 \end{cases}$$

quindi

$$\int_{-2}^2 e^{|x+1|} dx = \int_{-2}^{-1} e^{-x-1} dx + \int_{-1}^2 e^{x+1} dx = \left[-e^{-x-1} \right]_{-2}^{-1} + \left[e^{x+1} \right]_{-1}^2 =$$

$$= -\left(e^{1-1} - e^{2-1} \right) + \left(e^{2+1} - e^{-1+1} \right) = -(1-e) + e^3 - 1 =$$

$$= e^3 + e - 2$$

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x\sqrt{x}} \int_2^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{t} + \sin t} =$

(a) $+\infty$

(b) 0

(c) $\frac{7}{2}$

► (d) 2

Soluzione:

Poniamo $F(x) = \int_2^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{t} + \sin t}$. Risulta che

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \int_2^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t} + \sin t} = +\infty. \text{ Infatti,}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{t} + \sin t}}{\frac{1}{\sqrt{t}}} = 1, \text{ quindi possiamo applicare}$$

il criterio del confronto asintotico tenendo conto che

$$\int_2^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t}} = +\infty.$$

Poniamo ora $g(x) = x\sqrt{x} = x^{3/2}$. Dato che $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

abbiamo che $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{F(x)}{g(x)} = \frac{+\infty}{+\infty}$. Proviamo ad

applicare il teorema di de l'Hôpital.

$$F'(x) = 3x^2 \frac{1}{\sqrt{x^3} + \sin(x^3)} = \frac{3x^2}{x^{3/2} + \sin(x^3)}$$

$$g'(x) = \frac{3}{2} x^{1/2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^2}{x^{3/2} + \sin(x^3)}}{\frac{3}{2} x^{1/2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{3}x^2 \cdot 2}{\cancel{3}x^{1/2} (x^{3/2} + \sin(x^3))} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^{3/2}}{x^{3/2} + \sin(x^3)} = 2.$$

$$\text{Quindi } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{g(x)} = 2.$$

(a) converge

(b) diverge negativamente (c) diverge positivamente (d) non esiste

Soluzione:

Poniamo $f(x) = \frac{\cos x}{x^2}$.

Osserviamo che $\cos x \geq 0$ se $x \in [0, \pi/2]$ quindi

$f(x) \geq 0$ in un intorno destro di 0.

Poniamo ora $g(x) = \frac{1}{x^2}$. Risulta che

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ e che $\int_0^1 g(x) dx = +\infty$ quindi,

per il criterio del confronto^o asintotico, anche

$$\int_0^1 f(x) dx = +\infty.$$

Se invece $x \in [1, +\infty)$ consideriamo la convergenza assoluta. Dato che

$$\left| \frac{\cos x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}$$

e che $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ converge, dal criterio del confronto

otteniamo che $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ converge assolutamente,

quindi converge.

Ne segue che $\int_0^{+\infty} f(x) dx = +\infty$.

7. La successione $a_n = \frac{(\log n)^{(n^2)}}{(\log(n^n))^n}$, $n \geq 2$

- (a) ha minimo
(c) ha massimo

- (b) non è limitata inferiormente
(d) è debolmente decrescente

Soluzione:

$$a_n = \frac{(\log n)^{(n^2)}}{(\log(n^n))^n}$$

Dato che $a_n \geq 0 \quad \forall n \geq 2$, possiamo applicare il criterio della radice.

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{(\log n)^{(n^2)}}{(\log(n^n))^n} \right)^{1/n} = \frac{(\log n)^n}{\log(n^n)} = \frac{(\log n)^n}{n \log n}$$

Poniamo $b_n = \frac{(\log n)^n}{n \log n}$ e applichiamo il criterio della radice a b_n ottenendo

$$\sqrt[n]{b_n} = \frac{\log n}{\sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{\log n}} \rightarrow \frac{+\infty}{1 \cdot 1} = +\infty > 1$$

Ne segue che $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty > 1$

e che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

quindi la successione (a_n) ha minimo.

8. La successione $a_n = \frac{n + \sin(n^2)}{2n^2 + n + 3}$

(a) tende a $\frac{1}{2}$

(b) è debolmente crescente

► (c) tende a 0

(d) non ha limite

Soluzione:

$$a_n = \frac{n + \sin(n^2)}{2n^2 + n + 3} = \frac{\cancel{n} \left(1 + \frac{\sin(n^2)}{\cancel{n}} \right)}{\cancel{n} \left(2n + 1 + \frac{3}{\cancel{n}} \right)} \rightarrow \frac{1 + \text{limitata}}{+\infty + 1 + 0} = \frac{1+0}{+\infty} = 0$$

9. La serie $\sum_{n \geq 1} \frac{(\sin n)^n}{n(1 + \log^2 n)}$

(a) diverge positivamente

(b) è indeterminata

► (c) converge assolutamente

(d) converge ma non converge assolutamente

Soluzione:

Proviamo $a_n = \frac{(\sin n)^n}{n(1+\log^2 n)}$ e osserviamo che la

serie è a termini di segno variabile. Proviamo la convergenza assoluta.

$$|a_n| = \frac{|(\sin n)^n|}{|n(1+\log^2 n)|} \leq \frac{1}{n(1+\log^2 n)} \leq \frac{1}{n \log^2 n} \quad \forall n \geq 2$$

Sia ora $b_n = \frac{1}{n \log^2 n}$. Ricordiamo che $\sum b_n$ converge

perché è una serie del tipo $\sum \frac{1}{n^\alpha (\log n)^\beta}$ con $\alpha=1$ e $\beta=2>1$.

Quindi, per il criterio del confronto $\sum a_n$ converge assolutamente.

10. La serie $\sum_{n \geq 1} \left(\sqrt[n]{e^2} + \frac{2}{\sqrt[n]{e}} - 3 \right)$

(a) converge ma non converge assolutamente

(b) diverge negativamente

(c) diverge positivamente

► (d) converge assolutamente

Soluzione:

$$\sum_n \left(\sqrt[n]{e^2} + \frac{2}{\sqrt[n]{e}} - 3 \right)$$

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

$$t = \frac{2}{n}, \quad t = -\frac{1}{n}$$

$$a_n = e^{\frac{2}{n}} + 2e^{-\frac{1}{n}} - 3 = 1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{2} \frac{4}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + 2\left(1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{2} \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) - 3 =$$

criterio del confronto asintótico con $b_n = \frac{3}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\frac{3}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)}{\frac{3}{n^2}} = 1 \Rightarrow a_n \sim b_n$$

$$\sum b_n = \sum \frac{3}{n^2} \text{ converge (armonica di potenza 2).}$$


$\Rightarrow \sum a_n$ converge (anche assolutamente perché $a_n \geq 0$).

11. La funzione $f(x,y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 4}$, nel suo insieme di definizione

- (a) è limitata ▶ (b) non è limitata né superiormente né inferiormente
(c) è limitata inferiormente ma non superiormente (d) è limitata superiormente ma non inferiormente

Soluzione:

La funzione è definita in tutti i punti (x,y) t.c.
 $x^2 + y^2 \neq 4$, quindi in tutto \mathbb{R}^2 privato della
 circonferenza di centro $(0,0)$ e raggio 2



Consideriamo la restrizione di f all'asse x

$$g(x) = f(x,0) = \frac{1}{x^2 - 4}$$

e osserviamo che

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

quindi f non è né superiormente né inferiormente
 limitata.

12. Dati $A, B \subset \mathbb{R}^3$ non limitati, risulta che

- (a) $A \cap B$ non è mai limitato
- (c) $A \cup B$ è sempre limitato

- (b) $A \cup B$ non è mai limitato
- (d) $A \cap B$ è sempre limitato

Soluzione:

Se $A \cup B$ fosse limitato allora esisterebbe $R > 0$ t.c.

$(A \cup B) \subset B_R(0)$ (palla di centro l'origine e raggio R).

Allora $A \subset (A \cup B) \subset B_R(0)$ e anche A sarebbe limitato, contrariamente alle ipotesi.

Quindi $A \cup B$ non è mai limitato.

1	d
2	d
3	c
4	a
5	d
6	c
7	a
8	c
9	c
10	d
11	b
12	b