

# NOTAZIONI ASINTOTICHE

- USEREMO LE SEGUENTI NOTAZIONI ASINTOTICHE PER CARATTERIZZARE IL TASSO DI CRESCITA DEL TEMPO DI ESECUZIONE DI UN DATO ALGORITMO

→ PIÙ IN GENERALE  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

- SIA  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , OVE  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$

$$\Theta(g(n)) = \{f(n) : \text{ESISTONO } c_1, c_2 > 0, n_0 \in \mathbb{N} \text{ TALI CHE} \\ 0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n), \text{ PER OGNI } n \geq n_0\}$$

$$O(g(n)) = \{f(n) : \text{ESISTE } c > 0, n_0 \in \mathbb{N} \text{ TALE CHE} \\ 0 \leq f(n) \leq c g(n), \text{ PER OGNI } n \geq n_0\}$$

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) : \text{ESISTE } c > 0, n_0 \in \mathbb{N} \text{ TALE CHE} \\ 0 \leq c g(n) \leq f(n), \text{ PER OGNI } n \geq n_0\}$$

- SCRIVIAMO  $f(n) = \Theta(g(n))$  ,  $f(n) = O(g(n))$  ,  $f(n) = \Omega(g(n))$   
PER INTENDERE, RISPETTIVAMENTE ,


$$f(n) \in \Theta(g(n)) , f(n) \in O(g(n)) , f(n) \in \Omega(g(n))$$

- SE  $f(n) = \Theta(g(n))$  , ALLORA  $g(n)$  E' UN LIMITE  
ASINTOTICAMENTE STRETTO PER  $f(n)$

- SE  $f(n) = O(g(n))$  , ALLORA  $g(n)$  E' UN LIMITE  
ASINTOTICO SUPERIORE PER  $f(n)$


- SE  $f(n) = \Omega(g(n))$  , ALLORA  $g(n)$  E' UN LIMITE  
ASINTOTICO INFERIORE PER  $f(n)$

# RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE




$$f(n) = \Theta(g(n))$$

$$f \in \Theta(g)$$



$$f(n) = O(g(n))$$

$$f(n) = \sum (g(n))$$



$$f(n) = \sum (g(n))$$

Es.  $6n^3 \neq O(n^2)$

- SE FOSSE  $6n^3 = O(n^2)$ , ALLORA ESISTEREBBERO  $C_2 > 0$   
ED  $n_0 \in \mathbb{N}$  TALI CHE  $6n^3 \leq C_2 n^2$ , PER  $n \geq n_0$
- DIVIDENDO PER  $n^2$ ,  $6n \leq C_2$ , PER  $n \geq n_0$ , ASSURDO.
- ALLA STESSA MANIERA, SI VERIFICA CHE  $6n^3 \neq O(n^2)$


ES.  $\frac{1}{2}n^2 - 3n = \Theta(n^2)$

OCCORRE DETERMINARE  $c_1, c_2 > 0$  ED  $n_0 \in \mathbb{N}$  TALI CHE

$$c_1 n^2 \leq \frac{1}{2}n^2 - 3n \leq c_2 n^2, \text{ PER OGNI } n \geq n_0$$

DIVIDENDO PER  $n^2$  SI HA:


$$c_1 \leq \frac{1}{2} - \frac{3}{n} \leq c_2$$



- SCEGLIENDO  $c_2 \geq \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} - \frac{3}{n} \leq c_2$  VALE  $\forall n \geq 1$


- SCEGLIENDO  $0 < c_1 \leq \frac{1}{14}$ ,  $c_1 \leq \frac{1}{2} - \frac{3}{n}$  VALE  $\forall n \geq 7$

- DUNQUE, AD ESEMPIO,  $\frac{1}{14}n^2 \leq \frac{1}{2}n^2 - 3n \leq \frac{1}{2}n^2, \forall n \geq 7$



Es.

$$6h^3 \neq O(n^2)$$



- SE FOSSE  $6h^3 = O(n^2)$ , ALLORA ESISTEREBBERA  $C_2 > 0$   
ED  $n_0 \in \mathbb{N}$  TALI CHE  $6h^3 \leq C_2 n^2$ , PER  $n \geq n_0$

- DIVIDENDO PER  $n^2$ ,  $6h \leq C_2$ , PER  $n \geq n_0$ , ASSURDO.

- ALLA STESSA MANIERA, SI VERIFICA CHE  $6h^3 \neq O(n^2)$



CON LEGGERO ABUSO DI NOTAZIONE, SCRIVEREMO

$\Theta(1)$  AL POSTO DI  $\Theta(n^0)$ .

PER OGNI COSTANTE  $c > 0$  SI HA:  $c = \Theta(1)$

### PROPRIETÀ

- $\Theta(g(n)) \subseteq O(g(n))$
- $\Theta(g(n)) \subseteq \Omega(g(n))$
- $\Theta(g(n)) = O(g(n)) \cap \Omega(g(n))$

LEMMA SIANO  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  E  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^+$ .



(a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = a > 0 \Rightarrow f(n) = \Theta(g(n))$

(b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0 \Rightarrow f(n) = \mathcal{O}(g(n))$

(c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty \Rightarrow f(n) = \Omega(g(n))$

DIM (a) SIA  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = a > 0$  E SIA  $\varepsilon = \frac{a}{2} > 0$ ,

ESISTE  $n_0 \in \mathbb{N}$  TALE CHE,  $\forall n \geq n_0$ ,

$$\left| \frac{f(n)}{g(n)} - a \right| < \frac{a}{2} \iff -\frac{a}{2} < \frac{f(n)}{g(n)} - a < \frac{a}{2}$$

$$\iff \frac{a}{2} < \frac{f(n)}{g(n)} < \frac{3}{2}a \iff \frac{a}{2}g(n) < f(n) < \frac{3}{2}ag(n)$$

DA CUI  $f(n) = \Theta(g(n))$ .

$$(b) \quad \text{SIA} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0 \quad \text{E SIA} \quad \varepsilon > 0,$$

ESISTE  $n_0 \in \mathbb{N}$  TALE CHE,  $\forall n \geq n_0$ ,

$$\left| \frac{f(n)}{g(n)} \right| < \varepsilon \rightarrow 0 \leq f(n) < \varepsilon g(n) \Rightarrow f(n) = O(g(n)).$$

$$(c) \quad \text{SIA} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty \quad \text{E SIA} \quad c > 0,$$

ESISTE  $n_0 \in \mathbb{N}$  TALE CHE,  $\forall n \geq n_0$ ,

$$\frac{f(n)}{g(n)} > c \rightarrow 0 < c g(n) < f(n) \Rightarrow f(n) = \Omega(g(n)).$$

# COROLLARIO

§ IAWD

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^+$ .

(a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = a > 0 \Rightarrow f(n) = \Theta(g(n))$

(b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = a \geq 0 \Rightarrow f(n) = \mathcal{O}(g(n))$

(c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} > 0 \Rightarrow f(n) = \Omega(g(n))$



ES. SIA  $P(n) = \sum_{i=0}^d a_i n^i$  UN POLINOMIO DI GRADO  $d$ , CON  $a_d > 0$

ALLORA  $P(n) = \Theta(n^d)$ .

INOLTRE  $P(n) = O(n^\alpha)$ , PER OGNI  $\alpha \geq d$ ,

$P(n) = \Omega(n^\beta)$ , PER OGNI  $0 \leq \beta \leq d$

PER IL COROLLARIO PRECEDENTE E' SUFFICIENTE OSSERVARE CHE

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{n^d} = a_d > 0$$

$$- \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{n^\alpha} = 0 \geq 0, \text{ PER OGNI } \alpha \geq d$$

$$- \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{n^\beta} > 0, \text{ PER OGNI } 0 \leq \beta \leq d$$

## NOTAZIONE $o(g(n))$

$$o(g(n)) = \left\{ f(n) : \text{PER OGNI } c > 0 \text{ ESISTE } n_0 > 0 \text{ TALE CHE} \right. \\ \left. 0 \leq f(n) < c g(n), \text{ PER OGNI } n \geq n_0 \right\}$$

- SI OSSERVI CHE  $n^2 \neq o(n^2)$
- PIÙ IN GENERALE,  $g(n) \neq o(g(n))$

## PROPRIETÀ'

PER  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^+$  SI HA:

$$f(n) = o(g(n)) \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

## NOTAZIONE $\omega(g(n))$

$$\omega(g(n)) = \left\{ f(n) : \text{PER OGNI } c > 0 \text{ ESISTE } n_0 > 0 \text{ TALE CHE} \right. \\ \left. 0 \leq c g(n) < f(n), \text{ PER OGNI } n \geq n_0 \right\}$$

- SI OSSERVI CHE  $n^2 \neq \omega(n^2)$

- PIÙ IN GENERALE,  $g(n) \neq \omega(g(n))$

## PROPRIETÀ'

PER  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^+$  SI HA:

$$f(n) = \omega(g(n)) \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$$

## ALTRO USO DELLE NOTAZIONI ASINTOTICHE

-  $h(n) = k(n) + \mathcal{O}(g(n))$       SIGNIFICA

ESISTE  $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$  TALE CHE  $h(n) = k(n) + f(n)$

-  $h(n) + \mathcal{O}(g(n)) = \mathcal{O}(k(n))$       SIGNIFICA

PER OGNI  $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ ,  $h(n) + f(n) = \mathcal{O}(k(n))$

Es.  $5n^2 = 4n + \mathcal{O}(n^2)$

$\parallel$

$$3n + \mathcal{O}(4n^2 + 5n) = \mathcal{O}(n^2)$$



# RELAZIONI TRA LE VARIE NOTAZIONI

## TRANSITIVITA'

$$f(n) = \Theta(g(n)) \wedge g(n) = \Theta(h(n)) \Rightarrow f(n) = \Theta(h(n))$$

(ANCHE PER  $O, \Omega, o, \omega$ )

## RIFLESSIVITA'

$$f(n) = \Theta(f(n))$$

$$f(n) = O(f(n))$$

$$f(n) = \Omega(f(n))$$

## ANTI-RIFLESSIVITA'

$$f(n) \neq o(f(n))$$

$$f(n) \neq \omega(f(n))$$

## SIMMETRIA

$$f(n) = \Theta(g(n)) \iff g(n) = \Theta(f(n))$$

## SIMMETRIA TRASPOSTA

$$f(n) = O(g(n)) \iff g(n) = \Omega(f(n))$$

$$f(n) = o(g(n)) \iff g(n) = \omega(f(n))$$

## PROPRIETÀ

- $\Theta(g(n)) \subseteq O(g(n))$
- $\Theta(g(n)) \subseteq \Omega(g(n))$
- $\Theta(g(n)) = O(g(n)) \cap \Omega(g(n))$

- SI OSSERVI L'ANALOGIA TRA IL CONFRONTO ASINTOTICO DI DUE FUNZIONI  $f, g$  E IL CONFRONTO DI DUE NUMERI REALI  $a, b$


$$f(n) = O(g(n)) \quad \approx \quad a \leq b$$

$$f(n) = \Omega(g(n)) \quad \approx \quad a \geq b$$

$$f(n) = \Theta(g(n)) \quad \approx \quad a = b$$

$$f(n) = o(g(n)) \quad \approx \quad a < b$$

$$f(n) = \omega(g(n)) \quad \approx \quad a > b$$



- TUTTAVIA LA PROPRIETA' DI TRICOTOMIA NON E' VALIDA PER IL CONFRONTO ASINTOTICO :

$$f(n) = n$$

$$g(n) = n^{1 + \sin n}$$

$$-1 \leq \sin n \leq 1$$

$$0 = 1 - 1 \leq 1 + \sin n \leq 1 + 1 = 2$$

$f(n)$  E  $g(n)$  NON SONO

ASINTOTICAMENTE CONFRONTABILI

## NOTAZIONI STANDARD E FUNZIONI COMUNI

$$\lceil 5 \rceil = \lfloor 5 \rfloor = 5$$

$$\lfloor x \rfloor = (\text{massimo intero} \leq x)$$

(floor)

$$\lfloor 5.2 \rfloor = 5$$

$$\lceil x \rceil = (\text{minimo intero} \geq x)$$

(ceiling)

$$\lceil 5.2 \rceil = 6$$

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad x-1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x+1$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = n$$

$$\underbrace{\left\lfloor \frac{5}{2} \right\rfloor}_2 + \underbrace{\left\lceil \frac{5}{2} \right\rceil}_3 = 2 + 3 = 5$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall a, b \in \mathbb{N}^+$$

$$\left\lceil \left\lceil \frac{n}{a} \right\rceil / b \right\rceil = \left\lceil \frac{n}{ab} \right\rceil, \quad \left\lfloor \left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor / b \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{ab} \right\rfloor$$

$$\left\lceil \left\lceil \frac{100}{3} \right\rceil / 4 \right\rceil = \left\lceil \frac{100}{3 \cdot 4} \right\rceil$$

$$\left\lceil \frac{34}{4} \right\rceil = 9 \quad \left\lceil \frac{100}{12} \right\rceil = 9$$

-  $f(n)$  È POLINOMIALMENTE LIMITATA SE

$$f(n) = O(n^k), \text{ PER QUALCHE } k \geq 0$$

M-Z 13/10/22

## ESPOENZIALI

- POICHE'  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^b}{a^n} = 0, \forall b \forall a > 1$

SI HA CHE  $n^b = o(a^n)$

-  $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$

-  $e^x \geq 1 + x$

-  $|x| \leq 1 \Rightarrow 1 + x \leq e^x \leq 1 + x + x^2$

-  $e^x = 1 + x + O(x^2)$

-  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$

# LOGARITMI

$$\lg n := \log_2 n \quad (\text{LOGARITMO BINARIO})$$

$$\ln n := \log_e n \quad (\text{LOGARITMO NATURALE})$$

$$|x| < 1 \Rightarrow \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

$$x > -1 \Rightarrow \frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$$

-  $f(n)$  E' POLYLOGARITMICAMENTE LIMITATA SE  $f(n) = O(\lg^k n)$   
PER QUALCHE  $k$

$$- a > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg^b n}{n^a} = 0 \quad \text{E DUNQUE} \quad \lg^b n = o(n^a)$$

$$- \log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b} ; \quad \log_b a = \frac{1}{\log_a b} ; \quad a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$$

# FATTORIALI

FORMULA DI APPROSSIMAZIONE DI STIRLING:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

- $n! = o(n^n)$
- $n! = \omega(2^n)$
- $\lg(n!) = \Theta(n \lg n)$
- $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\alpha_n}$  , con  $\frac{1}{12n+1} < \alpha_n < \frac{1}{12n}$

# SOMMATORIE

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} = \mathcal{O}(n^2)$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \mathcal{O}(n^3)$$

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \mathcal{O}(n^4)$$

$$\sum_{i=0}^n x^i = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} \quad \forall x \neq 1$$

$$|x| < 1 \Rightarrow \sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x}$$

$$H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \ln n + \mathcal{O}(1)$$