

B: Hausaufgaben zum 6./7. November 2017

Hinweis: Es ist in allen Aufgaben genau wie im **Handout** vorzugehen. Insbesondere ist am Ende jeder Iteration das neue Tableau noch einmal übersichtlich hinzuschreiben (wie im Handout).

1. Lösen Sie die folgenden LP-Probleme mit dem Simplexverfahren:

a)

$$\text{maximiere } -2x_1 + 3x_2 + \frac{1}{2}x_3$$

unter den Nebenbedingungen

$$-2x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 2$$

$$x_1 + 2x_3 \leq 5$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Starttableau

$$x_4 = 2 + 2x_1 - 3x_2 + x_3$$

$$x_5 = 5 - x_1 - 2x_3$$

$$x_6 = 2 + x_1 - x_2$$

$$Z = -2x_1 + 3x_2 + \frac{1}{2}x_3$$

1. Iteration

Eingangsvariable: x_2

Ausgangsvariable: x_4

Es folgt

$$x_2 = \frac{2}{3} + \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4$$

$$x_6 = 2 + x_1 - \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4\right)$$

$$= \frac{4}{3} + \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4$$

$$Z = -2x_1 + 3\left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4\right) + \frac{1}{2}x_3$$

$$= 2 + \frac{3}{2}x_3 - x_4$$

Neues Tableau:

$$x_2 = \frac{2}{3} + \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4$$

$$x_5 = 5 - x_1 - 2x_3$$

$$x_6 = \frac{4}{3} + \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4$$

$$z = 2 + \frac{3}{2}x_3 - x_4$$

2. Iteration

Eingangsvariable: x_3

Ausgangsvariable: x_5

Es folgt

$$x_3 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_5$$

$$x_2 = \frac{2}{3} + \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}\left(\frac{5}{2} - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_5\right) - \frac{1}{3}x_4$$

$$= \frac{3}{2} + \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{6}x_5 - \frac{1}{3}x_4$$

$$x_6 = \frac{4}{3} + \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}\left(\frac{5}{2} - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_5\right) + \frac{1}{3}x_4$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{6}x_5 + \frac{1}{3}x_4$$

$$z = 2 + \frac{3}{2}\left(\frac{5}{2} - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_5\right) - x_4$$

$$= \frac{23}{4} - \frac{3}{4}x_1 - \frac{3}{4}x_5 - x_4$$

Neues Tableau:

$$x_3 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_5$$

$$x_2 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{6}x_5$$

$$x_6 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_4 + \frac{1}{6}x_5$$

$$z = \frac{23}{4} - \frac{3}{4}x_1 - x_4 - \frac{3}{4}x_5$$

Optimale Lösung: $x_1 = 0, x_2 = \frac{3}{2}, x_3 = \frac{5}{2}$ mit $z = \frac{23}{4}$.

b)

maximiere $3x_1 + x_2 - 11x_3 - 9x_4$
 unter den Nebenbedingungen

$$x_1 - x_2 - 7x_3 - 3x_4 \leq 1$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \leq 3$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

Starttableau

$$x_5 = 1 - x_1 + x_2 + 7x_3 + 3x_4$$

$$x_6 = 3 - x_1 - x_2 - 3x_3 - x_4$$

$$Z = 3x_1 + x_2 - 11x_3 - 9x_4$$

1. Iteration

Eingangsvariable: x_1

Ausgangsvariable: x_5

Es folgt

$$x_1 = 1 + x_2 + 7x_3 + 3x_4 - x_5$$

$$x_6 = 3 - (1 + x_2 + 7x_3 + 3x_4 - x_5) - x_2 - 3x_3 - x_4$$

$$= 2 - 2x_2 - 10x_3 - 4x_4 + x_5$$

$$Z = 3(1 + x_2 + 7x_3 + 3x_4 - x_5) + x_2 - 11x_3 - 9x_4$$

$$= 3 + 4x_2 + 10x_3 - 3x_5$$

Neues Tableau:

$$x_1 = 1 + x_2 + 7x_3 + 3x_4 - x_5$$

$$x_6 = 2 - 2x_2 - 10x_3 - 4x_4 + x_5$$

$$z = 3 + 4x_2 + 10x_3 - 3x_5$$

2. Iteration

Eingangsvariable: x_3

Ausgangsvariable: x_6

Es folgt:

$$x_3 = \frac{1}{5} - \frac{1}{5}x_2 - \frac{2}{5}x_4 + \frac{1}{10}x_5 - \frac{1}{10}x_6$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 + x_2 + 7\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{5}x_2 - \frac{2}{5}x_4 + \frac{1}{10}x_5 - \frac{1}{10}x_6\right) + 3x_4 - x_5 \\ &= \frac{12}{5} - \frac{2}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_4 - \frac{3}{10}x_5 - \frac{7}{10}x_6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z &= 3 + 4x_2 + 10\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{5}x_2 - \frac{2}{5}x_4 + \frac{1}{10}x_5 - \frac{1}{10}x_6\right) - 3x_5 \\ &= 5 + 2x_2 - 4x_4 - 2x_5 - x_6 \end{aligned}$$

Neues Tableau:

$$x_3 = \frac{1}{5} - \frac{1}{5}x_2 - \frac{2}{5}x_4 + \frac{1}{10}x_5 - \frac{1}{10}x_6$$

$$x_1 = \frac{12}{5} - \frac{2}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_4 - \frac{3}{10}x_5 - \frac{7}{10}x_6$$

$$z = 5 + 2x_2 - 4x_4 - 2x_5 - x_6$$

3. Iteration

Eingangsvariable: x_2

Ausgangsvariable: x_3

Es folgt

$$x_2 = 1 - 2x_4 + \frac{1}{2}x_5 - \frac{1}{2}x_6 - 5x_3$$

$$x_1 = \frac{12}{5} - \frac{2}{5}(1 - 2x_4 + \frac{1}{2}x_5 - \frac{1}{2}x_6 - 5x_3) + \frac{1}{5}x_4 - \frac{3}{10}x_5 - \frac{7}{10}x_6$$

$$= 2 + x_4 - \frac{1}{2}x_5 - \frac{1}{2}x_6 + 2x_3$$

$$Z = 5 + 2(1 - 2x_4 + \frac{1}{2}x_5 - \frac{1}{2}x_6 - 5x_3) - 4x_4 - 2x_5 - x_6$$

$$= 7 - 8x_4 - x_5 - 2x_6 - 10x_3$$

Neues Tableau:

L.14

$$x_2 = 1 - 2x_4 + \frac{1}{2}x_5 - \frac{1}{2}x_6 - 5x_3$$

$$x_1 = 2 + x_4 - \frac{1}{2}x_5 - \frac{1}{2}x_6 + 2x_3$$

$$z = 7 - 8x_4 - x_5 - 2x_6 - 10x_3$$

Optimale Lösung: $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 0, x_4 = 0$
mit $z = 7$.

2. a) Lösen Sie die folgende Aufgabe mit dem Simplexverfahren:

maximiere $-x_1 + 3x_2 + x_3$

unter den Nebenbedingungen

$$-x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 8$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 \leq 8$$

$$x_1 - 3x_2 + x_3 \leq 8$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

b) Falls das Verfahren mit dem Ergebnis **unbeschränkt** terminiert, so gebe man zulässige Lösungen an, für die der Zielfunktionswert z die folgenden Werte annimmt: $z = 20, z = 1000$ sowie $z = 1000000$.

a) Starttableau

$$x_4 = 8 + x_1 - 2x_2 - 2x_3$$

$$x_5 = 8 - x_1 + 2x_2 - 3x_3$$

$$x_6 = 8 - x_1 + 3x_2 - x_3$$

$$z = -x_1 + 3x_2 + x_3$$

1. Iteration

Eingangsvariable: x_2

Ausgangsvariable: x_4

Es folgt

L.15

$$x_2 = 4 + \frac{1}{2}x_1 - x_3 - \frac{1}{2}x_4$$

$$\begin{aligned} x_5 &= 8 - x_1 + 2(4 + \frac{1}{2}x_1 - x_3 - \frac{1}{2}x_4) - 3x_3 \\ &= 16 - 5x_3 - x_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_6 &= 8 - x_1 + 3(4 + \frac{1}{2}x_1 - x_3 - \frac{1}{2}x_4) - x_3 \\ &= 20 + \frac{1}{2}x_1 - 4x_3 - \frac{3}{2}x_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z &= -x_1 + 3(4 + \frac{1}{2}x_1 - x_3 - \frac{1}{2}x_4) + x_3 \\ &= 12 + \frac{1}{2}x_1 - 2x_3 - \frac{3}{2}x_4 \end{aligned}$$

Neues Tableau:

$$x_2 = 4 + \frac{1}{2}x_1 - x_3 - \frac{1}{2}x_4$$

$$x_5 = 16 - 5x_3 - x_4$$

$$x_6 = 20 + \frac{1}{2}x_1 - 4x_3 - \frac{3}{2}x_4$$

$$Z = 12 + \frac{1}{2}x_1 - 2x_3 - \frac{3}{2}x_4$$

2. Iteration

Eingangsvariable: x_1

Ausgangsvariable: —

Das Verfahren terminiert mit dem Ergebnis „unbeschränkt“.

b) Wir betrachten das letzte Tableau und setzen $x_3 = 0$, $x_4 = 0$ und $x_1 = t$, wobei t eine reelle Zahl ist, für die $t \geq 0$ gilt. Es folgt

$$x_2 = 4 + \frac{1}{2}t, x_5 = 16, x_6 = 20 + \frac{1}{2}t \text{ und } z = 12 + \frac{1}{2}t.$$

Zu jedem $t \geq 0$ haben wir somit eine zulässige Lösung erhalten, die wie folgt lautet:

$$x_1 = t, x_2 = 4 + \frac{1}{2}t, x_3 = 0 \text{ mit } z = 12 + \frac{1}{2}t.$$

Es folgt $t = 2z - 24$. Setzt man in diese Gleichung nacheinander $z = 20$, $z = 1000$ und $z = 10^6$ ein, so erhält man die gewünschten zulässigen Lösungen:

(I) Für $z = 20$ erhält man $t = 16$ und somit

$$x_1 = 16, x_2 = 12, x_3 = 0.$$

(II) Für $z = 1000$ erhält man $t = 1976$ sowie

$$x_1 = 1976, x_2 = 992, x_3 = 0.$$

(III) Für $z = 10^6$ erhält man $t = 1999976$ und somit

$$x_1 = 1999976, x_2 = 999992, x_3 = 0.$$