

	<b>Laboratorio - Preanalítica</b>	<b>Lab-Ext-IPE-01/41</b>
	<b>Instrucciones al Paciente</b>	<b>Fecha:</b> 14/12/2020 <b>Revisión:</b> 8

## ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO TOTAL Y/O LIBRE (PSA)

La preparación es sencilla pero debe seguirse estrictamente. En caso contrario, los resultados pueden alterarse.

Se requiere:

- Ayunas de 8 hs.
- Abstinencia sexual: mínimo 72 Hs.
- Si se ha realizado tacto rectal o ecografía transrectal esperar una semana.
- En caso de tener prostatitis, esperar 6-8 semanas luego de la resolución de los síntomas, salvo indicación médica.
- Si se ha realizado biopsia rectal o resección de próstata esperar 6 semanas
- Evitar las siguientes conductas dado que todas ellas elevan falsamente el PSA:
  - la actividad física intensa en el día previo al estudio (principalmente ciclismo, hipismo o relacionados).
  - el estreñimiento o diarrea exagerados con una semana de anticipación.

### Observaciones

Si el paciente esta tomando alguna medicación relacionada con el tratamiento prostático debe consultar a su médico quien le indicará si debe seguir o no con la toma de la medicación antes de la extracción de sangre.

Detallar que fármacos está tomando al momento del ingreso al laboratorio (específicamente si toma Finasteride).

### Horarios de Atención:

- ✓ Consultar horarios en cada Centro o en página Web: [www.swissmedical.com.ar](http://www.swissmedical.com.ar)