

Casos conocidos de Intervalos de Confianza:

- 1) $IC_{(1-\alpha)}(\mu) = \left[\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$ m.a. con distribución normal y varianza conocida
- 2) $IC_{(1-\alpha)}(\mu) = \left[\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$ m.a. con distribución normal y varianza desconocida
- 3) $IC_{(1-\alpha)}(\mu) = \left[\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$ muestra grande, varianza desconocida (caso TCL)
- 4) $IC_{(1-\alpha)}(\sigma^2) = \left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}}; \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}} \right)$ m.a. con distribución normal