


Teorija vjerojatnosti

po predavanjima prof. Šikića

Autor: Lovro Malada

Verzija: v0.1.20241117



Predgovor

Za ovo još nema potrebe, ali ukratko

za teoretičare.

Kod

Main, preamble, operatori, poglavlja. Simbol \times označava kraj pojedinog predavanja.

Povratne informacije

Ukoliko ste u toliko neizglednoj situaciji da ispunjavate sva tri sljedeća uvjeta

- (i) čitate ovaj dokument
- (ii) ne poznajete me privatno
- (iii) imate potrebu dati mi povratnu informaciju,

slobodno mi se javite. Možete me zaustaviti na faksu, odazivam se na “Lovre”. Jasno, može i mail lovmala.math@pmf.hr.

Sadržaj

Predgovor	iii
I Zima	7
1 Uvod	9
1.1 Ponavljanje	9
1.2 Slučajni elementi	13
2 Funkcije distribucije	21
2.1 Definicije i osnovna svojstva. Funkcije distribucije slučajnih varijabli .	21
2.2 Funkcije distribucije slučajnih vektora	38
2.3 Vjerojatnosti na beskonačno dimenzionalnim prostorima	43
3 Matematičko očekivanje. Momenti	47
II Ljeto	51

I

Zima

Dio I: Sadržaj

1	Uvod	9
1.1	Ponavljanje	9
1.2	Slučajni elementi	13
2	Funkcije distribucije	21
2.1	Definicije i osnovna svojstva. Funkcije distribucije slučajnih varijabli	21
2.2	Funkcije distribucije slučajnih vektora	38
2.3	Vjerojatnosti na beskonačno dimenzionalnim prostorima	43
3	Matematičko očekivanje. Momenti	47

1 Uvod

§1.1 Ponavljanje

U ovom kratkom odjeljku ponovit ćemo osnovnu terminologiju, definicije i rezultate iz male vjerojatnosti te mjere i integrala.

§1.1.i Vjerojatnosni prostor

Osnovni objekt u našim razmatranjima je uređena trojka $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

- $\Omega \neq \emptyset$... skup elementarnih događaja.
- $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$... σ -algebra događaja na Ω , tj. vrijedi
 - (i) $\Omega \in \mathcal{F}$,
 - (ii) $A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}$,
 - (iii) $(A_n)_n$ niz u $\mathcal{F} \implies \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$.
- $\mathbb{P}: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$... vjerojatnost, tj. vrijedi
 - (i) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,
 - (ii) $(A_n)_n$ u parovima disjunktan niz u $\mathcal{F} \implies \mathbb{P}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$.

Za $A \in \mathcal{F}$ kažemo kako je $\mathbb{P}(A)$ vjerojatnost događaja A . Navedimo sada osnovna svojstva vjerojatnosti.

Napomena 1.1.1.

Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ vjerojatnosni prostor. Tada vrijedi

- (a) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.
- (b) Ako su $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ međusobno disjunktne događaje, onda vrijedi
$$\mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \mathbb{P}(A_1) + \dots + \mathbb{P}(A_n).$$
- (c) Ako su $A, B \in \mathcal{F}$ td. $A \subseteq B$, onda je $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

(d) Neka je $(A_n)_n$ niz u \mathcal{F} . Tada vrijede implikacije

$$\begin{aligned} A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots &\implies \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_n \mathbb{P}(A_n), \\ A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots &\implies \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_n \mathbb{P}(A_n). \end{aligned}$$

(e) Ako je $(A_n)_n$ niz u \mathcal{F} , onda vrijedi

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

(f) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

(g) Za $A \in \mathcal{F}$ vrijedi $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Propozicija 1.1.2.

Neka je (Ω, \mathcal{F}) izmjeriv prostor i $\mathbb{P}: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ konačno aditivna funkcija. Tada je \mathbb{P} vjerojatnost ako i samo za svaki niz $(A_n)_n$ u \mathcal{F} td.

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots \quad \text{i} \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \emptyset$$

vrijedi $\lim_n \mathbb{P}(A_n) = 0$.

Neka je $(A_n)_n$ niz u \mathcal{F} . Definiramo

$$\begin{aligned} \underline{\lim}_n A_n &:= \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \in \mathcal{F} \dots \text{ limes inferior,} \\ \overline{\lim}_n A_n &:= \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \in \mathcal{F} \dots \text{ limes superior.} \end{aligned}$$

Propozicija 1.1.3.

Neka je $(A_n)_n$ niz u \mathcal{F} .

- (i) $\underline{\lim}_n A_n \subseteq \overline{\lim}_n A_n$.
- (ii) $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots \implies \underline{\lim}_n A_n = \overline{\lim}_n A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.
- (iii) $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots \implies \underline{\lim}_n A_n = \overline{\lim}_n A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$.
- (iv) $\mathbb{P}(\underline{\lim}_n A_n) \leq \liminf_n \mathbb{P}(A_n) \leq \limsup_n \mathbb{P}(A_n) \leq \mathbb{P}(\overline{\lim}_n A_n)$.

(v) $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty \implies \mathbb{P}(\overline{\lim}_n A_n) = 0$.

Uz dodatnu pretpostavku nezavisnosti događaja $(A_n)_n$ vrijedi i više^a

$$\mathbb{P}(\overline{\lim}_n A_n) = \begin{cases} 0 & \text{ako } \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty \\ 1 & \text{ako } \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty. \end{cases}$$

^aBorelov zakon 0 – 1.

§1.1.ii Kratki pregled nekih rezultata iz mjere i integrala

Neka je $S \neq \emptyset$ te $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(S)$. Definiramo

$$\sigma(S) = \bigcap_{\substack{\mathcal{F} \text{ } \sigma\text{-algebra na } S \\ \mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}}} \mathcal{F}.$$

Definicija je dobra budući je $\mathcal{P}(S)$ σ -algebra na S koja sadrži \mathcal{A} .

Propozicija 1.1.4.

Neka su S_1, S_2 neprazni skupovi te $h: S_1 \rightarrow S_2$ funkcija.

(i) Ako je \mathcal{S}_2 σ -algebra na S_2 , onda je $h^{-1}(\mathcal{S}_2)$ σ -algebra na S_1 .

(ii) Ako je \mathcal{S}_1 σ -algebra na S_1 , tada je familija

$$\left\{ E \subseteq S_2 \mid h^{-1}(E) \in \mathcal{S}_1 \right\}$$

σ -algebra na S_2 .

Dokaz. (i) Jer je \mathcal{S}_2 σ -algebra na S_2 , imamo $S_2 \in \mathcal{S}_2$. Dakle, $S_1 = h^{-1}(S_2) \in h^{-1}(\mathcal{S}_2)$.

Neka je $A \in h^{-1}(\mathcal{S}_2)$ te neka je $E \in \mathcal{S}_2$ td. $A = h^{-1}(E)$. Tada je $E^c \in \mathcal{S}_2$ pa imamo

$$A^c = (h^{-1}(E))^c = h^{-1}(E^c) \in h^{-1}(\mathcal{S}_2).$$

Neka je sada $(A_n)_n$ niz u $h^{-1}(\mathcal{S}_2)$. Onda postoji niz $(E_n)_n$ u \mathcal{S}_2 td. $A_n = h^{-1}(E_n)$ za $n \in \mathbb{N}$. Posebno je $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{S}_2$ pa imamo

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = h^{-1} \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \in h^{-1}(\mathcal{S}_2).$$

(ii) Označimo familiju iz iskaza s \mathcal{H} . Jer je \mathcal{S}_1 σ -algebra na S_1 , imamo $S_1 \in \mathcal{S}_1$. Prema tome, $h^{-1}(S_2) = S_1 \in \mathcal{S}_1$ pa slijedi $S_2 \in \mathcal{H}$.

Nadalje, ako $A \in \mathcal{H}$, onda $h^{-1}(A) \in \mathcal{S}_1$. Jer je \mathcal{S}_1 σ -algebra slijedi

$$h^{-1}(A^c) = (h^{-1}(A))^c \in \mathcal{S}_1$$

pa imamo $A^c \in \mathcal{H}$.

Konačno, neka je $(A_n)_n$ niz u \mathcal{H} . Onda $h^{-1}(A_n) \in \mathcal{S}_1$ pa jer je \mathcal{S}_1 σ -algebra slijedi

$$h^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} h^{-1}(A_n) \in \mathcal{S}_1.$$

Dakle, $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{H}$ i time smo gotovi. \square

Teorem 1.1.5.

Neka su S_1, S_2 neprazni skupovi, $\mathcal{A}_2 \subseteq \mathcal{P}(S_2)$ te $h: S_1 \rightarrow S_2$ funkcija. Tada vrijedi

$$h^{-1}(\sigma(\mathcal{A}_2)) = \sigma(h^{-1}(\mathcal{A}_2)).$$

Dokaz. \supseteq $h^{-1}(\sigma(\mathcal{A}_2))$ je σ -algebra na S_1 koja sadrži $h^{-1}(\mathcal{A}_2)$. Po definiciji slijedi

$$\sigma(h^{-1}(\mathcal{A}_2)) \subseteq h^{-1}(\sigma(\mathcal{A}_2)).$$

\subseteq Označimo

$$\mathcal{H} := \left\{ E \subseteq S_2 \mid h^{-1}(E) \in \sigma(h^{-1}(\mathcal{A}_2)) \right\}.$$

Prema Propoziciji 1.4.4, \mathcal{H} je σ -algebra na S_2 . Sada imamo

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{H} \implies \sigma(\mathcal{A}_2) \subseteq \mathcal{H} \implies h^{-1}(\sigma(\mathcal{A}_2)) \subseteq h^{-1}(\mathcal{H}) \subseteq \sigma(h^{-1}(\mathcal{A}_2)).$$

\square

Neka su $(\Omega_1, \mathcal{F}_1), (\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ dva izmjeriva prostora. Funkcija $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ je izmjeriva (u paru σ -algebri $(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2)$) ako je $f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subseteq \mathcal{F}_1$.

Napomena 1.1.6.

Neka su $(\Omega_1, \mathcal{F}_1), (\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ dva izmjeriva prostora te $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ izmjeriva funkcija.

(a) Neka je $(\Omega_3, \mathcal{F}_3)$ izmjeriv prostor te $g: \Omega_2 \rightarrow \Omega_3$ izmjeriva funkcija. Onda imamo

$$(g \circ f)^{-1}(\mathcal{F}_3) = f^{-1}(g^{-1}(\mathcal{F}_3)) \subseteq f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subseteq \mathcal{F}_1,$$

tako da je i kompozicija $g \circ f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_3$ izmjeriva.

- (b) Neka je $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}_2$ generirajuća familija za \mathcal{F}_2 ^a. Lako vidimo kako je f izmjeriva ako i samo ako vrijedi $f^{-1}(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{F}_1$.

^a $\sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{F}_2$.

Ponovimo još i koncept produktne mjere te Borelove σ -algebre. Neka su $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$, $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ dva izmjeriva prostora. Definiramo

$$\mathcal{G} := \{E_1 \times E_2 \mid E_1 \in \mathcal{F}_1, E_2 \in \mathcal{F}_2\}.$$

Gornja familija skupova općenito nije σ -algebra na skupu $\Omega_1 \times \Omega_2$, stoga definiramo $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 := \sigma(\mathcal{G})$. Alternativno, $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ je najmanja σ -algebra u odnosu na koju su projekcije $\pi_1: \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow \Omega_1$ i $\pi_2: \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow \Omega_2$ izmjerive funkcije.

Neka je sada (X, \mathcal{U}) topološki prostor. Definiramo Borelovu σ -algebru kao $\mathcal{B}_X := \sigma(\mathcal{U})$. Ukoliko su (X_1, \mathcal{U}_1) i (X_2, \mathcal{U}_2) dva topološka prostora, za funkciju $g: X_1 \rightarrow X_2$ kažemo kako je Borelova ako je izmjeriva u paru Borelovih σ -algebri $(\mathcal{B}_{X_1}, \mathcal{B}_{X_2})$.

Uočimo odmah kako je svaka neprekidna funkcija $g: X_1 \rightarrow X_2$ Borelova.

§1.2 Slučajni elementi

Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ vjerojatnosni prostor te (X, \mathcal{U}) topološki prostor.

Definicija 1.2.1. Neka je $f: \Omega \rightarrow X$ funkcija. Kažemo kako je f **X -vrijednosni slučajni element** ako je f izmjeriva u paru σ -algebri $(\mathcal{F}, \mathcal{B}_X)$.

Napomena 1.2.2.

- (a) Neka je \mathcal{G} bilo koja generirajuća familija za \mathcal{B}_X ^a. Tada vrijedi


$$f \text{ je } X\text{-vrijednosni slučajni element} \iff f^{-1}(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{F}.$$

- (b) Neka je (Y, \mathcal{V}) topološki prostor te $g: X \rightarrow Y$ funkcija. Ako je f X -vrijednosni slučajni element, a g Borelova, onda je $g \circ f$ Y -vrijednosni slučajni element.

^aNpr. \mathcal{U} ili $\{A^c \mid A \in \mathcal{U}\}$.

Definicija 1.2.3. Definiramo sljedeće važne slučajne elemente.

- Neka je $X = \mathbb{R}$, snabdjeven euklidskom topologijom. \mathbb{R} -vrijednosni slučajni element naziva se **slučajna varijabla**.



- Neka je $X = \overline{\mathbb{R}}$, snabdjeven euklidskom topologijom. $\overline{\mathbb{R}}$ –vrijednosni slučajni element naziva se **proširena slučajna varijabla**.
- Neka je $X = \mathbb{R}^n$, snabdjeven euklidskom topologijom. \mathbb{R}^n –vrijednosni slučajni element naziva se **n –dimenzionalan slučajni vektor**.
- Neka je $X = \mathbb{C}$, snabdjeven euklidskom topologijom. \mathbb{C} –vrijednosni slučajni element naziva se **kompleksna slučajna varijabla**.

Napomena 1.2.4.

- (a) Promatramo li \mathbb{R} , imamo razne generirajuće familije za $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ – otvoreni skupovi, zatvoreni skupovi, poluotvoreni intervali ...
- (b) Na \mathbb{R}^n možemo promatrati dvije prirodne σ –algebre – $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$ i $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Međutim, vrijedi

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n} = \underbrace{\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}_{\mathbb{R}}}_{n \text{ puta}}.^a$$

Posebno, za funkciju $(f_1, \dots, f_n): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ vrijedi

$$(f_1, \dots, f_n) \text{ je slučajni vektor} \iff f_1, \dots, f_n \text{ su slučajne varijable.}$$

^aOvakva dekompozicija ne prolazi uvijek – ključna je separabilnost od \mathbb{R} .

Za slučajnu varijablu X uvodimo sljedeće oznake

$$\begin{aligned} (X \in A) &\longleftrightarrow \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\} \\ (X \leq a) &\longleftrightarrow X^{-1}((-\infty, a]) \end{aligned}$$

itd. \times

§1.2.i Operacije sa slučajnim varijablama

Prisjetimo se definicije Borelove funkcije te kako je svaka neprekidna funkcija Borelova. Nadalje, iz Napomene 1.2.2 (b) imamo sljedeću propoziciju

Propozicija 1.2.5.

- (i) Neka je X slučajna varijabla i $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Borelova funkcija. Tada je $g \circ X$ slučajna varijabla na Ω .
- (ii) Neka je X n -dimenzionalni slučajni vektor na Ω i $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ Borelova funkcija. Tada je $g \circ X$ m -dimenzionalni slučajni vektor na Ω .

Primjer 1.2.6.

Neka su X, X_1, X_2, \dots slučajne varijable. Tada su slučajne varijable i

$$Y = \sin X, \quad Y = \cos X, \quad Y = e^X, \quad Y = \sum_{k=1}^n X_k, \quad Y = \left(\sum_{k=1}^n X_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Korolar 1.2.7.

Neka su X_1 i X_2 slučajne varijable na Ω i $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ Borelova funkcija. Tada je funkcija $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ definirana s

$$Y(\omega) = g(X_1(\omega), X_2(\omega)),$$

slučajna varijabla na Ω .

Napomena 1.2.8.

Neka je $E \subseteq \Omega$ i $X: E \rightarrow \mathbb{R}$. Kažemo kako je X slučajna varijabla (na E) ako je

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in E \mid X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F},$$

za sve $B \in \mathcal{B}$. Posebno, $X^{-1}(\mathbb{R}) = E \in \mathcal{F}$, tako da je E uvijek događaj.

Neka su $X_1, X_2: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ slučajne varijable. Definiramo

$$(X_1 \vee X_2)(\omega) := \max(X_1(\omega), X_2(\omega))$$

$$(X_1 \wedge X_2)(\omega) := \min(X_1(\omega), X_2(\omega)).$$

Pomoću gornjih funkcija, za $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ definiramo

$$X^+ := X \vee 0 \dots \text{pozitivan dio funkcije } X$$

$$X^- := (-X) \vee 0 \dots \text{negativan dio funkcije } X.$$

Uočimo $X^+, X^- \geq 0$ te imamo dekompozicije

$$X = X^+ - X^- \quad \text{i} \quad |X| = X^+ + X^-.$$

Teorem 1.2.9.

Neka su X_1 i X_2 slučajne varijable na Ω te $c \in \mathbb{R}$. Tada su funkcije

$$X_1 + X_2, \quad X_1 + c, \quad X_1 X_2, \quad c X_1, \quad \frac{X_1}{X_2}, \quad |X_1|^c, \quad X_1 \vee X_2, \quad X_1 \wedge X_2, \quad X_1^+, \quad X_1^-$$

također slučajne varijable.

Dokaz. Funkcija $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dana s $g(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ je neprekidna, tako da je i Borelova pa prema Propoziciji 1.2.5 imamo kako je $X_1 + X_2 = g(X_1, X_2)$ slučajna varijabla. Na isti način pokažemo i za sve ostale funkcije osim $\frac{X_1}{X_2}$ i $|X_1|^c$ (za $c \leq 0$), koje općenito ne moraju biti definirane na cijelom skupu Ω . Međutim, $\frac{X_1}{X_2}$ je definirana na

$$\Omega \setminus \{\omega \in \Omega \mid X_2(\omega) = 0\}.$$

Uvažavajući Napomenu 1.2.8, analogno kao gore pokažemo kako je $\frac{X_1}{X_2}$ slučajna varijabla. Slično i za $|X_1|^c$. \square

Korolar 1.2.10.

X je slučajna varijabla na Ω ako i samo ako su X^+ i X^- slučajne varijable na Ω .

Propozicija 1.2.11.

Neka su X_1 i X_2 slučajne varijable na Ω . Tada je svaki od sljedećih skupova također događaj

$$A := \{\omega \mid X_1(\omega) < X_2(\omega)\},$$

$$B := \{\omega \mid X_1(\omega) = X_2(\omega)\},$$

$$C := \{\omega \mid X_1(\omega) \leq X_2(\omega)\}.$$

Dokaz. Neka je Y dan s $Y(\omega) = X_1(\omega) - X_2(\omega)$. Prema Teoremu 1.2.9, Y je slučajna

varijabla. Sada jednostavno imamo

$$\begin{aligned} A &= Y^{-1}(\langle -\infty, 0 \rangle), \\ B &= Y^{-1}(\{0\}), \\ C &= Y^{-1}(\langle -\infty, 0 \rangle]. \end{aligned}$$

□

Teorem 1.2.12.

Neka je $(X_n)_n$ niz slučajnih varijabli na Ω .

(i) Funkcije

$$\sup_n X_n, \quad \inf_n X_n, \quad \overline{\lim}_n X_n, \quad \underline{\lim}_n X_n$$

su slučajne varijable, a skup svih točaka iz Ω za koje niz $(X_n)_n$ konvergira je događaj.

(ii) Ako niz $(X_n)_n$ konvergira prema funkciji X na Ω , tada je i X slučajna varijabla na Ω .

Dokaz. (i) Stavimo $X(\omega) := \sup_n X_n(\omega)$. Tvrđimo kako je za $x \in \mathbb{R}$ skup $\{X \leq x\}$ događaj. Zaista,

$$\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\} = \left\{ \omega \in \Omega \mid \sup_n X_n(\omega) \leq x \right\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{\omega \in \Omega \mid X_n(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}.$$

Budući je $x \in \mathbb{R}$ bio proizvoljan, a skupovi oblika $\langle -\infty, x \rangle$ generiraju \mathcal{B}_r , tvrdnja slijedi. Time smo pokazali kako je $\sup_n X_n$ slučajna varijabla. Preko zapisa

$$\inf_n (X_n) = -\sup_n (-X_n), \quad \overline{\lim}_n X_n = \inf_k (\sup_{n \geq k} X_k), \quad \underline{\lim}_n X_n = \sup_k (\inf_{n \geq k} X_k)$$

vidimo kako su i ostala preslikavanja slučajne varijable. Konačno,

$$\{X_n \text{ konvergira}\} = \left\{ \omega \in \Omega \mid \overline{\lim}_n X_n(\omega) = \underline{\lim}_n X_n(\omega) \right\},$$

što je događaj prema Propoziciji 1.2.11.

(ii) Uz dane pretpostavke imamo $X = \overline{\lim}_n X_n = \underline{\lim}_n X_n$, tako da je X slučajna varijabla prema (i). □

Definicija 1.2.13. Za slučajnu varijablu X kažemo kako je **jednostavna** ako je $X(\Omega)$ konačan skup.

Napomena 1.2.14.

Lako je za vidjeti kako je X jednostavna slučajna varijabla ako i samo ako postoji dekompozicija

$$X = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbf{1}_{A_k},$$

pri čemu su $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, a A_1, \dots, A_n međusobno disjunktni događaji (koji pokrivaju Ω).

Teorem 1.2.15.

Neka je X nenegativna slučajna varijabla na Ω . Tada postoji rastući niz $(X_n)_n$ nenegativnih jednostavnih slučajnih varijabli td.

$$X = \lim_n X_n$$

(točkovni limes na Ω).

Dokaz. Definiramo

$$X_n(\omega) = \begin{cases} \frac{k-1}{2^n} & \text{ako je } \frac{k-1}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k}{2^n}, \quad k = 1, \dots, n2^n \\ n & \text{ako je } X(\omega) \geq n. \end{cases}$$

Uočimo kako je X_n nenegativna jednostavna slučajna varijabla. Prema konstrukciji, $(X_n)_n$ je rastući niz (po točkama). U slučaju da je $X(\omega) < n$, vrijedi

$$|X_n(\omega) - X(\omega)| < \frac{1}{2^n},$$

tako da je $X = \lim_n X_n$. □

Napomena 1.2.16.

- (a) Prethodni teorem vrijedi i u slučaju da X poprima vrijednost i $+\infty$.
- (b) Ako je X ograničena slučajna varijabla, može se pokazati kako je prethodna konvergencija uniformna.

Korolar 1.2.17.

Ako je X slučajna varijabla na Ω , tada je ona limes niza jednostavnih slučajnih varijabli.

Jednostavne slučajne varijable ćemo koristiti za bazu “Lebesgueove indukcije” (sjetimo se definicije Lebesgueovog integrala).

Definicija 1.2.18. Ako neko svojstvo koje ovisi o točkama skupa Ω vrijedi u svim točkama od Ω , osim eventualno podskupa od Ω koji je događaj vjerojatnosti nula, kažemo kako je to svojstvo ispunjeno **gotovo sigurno** i pišemo da je to svojstvo ispunjeno (g.s.).

Dakle, postoji $A \in \mathcal{F}$ td. $\mathbb{P}(A) = 1$ te dotično svojstvo vrijedi u točkama $\omega \in A$.

Definicija 1.2.19. Ako su X, Y slučajne varijable, kažemo kako su one jednake **gotovo sigurno** ako je

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = Y(\omega)\}) = 1.$$

Pisat ćemo $X = Y$ (g.s.).

Definicija 1.2.20. Kažemo kako niz slučajnih varijabli $(X_n)_n$ na Ω **konvergira gotovo sigurno** prema funkciji $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (ili $\overline{\mathbb{R}}$) ako vrijedi

$$\mathbb{P}\left(\left\{\omega \in \Omega \mid \lim_n X_n(\omega) = X(\omega)\right\}\right) = 1.$$

Pišemo $X_n \xrightarrow{\text{g.s.}} X$.

Napomena 1.2.21.

Kako je (g.s.) limes jedinstven, uvodimo sljedeću konvenciju. (g.s.) limes X ima vrijednost $\lim_n X_n(\omega)$ u točkama iz Ω gdje imamo konvergenciju, a vrijednost 0 na preostalim točkama.

Propozicija 1.2.22.

Ako niz slučajnih varijabli $(X_n)_n$ konvergira (g.s.) prema X , onda je i X slučajna varijabla.

Definicija 1.2.23. **σ -algebra inducirana slučajnom varijablom** X , koju ćemo označavati sa $\sigma(X)$, definirana je sa

$$\sigma(X) := X^{-1}(\mathcal{B}).$$

Definicija 1.2.24. Neka je $\mathcal{T} = \{X_i \mid i \in I\}$ proizvoljna familija slučajnih varijabli (definirana na istom vjerojatnosnom prostoru). **σ -algebra inducirana familijom** I , definirana je sa

$$\sigma(\mathcal{T}) := \sigma\left(\bigcup_{i \in I} \sigma(X_i)\right).$$

Teorem 1.2.25.

Neka su X, Y slučajne varijable na Ω . Tada vrijedi

$$\sigma(Y) \subseteq \sigma(X) \iff \text{postoji Borelova funkcija } g \text{ td. } Y = g(X).$$

Dokaz. $\boxed{\Leftarrow}$ $\sigma(Y) = (g(X))^{-1}(\mathcal{B}) = X^{-1}(g^{-1}(\mathcal{B})) \subseteq X^{-1}(\mathcal{B}) = \sigma(X)$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Dokazujemo Lebesgueovom indukcijom.

Pretpostavimo prvo $Y = \mathbf{1}_C$, $C \in \sigma(X)$. Tada je $C = X^{-1}(A)$, za neki $A \in \mathcal{B}$. Definiramo $g = \mathbf{1}_A$ koja je očito Borelova funkcija i vrijedi

$$g(X) = \mathbf{1}_{\{X \in A\}} = \mathbf{1}_C = Y.$$

Neka je $Y = \sum_{j=1}^n y_j \mathbf{1}_{C_j}$. Prema dokazanome, za $j = 1, \dots, n$ postoji Borelova funkcija g_j td. je $g_j(X) = \mathbf{1}_{C_j}$. Onda imamo

$$g(X) = \left(\sum_{j=1}^n y_j g_j \right) (X) = \sum_{j=1}^n y_j g_j(X) = Y.$$

Konačno, neka je Y po volji. Prema Korolaru 1.2.17, postoji niz jednostavnih slučajnih varijabli na Ω td. $Y = \lim_n Y_n$. Prema dokazanome, za sve $n \in \mathbb{N}$ postoji Borelova funkcija g_n td. je $Y_n = g_n(X)$. Definiramo $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s

$$g(x) = \begin{cases} \lim_n g_n(x) & \text{ako limes postoji} \\ 0 & \text{inače.} \end{cases}$$

Lako se vidi kako je g Borelova funkcija te kako vrijedi $Y = g(X)$. \times

□

2 Funkcije distribucije

§2.1 Definicije i osnovna svojstva. Funkcije distribucije slučajnih varijabli

Definicija 2.1.1. Neka je $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ slučajna varijabla. Za preslikavanje $P_X: \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \rightarrow [0, 1]$ dano s

$$P_X(B) := \mathbb{P}(X \in B)$$

kažemo kako je **zakon razdiobe** od X .

Lako se vidi kako je P_X vjerojatnost na $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$.


Definicija 2.1.2. Za preslikavanje $F_X: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ dano s

$$F_X(x) := P_X(\langle -\infty, x \rangle) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

kažemo kako je **funkcija distribucije** od X .

Napomena 2.1.3.

Navedimo osnovna svojstva funkcije distribucije. Korisno je imati graf na pameti, npr.



(a) F_X je neopadajuća. Zaista, neka su $a_1 \leq a_2 \in \mathbb{R}$. Onda imamo

$$\begin{aligned} \langle -\infty, a_1 \rangle &\subseteq \langle -\infty, a_2 \rangle \implies X^{-1}(\langle -\infty, a_1 \rangle) \subseteq X^{-1}(\langle -\infty, a_2 \rangle) \\ &\implies (X \leq a_1) \subseteq (X \leq a_2) \\ &\implies \mathbb{P}(X \leq a_1) \subseteq \mathbb{P}(X \leq a_2) \\ &\implies F_X(a_1) \leq F_X(a_2). \end{aligned}$$

(b) F_X je neprekidna zdesna. Zaista, neka je $a \in \mathbb{R}$ te neka je $(a_n)_n$ nerastući niz u \mathbb{R} koji konvergira u a . Imamo

$$\langle -\infty, a_1 \rangle \supseteq \langle -\infty, a_2 \rangle \supseteq \langle -\infty, a_3 \rangle \cdots \supseteq \langle -\infty, a \rangle$$

iz čega lako slijedi

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \langle -\infty, a_n \rangle = \langle -\infty, a \rangle.$$

Onda imamo

$$\begin{aligned} F_X(a) &= \mathbb{P}(X^{-1}(\langle -\infty, a \rangle)) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} X^{-1}(\langle -\infty, a_n \rangle)\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X^{-1}(\langle -\infty, a_n \rangle)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(a_n). \end{aligned}$$

(c) F_X ima limese u beskonačnosti. Štoviše, vrijedi

$$F_X(-\infty) := \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0 \quad F_X(\infty) := \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1.$$

Pokažimo npr. prvu izreku. Budući je F_X neopadajuća, dovoljno je pokazati kako je 0 jedini kandidat za limes^a. Neka je $(a_n)_n$ nerastući niz u \mathbb{R} koji konvergira u $-\infty$ ^b. Slično kao u (b), imamo

$$\langle -\infty, a_1 \rangle \supseteq \langle -\infty, a_2 \rangle \supseteq \langle -\infty, a_3 \rangle \dots$$

iz čega lako slijedi

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \langle -\infty, a_n \rangle = \langle -\infty, a \rangle.$$

Onda imamo

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(a_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X^{-1}(\langle -\infty, a_n \rangle)) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} X^{-1}(\langle -\infty, a_n \rangle)\right) \\ &= \mathbb{P}(\emptyset) = 0. \end{aligned}$$

^aNaime, monotona funkcija $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uvijek ima limese (u $\overline{\mathbb{R}}$) u beskonačnosti.

^bNekad kažemo i kako $(a_n)_n$ divergira u $-\infty$.

Napomena 2.1.4.

F_X ima limese slijeva. Da je tome tako zapravo znamo iz matematičke analize 1 i 2. Pišemo

$$F_X(a-) = \lim_{x \rightarrow a-} F_X(x) \quad F_X(a+) = \lim_{x \rightarrow a+} F_X(x).$$

Neka je sada $(a_n)_n$ neopadajući niz u \mathbb{R} td. $a_n \nearrow a$ i $a_n < a$ za sve $n \in \mathbb{N}$. Tada

vrijedi $F_X(a-) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(a_n)$ pa imamo $F_X(a-) \leq F_X(a)$. Dakle, za sve $a \in \mathbb{R}$ vrijedi

$$F_X(a-) \leq F_X(a) \leq F_X(a+).$$

Posebno, F_X je neprekidna u a ako i samo ako vrijedi $F_X(a-) = F_X(a)$. Ukoliko F_X ima prekid u točki a , tada je to prekid prve vrste i vrijedi $F_X(a) \geq F_X(a-)$. Time smo pokazali

$$F_X \text{ ima prekid u točki } a \in \mathbb{R} \iff \mathbb{P}(X = a) > 0.$$

Prema tome, skup $\{a \in \mathbb{R} \mid \mathbb{P}(X = a) > 0\}$ je najviše prebrojiv^a. ✕

^aNaime, monotona funkcija $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ima najviše prebrojivo mnogo prekida.

Neka su X, Y slučajne varijable. Definiramo relaciju \sim s

$$X \sim Y \text{ ako } P_X = P_Y.$$

Očito $P_X = P_Y \implies F_X = F_Y$.

Vrijedi li obrat? Da!

Teorem 2.1.5.

Ako su X, Y slučajne varijable (ne nužno na istom vjerojatnosnom prostoru) td. $F_X = F_Y$, onda vrijedi $P_X = P_Y$.

Prije dokaza teorema izvesti ćemo par pomoćnih rezultata.

Pretpostavimo $F_X = F_Y$. Onda za svaki poluotvoreni interval $\langle a, b \rangle$ vrijedi

$$P_X(\langle a, b \rangle) = F_X(b) - F_X(a) = F_Y(b) - F_Y(a) = P_Y(\langle a, b \rangle),$$

tako da se P_X i P_Y podudaraju na poluotvorenim intervalima. Nadalje, imamo

$$\langle a, b \rangle \cap \langle c, d \rangle = \begin{cases} \emptyset \\ \text{poluotvoreni interval} \end{cases}.$$

Dakle, klasa koja sadrži prazan skup i poluotvorene intervale zatvorena je na konačne presjeke.

Definicija 2.1.6. Neka je $\Omega \neq \emptyset$ i \mathcal{C} neprazna familija podskupova od Ω . Reći ćemo kako je \mathcal{C} **π -sistem** ako vrijedi $A, B \in \mathcal{C} \implies A \cap B \in \mathcal{C}$.

Napomena 2.1.7.

Uočimo kako π -sistem ne mora sadržavati prazan skup. Nadalje, ako u \mathcal{C} postoje bar dva disjunktne skupa, tada \mathcal{C} mora sadržavati i prazan skup.

Definicija 2.1.8. Neka je $\Omega \neq \emptyset$ i \mathcal{D} familija podskupova od Ω . Reći ćemo kako je \mathcal{D} **Dynkinova klasa** ako vrijedi

- (i) $\Omega \in \mathcal{D}$.
- (ii) $A, B \in \mathcal{D}$ i $A \subseteq B \implies B \setminus A \in \mathcal{D}$.
- (iii) Ako je $(A_n)_n$ neopadajući niz u \mathcal{D} , onda vrijedi $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{D}$.

Napomena 2.1.9.

Ako je \mathcal{D} π -sistem i Dynkinova klasa, tada je \mathcal{D} σ -algebra.

Za $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, s $\mathcal{D}(\mathcal{E})$ označavamo najmanju Dynkinovu klasu koja sadrži familiju \mathcal{E} .

Teorem 2.1.10.

Ako je $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ π -sistem, tada je $\mathcal{D}(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$.

Dokaz. Svaka σ -algebra je i Dynkinova klasa, tako da je dovoljno dokazati kako je $\mathcal{D}(\mathcal{C})$ π -sistem. Definiramo

$$\mathcal{D}_1 := \{A \in \mathcal{D}(\mathcal{C}) \mid A \cap B \in \mathcal{D}(\mathcal{C}), \text{ za sve } B \in \mathcal{C}\}.$$

Lako vidimo inkluziju $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}_1$. Tvrđimo kako je \mathcal{D}_1 Dynkinova klasa.

- $\Omega \cap B = B \implies \Omega \in \mathcal{D}_1$.
- $B_1, B_2 \in \mathcal{D}_1$, $B_1 \subseteq B_2$ te $B \in \mathcal{C}$. Vrijedi

$$(B_2 \setminus B_1) \cap B = (B_2 \cap B) \setminus (B_1 \cap B).$$

Dakle, $B_2 \setminus B_1 \in \mathcal{D}_1$.

- Slično, za DZ.

Dakle, \mathcal{D}_1 je Dynkinova klasa, tako da je $\mathcal{D}_1 = \mathcal{D}(\mathcal{C})$. Stoga, za sve $A \in \mathcal{D}(\mathcal{C})$ i sve $B \in \mathcal{C}$ vrijedi $A \cap B \in \mathcal{D}(\mathcal{C})$. Definiramo

$$\mathcal{D}_2 := \{A \in \mathcal{D}(\mathcal{C}) \mid A \cap B \in \mathcal{D}(\mathcal{C}), \text{ za sve } B \in \mathcal{D}(\mathcal{C})\}.$$

Lako vidimo inkluziju $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}_2$. Prema tome, dovoljno je dokazati kako je \mathcal{D}_2 Dynkinova klasa. Ovo vidimo na sličan način kao za \mathcal{D}_1 . Onda je $\mathcal{D}_2 = \mathcal{D}(\mathcal{C})$ pa je $\mathcal{D}(\mathcal{C})$ π -sistem. \square

Teorem 2.1.11.

Neka je (Ω, \mathcal{F}) izmjeriv prostor i neka je \mathcal{C} π -sistem koji je generirajuća klasa za \mathcal{F} . Ako su P, Q vjerojatnosne mjere na (Ω, \mathcal{F}) , tada vrijedi

$$P = Q \iff P|_{\mathcal{C}} = Q|_{\mathcal{C}}.$$

Dokaz. \implies Očito.

\impliedby Definiramo klasu

$$\mathcal{D} := \{A \in \mathcal{F} \mid P(A) = Q(A)\}.$$

Tvrdimo kako je \mathcal{D} Dynkinova klasa.

- $P(\Omega) = 1 = Q(\Omega) \implies \Omega \in \mathcal{D}$.
- Neka su $A, B \in \mathcal{D}$ te $A \subseteq B$. Imamo

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A) = Q(B) - Q(A) = Q(B \setminus A).$$

pa imamo $B \setminus A \in \mathcal{D}$.

- Neka je $(A_n)_n$ neopadajući niz u \mathcal{D} . Imamo

$$P\left(\bigcup_n A_n\right) = \lim_n P(A_n) = \lim_n Q(A_n) = Q\left(\bigcup_n A_n\right) \implies \bigcup_n A_n \in \mathcal{D}.$$

Dakle, \mathcal{D} je Dynkinova klasa, a po pretpostavci je $\mathcal{D} \supseteq \mathcal{C}$, tako da je $\mathcal{D} \supseteq \mathcal{D}(\mathcal{C})$. Po Teoremu 1.3.10 imamo $\mathcal{D}(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F} \implies \mathcal{D} = \mathcal{F} \implies P = Q$. \square

Dokaz Teorema 1.3.5. Pretpostavimo $F_X = F_Y$. Onda imamo

$$P_X|_{\mathcal{C}} = P_Y|_{\mathcal{C}},$$

pri čemu je $\mathcal{C} = \{\emptyset\} \cup \{\langle a, b] \mid a < b\}$, što je π -sistem. Uočimo $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Prema Teoremu 1.3.11 vrijedi $P_X = P_Y$. \square

Sada okrećemo pitanje; koje od funkcija jesu funkcije distribucije?

Napomena 2.1.12.

Kada imamo mjeru (vjerojatnost), nalaženje slučajne varijable s tim zakonom razdiobe nije problem.

Neka je \mathbb{P} vjerojatnost na $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$. Je li ona zakon razdiobe neke slučajne varijable? Da! Uzmimo vjerojatnosni prostor $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \mathbb{P})$ i definiramo $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ kao identitetu, tj. $X(\omega) = \omega$. Lako vidimo kako je X izmjeriva te vrijedi

$$P_X(\langle a, b \rangle) = P(X \in \langle a, b \rangle) = P(\langle a, b \rangle),$$

tako da je \mathbb{P} zakon razdiobe slučajne varijable X . Pitanje se svodi na nalaženje funkcija koje mogu generirati vjerojatnosnu mjeru na $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$.

Krenimo od klase funkcija $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ koje imaju sljedeća svojstva

- (i) F neopadajuća.
- (ii) F neprekidna zdesna.
- (iii) F ima limese u beskonačnosti; $F(-\infty) = 0$, $F(\infty) = 1$.

Započnimo s poluotvorenim intervalima $\langle a, b \rangle$. Definiramo $P_F(\langle a, b \rangle) = F(b) - F(a)$. Uočimo odmah $P_F(\langle a, b \rangle) \in [0, 1]$. Stavimo nadalje $P_F(\emptyset) = 0$. Familija

$$\{\emptyset\} \cup \{\langle a, b \rangle \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$$

je π -sistem. Pitanje je možemo li uvijek razumno proširiti funkciju s π -prstena na σ -algebru tako da dobijemo mjeru? Ne, treba nam jača struktura!

Definicija 2.1.13. Neka je $\Omega \neq \emptyset$ i \mathcal{S} neprazna familija podskupova od Ω . Reći ćemo kako je \mathcal{S} **poluprsten skupova** ako vrijedi

- (i) $A, B \in \mathcal{S} \implies A \cap B \in \mathcal{S}$.
- (ii) $\emptyset \in \mathcal{S}$.
- (iii) $A, B \in \mathcal{S}, A \subseteq B \implies$ postoji $n \in \mathbb{N}$ i međusobno disjunktni $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{S}$ td.

$$B \setminus A = \bigcup_{i=1}^n E_i.$$

Definicija 2.1.14. Neka je $\Omega \neq \emptyset$ i \mathcal{C} neprazna familija podskupova od Ω te neka je $\mu: \mathcal{C} \rightarrow [0, +\infty)$. Reći ćemo kako je μ **konačno aditivna** ako vrijedi

- (i) $\mu(\emptyset) = 0$.
- (ii) Ako su $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{C}$ međusobno disjunktni td. $A_1 \cup \dots \cup A_n \in \mathcal{C}$, onda vrijedi

$$\mu(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i).$$

Definicija 2.1.15. Neka je $\Omega \neq \emptyset$ i \mathcal{R} neprazna familija podskupova od Ω . Reći ćemo kako je \mathcal{R} **prsten skupova** ako je zatvoren na konačnu upotrebu operacija $\cup, \cap, \setminus, \Delta$.

Za $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, s $\mathcal{R}(\mathcal{E})$ označavamo najmanji prsten skupova koja sadrži familiju \mathcal{E} .

Propozicija 2.1.16.

Neka je \mathcal{S} poluprsten skupova na Ω . Tada vrijedi

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) = \left\{ \bigcup_{i=1}^m E_i \mid m \in \mathbb{N}, \{E_1, \dots, E_m\} \subseteq \mathcal{S} \text{ međusobno disjunktni} \right\}.$$

Dokaz. Inkluzija $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{S})$ je očita, drugu inkluziju za DZ. \square

Pretpostavimo kako imamo konačno aditivnu funkciju $\mu: \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty)$. Imamo jedinstveno proširenje μ sa \mathcal{S} na $\mathcal{R}(\mathcal{S})$; definiramo $\tilde{\mu}: \mathcal{R}(\mathcal{S}) \rightarrow [0, \infty)$ s

$$\tilde{\mu}(A) = \tilde{\mu}(E_1 \cup \dots \cup E_n) := \sum_{i=1}^n \mu(E_i).$$

Ovdje naravno treba pokazati kako je definicija dobra, tj. kako ne ovisi o izboru predstavnika. Nadalje, trebamo dokazati kako je $\tilde{\mu}$ konačno aditivna funkcija, dok je iz same definicije jasno kako se radi o jedinstvenom proširenju. Konačno, ako je μ σ -aditivna, onda je i $\tilde{\mu}$ σ -aditivna. Sve ove tvrdnje treba provjeriti za DZ.

Vratimo se našem starom pitanju u terminu ovih pojmova; ako imamo σ -aditivnu funkciju na prstenu, možemo li je na jedinstven način proširiti do σ -aditivne funkcije na generiranom σ -prstenu? Da! Radi se naravno o Caratheodoryjevoj konstrukciji. \times

Definicija 2.1.17. Neka je $\Omega \neq \emptyset$. **Vanjska mjera** na Ω je funkcija $m^*: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, \infty]$ td. vrijedi

- (i) $m^*(\emptyset) = 0$.
- (ii) m^* je monotona.
- (iii) m^* je σ -poluaditivna. Napiši.

Za $B \subseteq \Omega$ kažemo kako je **izmjeriv** ako za sve $A \subseteq \Omega$ vrijedi

$$m^*(A) = m^*(A \cap B) + m^*(A \cap B^c).$$

Označimo $\mathcal{M}_{m^*} := \{B \subseteq \Omega \mid B \text{ izmjeriv}\}$.

Teorem 2.1.18.

Ako je m^* vanjska mjera na Ω , tada je \mathcal{M}_{m^*} σ -algebra na Ω i $m^*|_{\mathcal{M}_{m^*}}$ je mjera.

Ovu konstrukciju smo već vidjeli na mjeri i integralu i sada ćemo je iskoristiti kako bi zaokružili naš opis funkcija distribucije.

Neka je μ σ -aditivna funkcija na prstenu \mathcal{R} ; definiramo $\mu^*: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, +\infty]$ s

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{+\infty} \mu(E_i) \mid (E_i)_i \text{ niz u } \mathcal{R} \text{ td. } E \subseteq \bigcup_i E_i \right\}.$$

- Za $E_1 = E$ i $E_n = \emptyset$ za $n \geq 2$ dobivamo $\mu^*(E) \leq \mu(E)$. S druge strane, iz σ -aditivnosti slijedi σ -poluaditivnost pa imamo $\mu(E) \leq \mu^*(E)$. Sve zajedno, imamo $\mu^*|_{\mathcal{R}} = \mu$.
- $\emptyset \in \mathcal{R}$ pa onda $\mu^*(\emptyset) = \mu(\emptyset) = 0$.
- Neka je $A \subseteq B$ te neka je $(E_i)_i$ niz u \mathcal{R} td. $B \subseteq \bigcup_i E_i$. Onda imamo $A \subseteq \bigcup_i E_i$ što povlači $\mu^*(A) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \mu(E_i)$ pa imamo $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.
- Neka je $A \subseteq \bigcup_i B_i$ te neka je $(E_j^i)_{i,j}$ niz u \mathcal{R} td. $B_i \subseteq \bigcup_j E_j^i$. Onda imamo $A \subseteq \bigcup_j \bigcup_i E_j^i$ što povlači $\mu^*(A) \leq \sum_{i,j} \mu(E_j^i)$. Rastavljanjem ove sume¹ slijedi $\mu^*(A) \leq \sum_i \left(\sum_j \mu(E_j^i) \right)$ pa imamo $\mu^*(A) \leq \sum_i \mu^*(B_i)$.

Za DZ dokazati $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{M}_{m^*}$.

$$\mu \longrightarrow \mu^* \longrightarrow \mathcal{M}_{\mu^*}$$

Caratheodory i gornji zadatak daju kako je $\mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ mjera te $\sigma_p(\mathcal{R}) \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*}$. Pritom sa $\sigma_p(\mathcal{R})$ označavamo najmanji σ -prsten² koji sadrži \mathcal{R} . Iz ovoga onda slijedi kako je \mathcal{M}_{μ^*} σ -algebra koja sadrži \mathcal{R} ; $\mu^*|_{\sigma_p(\mathcal{R})}$ i $\mu^*|_{\mathcal{R}}$ su mjere. Dakle, $\mu^*|_{\sigma_p(\mathcal{R})}$ je proširenje od μ .

Sistematizirajmo što smo napravili do sada. Imamo $\Omega \neq \emptyset$ te \mathcal{F} σ -algebru na Ω (dakle, (Ω, \mathcal{F}) je izmjeriv prostor). Neka je nadalje \mathcal{S} poluprsten td. $\sigma_p(\mathcal{S}) = \mathcal{F}$ te μ σ -aditivna funkcija na \mathcal{S} . Prvo ju možemo proširiti do mjere na $\mathcal{R}(\mathcal{S})$, a onda i do mjere na \mathcal{M}_{μ^*} . Imamo

$$\mathcal{S} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*} \implies \mathcal{F} = \sigma_p(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*}$$

pa je $\mu^*|_{\mathcal{F}}$ proširenje funkcije μ na mjeru na \mathcal{F} . Spojimo li ovaj rezultat s onim o jedinstvenosti proširenja dolazimo do

¹Ovo možemo zbog nenegativnosti.

²Prsten koji je zatvoren na prebrojive unije, ali ne nužno na komplementiranje. Npr. σ -prsten sadrži Ω je i σ -algebra

Teorem 2.1.19.

Neka je (Ω, \mathcal{F}) izmjeriv prostor i \mathcal{S} poluprsten na Ω t.d. je $\sigma_p(\mathcal{S}) = \mathcal{F}$. Ako je μ σ -aditivna funkcija na \mathcal{S} , onda postoji jedinstveno proširenje od μ na mjeru na \mathcal{F} .

Vratimo se sada na našu situaciju; uzmimo $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ za naš izmjeriv prostor te

$$\mathcal{S} = \{\langle a, b \rangle \mid a, b \in \mathbb{R}, a \leq b\}$$

za naš poluprsten (dopuštamo $a = b$ kako bi besplatno dobili i \emptyset). Lako vidimo $\sigma_p(\mathcal{S}) = \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Neka je sada $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ neopadajuća funkcija, neprekidna zdesna i koja ima limese u beskonačnosti; $F(-\infty) = 0$ i $F(\infty) = 1$. Pitamo se generira li F mjeru na $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$, tj. je li funkcija distribucije neke slučajne varijable.

Definiramo mjeru μ_F na \mathcal{S} . Stavimo

$$\mu_F(\langle a, b \rangle) = F(b) - F(a);$$

iz monotonosti F slijedi $\mu_F(\langle a, b \rangle) \in [0, 1]$. Nadalje, lako dokažemo kako je μ_F monotona i konačno aditivna pa prelazimo na σ -aditivnost na \mathcal{S} . Neka je $\langle a_i, b_i \rangle$, $i \in \mathbb{N}$ niz međusobno disjunktih skupova; BSOMP kako su desni rubovi sljepljeni s narednim ljevim rubovima. Označimo onda

$$\langle a_0, b_0 \rangle = \bigcup_i \langle a_i, b_i \rangle.$$

Djelovanjem s μ_F , iz monotonosti i konačne aditivnosti slijedi $\mu_F(\langle a, b \rangle) \leq \sum_i \mu_F(\langle a_i, b_i \rangle)$. Za obrat imamo malo topološkog tretmana. Fiksirajmo $\varepsilon > 0$ po volji. Za sve $i \in \mathbb{N}$ onda imamo

$$\langle a_i, b_i \rangle \subseteq \left\langle a_i, b_i + \frac{\varepsilon}{2^i} \right\rangle \implies [a_0 + \varepsilon, b_0] \subseteq \bigcup_i \left\langle a_i, b_i + \frac{\varepsilon}{2^i} \right\rangle.$$

Kompaktnost daje konačan potpokrivač, iz čega brzo slijedi kako se $F(b_0) - F(a_0 + \varepsilon)$ podudara sa

$$\sum_{i=1}^{n_k} \left(F\left(b_i + \frac{\varepsilon}{2^i}\right) - F(a_i) \right).$$

Pustimo $\varepsilon \rightarrow 0$ pa iz neprekidnosti zdesna slijedi druga nejednakost. Dakle, μ_F je σ -aditivna na \mathcal{S} . Zajedno s Teoremom 1.3.19 (za izmjeriv prostor $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$) imamo

Teorem 2.1.20.

Za svaku funkciju $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ koja je neopadajuća, neprekidna zdesna i ima limese u beskonačnosti $F(-\infty) = 0$ i $F(\infty) = 1$ postoji jedinstvena vjerojatnost

\mathbb{P}_F na $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ td. za sve $a < b \in \mathbb{R}$ vrijedi

$$\mathbb{P}_F(\langle a, b \rangle) = F(b) - F(a).$$

Napomena 2.1.21.

Za Teorema 1.3.20 nam nedostaje jedino $\mathbb{P}_F(\mathbb{R}) = 1$, ali to lako imamo

$$\mathbb{P}_F(\mathbb{R}) = \lim_n \mathbb{P}_F(\langle -n, n \rangle) = \lim_n (F(n) - F(-n)) = F(\infty) - F(-\infty) = 1 - 0 = 1.$$

Time imamo potpun opis funkcija distribucije.

Ako je F neprekidna zdesna te znamo $F|_D$, pri čemu je D gust u \mathbb{R} , onda znamo i F (jer svaki $x \in \mathbb{R}$ možemo aproksimirati nerastućim nizom u D).

Korolar 2.1.22.

Ako su F_1 i F_2 vjerojatnosne funkcije distribucije i D gust skup u \mathbb{R} td. $F_1|_D = F_2|_D$, onda vrijedi $F_1 = F_2$.

Označimo $C(F) = \{x \in \mathbb{R} \mid F \text{ neprekidna u } x\}$. Tada je $\mathbb{R} \setminus C(F)$ najviše prebrojiv, tako da je $C(F)$ gust u \mathbb{R} .

Korolar 2.1.23.

Ako su F_1 i F_2 vjerojatnosne funkcije distribucije koje se podudaraju u točkama gdje su obje neprekidne, tj. vrijedi

$$F_1|_{C(F_1) \cap C(F_2)} = F_2|_{C(F_1) \cap C(F_2)},$$

onda vrijedi $F_1 = F_2$.

Dokaz. Imamo

$$\mathbb{R} \setminus (C(F_1) \cap C(F_2)) = \mathbb{R} \setminus C(F_1) \cup \mathbb{R} \setminus C(F_2),$$

što je prebrojiv skup, tako da je $C(F_1) \cap C(F_2)$ gust u \mathbb{R} . Tvrdnja sada slijedi iz Korolara 1.3.22. \square

$\mathbb{R} \setminus C(F)$ može biti prazan, u protivnom postoji niz $(x_n)_n$ (moguće konačan) td. $\mathbb{R} \setminus C(F) = \{x_n \mid n \in I\}$. U svakoj točki x_n onda vrijedi $\mathbb{P}_F(\{x_n\}) > 0$ (skok). Neka je

sada

$$\alpha = \sum_n \mathbb{P}_F(\{x_n\}) = \mathbb{P}_F(\mathbb{R} \setminus C(F)) \leq 1.$$

Definiramo

$$F_d := \underbrace{\frac{1}{\alpha} \sum_{x_n \leq x} \mathbb{P}_F(\{x_n\})}_G = \underbrace{\frac{1}{\alpha} \sum_{x_n \leq x} (F(x_n) - F(x_n-))}_G.$$

F_d je vjerojatnosna funkcija distribucije koja je oblika $\sum_{x_n \leq x} \frac{1}{\alpha} \mathbb{P}_F(\{x_n\})$. Reći ćemo kako je takva funkcija **diskretna** vjerojatnosna funkcija distribucije.

Definicija 2.1.24. Neka je X slučajna varijabla na $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ te neka je $D \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ td. $\mathbb{P}_X(D) = 1$. Reći ćemo kako je X **koncentrirana** na D .

Ako je X najviše prebrojiv, onda kažemo kako je X **diskretna** slučajna varijabla.

Napomena 2.1.25.

Budući F_d ima ukupne skokove mase 1, slučajna varijabla koja je u pozadini F_d je koncentrirana na $\{x_n \mid n \in I\}$, koji je najviše prebrojiv, tako da je ta slučajna varijabla diskretna. Imamo

$$\begin{aligned} X \text{ diskretna} &\iff F_X \text{ ima skokove na } D \text{ ukupne mase 1} \\ &\iff F_X(x) = \sum_{y \in D, y \leq x} \mathbb{P}(x = y) \quad (\text{poredak nebitan}). \end{aligned}$$

Neka je sada $H = F - G$. Onda je H neopadajuća funkcija, neprekidna zdesna i ima limese u beskonačnosti $F(-\infty) = 0$ i $F(\infty) = 1 - \alpha$. Jer F i G imaju prekide u istim točkama i to skokove iste veličine, slijedi kako je $H = F - G$ neprekidna u svakoj točki. Definiramo

$$F_n = \frac{1}{1 - \alpha} H.$$

Reći ćemo kako je F_n funkcija **neprekidna** vjerojatnosna funkcija distribucije. Imamo

$$F = \alpha F_d + (1 - \alpha) F_n,$$


što je konveksna kombinacija diskretne i neprekidne vjerojatnosne funkcije distribucije.

Primjer 2.1.26.

Bernoullijeva slučajna varijabla. Neka su $p, q > 0$ td. $p + q = 1$. Definiramo

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}.$$

Tada je X diskretna slučajna varijabla.



Što možemo reći o vjerojatnosnim funkcijama distribucije koje su neprekidne (kao funkcije)? Imat ćemo dvije pojave (od kojih je jedna očekivana).

Prisjetimo se kako smo do mjere \mathbb{P}_F došli tako što započeli s neopadajućom funkcijom, neprekidnom zdesna i koja ima odgovarajuće limese u beskonačnosti. Međutim, mogli smo krenuti i od funkcije G koja je neopadajuća i neprekidna zdesna te napraviti isti postupak;

$$\mu_G(\langle a, b \rangle) = G(b) - G(a) \geq 0.$$

Caratheodory i ostale konstrukcije još uvijek funkcioniraju (DZ), čime dobivamo mjeru μ_G na $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ za koju vrijedi

$$\mu_G(\mathbb{R}) = G(+\infty) - G(-\infty) \in [0, \infty].$$

Odmah uočavamo desni rub. Ipak, ako uzmemo $K \subseteq \mathbb{R}$ ograničen, imamo $\mu_G(K) < \infty$, a onda slijedi

$$\mu_G(\mathbb{R}) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} (G(k) - G(k-1)) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \underbrace{\mu_G(\langle k-1, k \rangle)}_{< \infty}.$$

Dakle, μ_G je σ -konačna. Nadalje, uočimo kako mjeru možemo centrirati. Preciznije, za $c \in \mathbb{R}$ imamo $\mu_{G+c} = \mu_G$.

Primjer 2.1.27.

Neka je $G(x) = x$, tako da vrijedi $\mu_G(\langle a, b \rangle) = b - a$. Jer je G neprekidna slijedi $\mu_G(\{x\}) = 0$ pa imamo

$$\mu_G([a, b]) = \mu_G([a, b)) = \mu_G(\langle a, b \rangle) = b - a.$$

Mjeru μ_G zovemo Lebesgueova mjera i označavamo ju s λ .

Ponoviti ćemo i konstrukciju Lebesgueovog integrala. Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ prostor σ -konačne mjere, dakle $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty]$ je σ -aditivna funkcija te postoji niz $(A_n)_n$ u \mathcal{F} koji pokriva Ω td. za sve $n \in \mathbb{N}$ vrijedi $\mu(A_n) < +\infty$.

- Jednostavne funkcije

$$\int_{\Omega} \mathbf{1}_A d\mu = \mu(A).$$

- Linearnost

$$f = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{A_k} \implies \int_{\Omega} f d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k).$$

- $(f_n)_n$ integrabilne i $f_1 \leq f_2 \leq \dots \implies$ postoji $f := \lim_n f_n$, ali može poprimiti i vrijednost $+\infty$ (konvencija $0 \cdot (+\infty) = 0$). Neka je $f^{-1}\left(\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right)\right) = A_{k,n}$, što je izmjeriv skup, budući je f izmjeriva funkcija. Slijedi

$$\sum_{k=1}^{n^2} \left(\frac{k-1}{n} A_{k,n} \right) = f_n.$$

Neka je $x \in \Omega$ po volji. Za sve $n \in \mathbb{N}$ postoji jedinstveni $k \in \mathbb{N}$ td. $x \in A_{k,n}$ td. vrijedi $|f(x) - f_n(x)| < \frac{1}{n}$ pa imamo

$$nf^{-1}(f > n) + \sum_{k=1}^{n^2} \left(\frac{k-1}{n} A_{k,n} \right) = f_n.$$

Stoga je definicija

$$\int_{\Omega} f d\mu := \lim_n \int_{\Omega} f_n d\mu$$

dobra; za svaku nenegativnu izmjerivu funkciju f postoji $\int_{\Omega} f d\mu \in [0, +\infty]$.

- Neka je sada $f: \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ izmjeriva funkcija. Tada vrijedi $f = f^+ - f^-$ po točkama te su f^+ i f^- nenegativne i izmjerive funkcije. Prema pokazanom, postoje integrali $\int_{\Omega} f^+ d\mu$ i $\int_{\Omega} f^- d\mu$.

Reći ćemo kako za funkciju f **postoji integral** ako je barem jedan od integrala $\int_{\Omega} f^+ d\mu$ i $\int_{\Omega} f^- d\mu$ konačan. Reći ćemo kako je funkcija f **integrabilna** ako su oba integrala $\int_{\Omega} f^+ d\mu$ i $\int_{\Omega} f^- d\mu$ konačna. U oba slučaja definiramo

$$\int_{\Omega} f d\mu := \int_{\Omega} f^+ d\mu - \int_{\Omega} f^- d\mu.$$

Napomena 2.1.28.

$$f \text{ integrabilna} \iff f^+ \text{ i } f^- \text{ integrabilne} \stackrel{\text{linearnost}}{\iff} |f| \text{ integrabilna.}$$

Na mjeri i integralu smo dokazali teoreme o monotonij i dominiranoj konvergenciji.

Teorem 2.1.29.

Neka su $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ izmjerive funkcije. Tada je f integrabilna te vrijedi

$$\int_{\Omega} \lim_n f_n d\mu = \lim_n \int_{\Omega} f_n d\mu.$$

Teorem 2.1.30.

Neka je $(f_n)_n$ niz izmjerivih funkcija t.d. postoji integrabilna funkcija h t.d. za sve $n \in \mathbb{N}$ vrijedi $|f_n| \leq h$. Pretpostavimo kako postoji $f = \lim_n f_n$ (g.s.). Tada je f integrabilna te vrijedi

$$\int_{\Omega} \lim_n f_n d\mu = \lim_n \int_{\Omega} f_n d\mu.$$

Vratimo se sada na vjerojatnosnu situaciju, zanima nas integral u odnosu na $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \lambda)$.

Teorem 2.1.31.

Neka je $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ograničena funkcija. Tada je f Riemann integrabilna ako i samo ako je f neprekidna osim možda na skupu λ -mjere 0.

Primjer 2.1.32.

(a) R-integrabilnost \implies L-integrabilnost. Štoviše, pripadni integrali se podudaraju.

Npr. ako je funkcija f po dijelovima neprekidna ili po dijelovima monotona, onda je R-integrabilna pa je i L-integrabilna.

(b) L-integrabilnost $\not\Rightarrow$ R-integrabilnost.

Klasični primjer je funkcija $\mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ koja nije R-integrabilna, ali vrijedi

$$\int_{[0,1]} \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]} = \lambda(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0 < +\infty$$

pa je L-integrabilna.

Primjer 2.1.33.

Promotrimo funkciju

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{(a,b)}.$$

Tada je funkcija $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ neopadajuća, neprekidna zdesna i ima limese u beskonačnosti $F(-\infty) = 0$ i $F(\infty) = 1$. Onda je \mathbb{P}_F vjerojatnost ($\mathbb{P}_F(\langle a, b \rangle) = 1$). Takvu mjeru nismo mogli naći na partitivnom skupu, ali sada možemo. Za \mathbb{P}_F kažemo kako je uniformna vjerojatnosna distribucija na $[a, b]$ te za $\langle c, d \rangle \subseteq \langle a, b \rangle$ vrijedi

$$\mathbb{P}_F(\langle c, d \rangle) = \frac{d - c}{b - a}.$$

Takvu distribuciju imamo na skupu $\{1, \dots, n\}$, ali ne i na \mathbb{N} .

Definicija 2.1.34. Reći ćemo kako je funkcija distribucije F **apsolutno neprekidna** ako postoji nenegativna Borel–izmjeriva funkcija f td. za sve $x \in \mathbb{R}$ vrijedi

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)\lambda(dt).$$


Očito je f i neprekidna kao funkcija. Za funkciju f kažemo kako je **funkcija gustoće** distribucije F .

Kada govorimo o slučajnim varijablama, za slučajnu varijablu X imamo F_X , funkciju distribucije slučajne varijable X te f_X , funkciju gustoće slučajne varijable X . ✕


Prisjetimo se kako nas trenutno interesiraju one vjerojatnosne funkcije distribucije koje su neprekidne kao funkcije.

Primjer 2.1.35.

- (a) Uniformna razdioba, opet. Neka su $a < b \in \mathbb{R}$ te neka je f funkcija dana grafom



Tada je funkcija $F_X = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ dana grafom



(b) Normalna razdioba. Neka su $m, \sigma \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. Definiramo

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}.$$

pa je pripadna vjerojatnosna funkcija distribucije

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt.$$

U računu se pojavljuje zloglasna funkcija $x \mapsto \int_{-\infty}^x e^{-t^2} dt$.

Napomena 2.1.36.

Uveli smo termin “apsolutna neprekidnost”. I ovdje se radi o konceptu kojeg smo već sreli na mjeri i integralu, a vezan je uz Radon–Nikodymovu teoriju.

Neka su μ, ν dvije mjere na izmjerivom prostoru (Ω, \mathcal{F}) . Tada je μ **apsolutno neprekidna** u odnosu na ν , u oznaci $\mu \ll \nu$, ako vrijedi

$$E \in \mathcal{F} \wedge \nu(E) = 0 \implies \mu(E) = 0.$$

. Na mjeri i integralu smo pokazali Radon–Nikodymov teorem.

Teorem 2.1.37.

Ako vrijedi $\mu \ll \nu$, onda postoji μ –(g.s.) jedinstvena izmjeriva funkcija g td. za sve $E \in \mathcal{F}$ vrijedi

$$\mu(E) = \int_E g d\nu.$$

Funkciju g zovemo Radon–Nikodymovom derivacijom od μ u odnosu na ν , odnosno gustoća od μ u odnosu na ν .

U ovom kontekstu vrijedi kako je F apsolutno neprekidna funkcija distribucije ako i samo ako vrijedi $P_F \ll \lambda$. U tom slučaju je f jedinstven do na skup Lebesgueove mjere 0 te kažemo kako je f funkcija gustoće od F . Ako je F funkcija distribucije od X , tj. vrijedi $F = F_X$, onda kažemo kako X ima gustoću f_X .

Kako prepoznati je li Borelova funkcija $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ gustoća neke vjerojatnosne distribucije? Pomoću sljedećeg rezultata.

Teorem 2.1.38.

Neka je $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Borelova. Tada je f funkcija gustoće neke vjerojatnosne distribucije ako i samo ako vrijedi $f \geq 0$ λ -(g.s.) i

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \lambda(dx) = 1.$$

Dokaz. \Leftarrow Neka je f gustoća. Odmah imamo $f \geq 0$ te po teoremu o monotonij konvergenciji slijedi

$$\int_{-\infty}^x f(t) \lambda(dt) \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \lambda(dt).$$

\Rightarrow Za svaki $x \in \mathbb{R}$ imamo $f \cdot \mathbf{1}_{(-\infty, x]} \geq 0$, tako da postoji

$$\int_{\mathbb{R}} f \cdot \mathbf{1}_{(-\infty, x]} d\lambda(t) = \int_{-\infty}^x f(t) \lambda(dt) =: F(x).$$

Lako vidimo kako je F neopadajuća funkcija $\mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$. Po teoremu o monotonij konvergenciji slijedi

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \lambda(dt) = 1$$

pa je $F(+\infty) = 1$. Konačno, po teoremu o dominiranoj konvergenciji slijedi

$$\begin{cases} (x_n)_n \searrow x \implies \lim_n F(x_n) = x \\ (x_n)_n \searrow -\infty \implies \lim_n F(x_n) = F(-\infty) = \int_{-\infty}^{-\infty} f = 0 \end{cases}$$

pa imamo i neprekidnost zdesna i $F(-\infty) = 0$. Dakle, F je vjerojatnosna funkcija distribucije, a po samoj definiciji joj je f gustoća. \square

Napomena 2.1.39.

Sljedeće tvrdnje lako slijede iz Teorema 1.3.37.

- (a) Neka je F vjerojatnosna funkcija distribucije s gustoćom f . Tada za sve $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ vrijedi

$$P_F(B) = \int_B f(t) d(\lambda t).$$

- (b) Slično, ako je X slučajna varijabla s gustoćom f_X , onda zbog veze \mathbb{P} i P_X imamo

$$\int_{\Omega} g(x) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} g(t) f_X(t) \lambda(dt).$$

- (c) Posebno, za $g = \mathbf{1}_B$ tvrdnja (b) daje

$$\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(t) \lambda(dt).$$

Sada ćemo napokon demistificirati i onu drugu skupinu kao funkcije neprekidnih vjerojatnosnih funkcija distribucije. U nju spadaju funkcije kod kojih imamo skupove $E \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ td. je $\lambda(E) = 0$, ali je $P_F(E) > 0$ i za svaku točku $x \in \mathbb{R}$ vrijedi $P_F(\{x\}) = 0$.

Definicija 2.1.40. Kažemo kako je vjerojatnosna funkcija distribucije F **singularna** ako vrijedi

- (i) F neprekidna na \mathbb{R} (nema skokova).
- (ii) Postoji F' λ -(g.s.) te vrijedi $F'(x) = 0$ λ -(g.s.).

Neka je F vjerojatnosna funkcija distribucije. Tada postoje $\alpha, \beta, \gamma \in [0, 1]$ td. i vjerojatnosne funkcije distribucije F_d, F_a, F_s td. vrijedi

$$F = \alpha F_d + \beta F_a + \gamma F_s,$$

pri čemu vrijedi $\alpha + \beta + \gamma = 1$ te je F_d diskretna, F_a apsolutno neprekidna te F_s singularna vjerojatnosna funkcija distribucije. Drugim riječima, F je konveksna kombinacija tri poznate vjerojatnosne funkcije distribucije. ✕

§2.2 Funkcije distribucije slučajnih vektora

Sada promatramo $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n})$. Već smo rekli kako, zbog separabilnosti, vrijedi

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n} = \bigotimes_{i=1}^n \mathcal{B}_{\mathbb{R}}.$$

Slučajnim vektorom smo zvali funkciju $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, izmjerivu u odnosu na $(\mathcal{F}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n})$. Pokazali smo kako za $X(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ vrijedi kako je X slučajni vektor ako i samo ako su sve X_1, \dots, X_n slučajne varijable. Nadalje, X inducira mjeru P_X na $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n})$ td. za sve $E \subseteq \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$ vrijedi $P_X(E) = \mathbb{P}(X \in E)$. Posebno, P_X je vjerojatnost na $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n})$. Time je dana distribucija od X .

Definicija 2.2.1. Neka su X, Y slučajni vektori istog reda (ne nužno na istom vjerojatnosnom prostoru). Reći ćemo kako su slučajni vektori X, Y **jednakodistribuirani**, u oznaci $X \sim Y$, ako vrijedi $P_X = P_Y$.

Može li se informacija o P_X svesti na neku realnu funkciju? Da, na isti način kao u prošlom odjeljku. Koristiti ćemo leksikografski uređaj

$$(a_1, \dots, a_n) \leq (b_1, \dots, b_n) \iff a_i \leq b_i \text{ za sve } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Definicija 2.2.2. Neka je X slučajni vektor. Reći ćemo kako je funkcija $F_X: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ **funkcija distribucije** slučajnog vektora X ako za sve $x \in \mathbb{R}^n$ vrijedi $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$.

Drugim riječima, vrijedi $F_X(x) = P_X(\{a \in \mathbb{R}^n \mid a \leq x\})$.

Napomena 2.2.3.

Vrijede očekivana svojstva.

(a) $(x_n)_n \searrow x \implies \lim_n F_X(x_n) = F_X(x)$, dakle imamo neprekidnost zdesna.

(b) Imamo i odgovarajuće limese u beskonačnosti. Neka je $x_m = (x_m^1, \dots, x_m^n)$. Vrijedi

$$\lim_{x_m^i \rightarrow -\infty} F_X(x_m) = 0;$$

prema tome, čim je jedna koordinata jednaka $-\infty$, cijeli limes je jednak 0, tj. vrijedi $F_X(x_1, \dots, -\infty, \dots, x_n) = 0$.

S druge strane, vrijedi

$$\lim_{\substack{x^i \rightarrow \infty \\ i=1, \dots, m}} = 1;$$

štoviše, vrijednost $+\infty$ je nužna na svim koordinatama i tada vrijedi $F_X(+\infty, \dots, +\infty) = 1$.

(c) F_X je neopadajuća (DZ, raspisati preko koordinata).

Neka je $\langle a, b \rangle = \{(x_1, \dots, x_n) \mid a_i < x_i \leq b_i \text{ za sve } i = 1, \dots, n\}$. Označimo nadalje

$$\Delta_{b-a} F_X(a) = \sum_{\substack{x_i \in \{a_i, b_i\} \\ i=1, \dots, n}} \pm F_X(x_1, \dots, x_n),$$

pri čemu simbol $+$ uzimamo u slučaju kada među x_1, \dots, x_n imamo paran broj a_i -ova, a simbol $-$ inače. Radi se o sumi 2^n članova.

Neka je X slučajni vektor i P_X na $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n})$, $F_X: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$. Zanima nas koliko dobro F_X određuje P_X te koje su to funkcije F_X distribucije slučajnih vektora. Pristup je potpuno analogan kao kod slučajnih varijabli. Neka je

$$\mathcal{S} = \{\langle a, b \rangle \mid a, b \in \mathbb{R}^n, a \leq b\},$$

pri čemu za $a = b$ podrazumijevamo \emptyset . Kao i prije, \mathcal{S} je π -sistem i poluprsten te dobivamo $\sigma(\mathcal{S}) = \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$. Iz Teorema 1.3.11 slijedi $F_X = F_Y$ ako i samo ako $P_X = P_Y$ ($X \sim Y$). Za drugo pitanje, kandidati među funkcijama $\mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ su one koje zadovoljavaju svojstva iz Napomene 1.4.3 ((c) je zapravo uvjet $\Delta_{b-a}F(a) \geq 0$). Pokazali smo kako svaka funkcija F_X zadovoljava ta svojstva, međutim, ti uvjeti su i dovoljni.

Teorem 2.2.4.

Funkcija $F: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ je funkcija distribucije nekog slučajnog vektora ako i samo ako zadovoljava sljedeće uvjete

- (i) F neprekidna zdesna.
- (ii) $F(-\infty) = 0$ i $F(\infty) = 0$.
- (iii) $\Delta_{b-a}F(a) \geq 0$.

Dokaz. Nužnost smo već pokazali. Za dovoljnost, neka je \mathcal{S} gore definiran poluprsten. Prvo definiramo P_F na \mathcal{S} , $P_F(\langle a, b \rangle) = \Delta_{b-a}F(a)$, tako da imamo funkciju $P_F: \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$. Kao i prije, slijedi kako je P_F σ -aditivna na \mathcal{S} . Stoga postoji jedinstveno proširenje na najmanji prsten pa onda i na σ -prsten (opća Caratheodoryjeva konstrukcija). Stoga postoji jedinstveno proširenje $P_F: \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n} \rightarrow [0, 1]$ i ono je vjerojatnost. \square

Definicija 2.2.5. • Ako postoji najviše prebrojiv skup $E \subseteq \mathbb{R}^n$ td. je $P_X(E) = 1$, onda kažemo kako je X **diskretan** slučajni vektor.

- Ako postoji nenegativna Borelova funkcija $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ td. za sve $x \in \mathbb{R}^n$ vrijedi

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) \lambda_n(dt),$$

pri čemu vrijedi $\lambda_n = \bigotimes_{i=1}^n \lambda_i$, onda kažemo kako je X **apsolutno neprekidan** slučajni vektor, a za f kažemo kako je **gustoća** slučajnog vektora X i pišemo f_X .

Kao i prije, gustoća apsolutno neprekidnog slučajnog vektora X je jedinstveno određena s F_X do na skup λ -mjere 0. Sada nas zanima kada će dana funkcija biti gustoća nekog vektora. Opet je situacija analogna onoj u dimenziji jedan.

Teorem 2.2.6.

Neka je $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ Borelova funkcija. Tada je f funkcija gustoće nekog slučajnog vektora X ako i samo ako vrijedi $f \geq 0$ λ_n -(g.s.) i

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \lambda_n(dx) = 1.$$

Jer je f nenegativna, možemo koristiti Fubinijev teorem pa imamo

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \lambda_n(dx) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n) \lambda(dx_1) \dots \lambda(dx_n)$$

te možemo računati u bilo kojem poretku. Slično,

$$\int_{\langle -\infty, x \rangle} f(t) \lambda_n(dt) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f(t_1, \dots, t_n) \lambda(dt_1) \dots \lambda(dt_n).$$

Neka je sada $X = (X_1, \dots, X_n)$ slučajan vektor s funkcijom distribucije F_X . Znamo kako onda postoje F_{X_1}, \dots, F_{X_n} funkcije distribucije. Možemo li iz F_{X_i} naći F_X ? Pro-
motrimo radi jednostavnosti situaciju u dimenziji dva. Fiksirajmo npr. x_1 te pustimo $x_2 \nearrow +\infty$. Imamo

$$\begin{aligned} \lim_{x_2 \nearrow +\infty} F_X(x_1, x_2) &= P_X \left(\left\{ (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2 \mid a_1 \leq x_1 \right\} \right) \\ &= P((x_1, x_2) \in B) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \leq x_1) = F_X(x_1). \end{aligned}$$

Analogno u dimenziji n dobijemo

$$F_{X_i}(x_i) = F(+\infty, \dots, x_i, \dots, +\infty).$$

Dakle, iz distribucije od X možemo dobiti distribucije svih X_i (marginalne distribucije). Obrat općenito ne možemo provesti, tj. poznavanje F_{X_1}, \dots, F_{X_n} općenito nije dovoljno za poznavanje F_X .

Primjer 2.2.7.

Neka je $X = (X_1, X_2)$, pri čemu su

$$X_1, X_2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}.$$

Tada slučajni vektor X živi samo na točkama $(0, 0)$ i $(1, 1)$.

S druge strane, neka slučajni vektor živi na

$$\begin{pmatrix} (0, 0) & (0, 1) & (1, 0) & (1, 1) \\ q^2 & qp & pq & p^2 \end{pmatrix}.$$

Tada će marginalne distribucije biti iste u oba slučaja, ali će njihove distribucije biti različite.

Na temelju F_{X_1}, \dots, F_{X_n} može se napraviti jedna posebna distribucija F_Y koju

definiramo s

$$F_Y(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i).$$

Očito $F_Y: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ zadovoljava uvjete (a) i (b) iz Napomene 2.2.3, ali i uvjet (c). Zaista

$$\Delta_{b-a} F_Y(a) = \prod_{i=1}^n (F_{X_i}(b_i) - F_{X_i}(a_i)) \geq 0.$$

Dakle, F_Y je distribucija nekog slučajnog vektora.

Primjer 2.2.8.

Dvodimenzionalna normalna distribucija. Neka su $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$, $\sigma_1, \sigma_2 > 0$ te $\rho \in \langle -1, 1 \rangle$. Slučajni vektor ima 2-dimenzionalnu normalnu razdiobu ako mu je funkcija gustoće dana s $f(x_1, x_2) = ce^y$, pri čemu je $c = (2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2})^{-1}$ te

$$y = -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - 2\rho \frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1} \cdot \frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2} + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2} \right)^2 \right].$$

Provjerimo kako se zaista radi o funkciji gustoće. Jedino netrivialno je

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \left[\begin{array}{l} u = \frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1} \\ v = \frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2} \end{array} \right] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left(-\frac{u^2 + v^2 - 2\rho uv}{2(1-\rho^2)} \right) dudv \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left(-\frac{(u - \rho v)^2 + (1-\rho^2)v^2}{2(1-\rho^2)} \right) dudv \\ &= \left[\begin{array}{l} w_1 = \frac{u - \rho v}{\sqrt{1-\rho^2}} \\ w_2 = v \end{array} \right] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{w_1^2}{2}} e^{-\frac{w_2^2}{2}} dw_1 dw_2 \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{w_1^2}{2}} dw_1 \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{w_2^2}{2}} dw_2 \right) = 1 \cdot 1 = 1. \end{aligned}$$

Primjer 2.2.9.

n -dimenzionalna normalna distribucija. Neka je $n \in \mathbb{N}$ te neka su

- $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n) \in \mathbb{R}^n$.
- $A \dots$ simetrična pozitivno definitna matrica reda n . Onda je $A^{-1} = [\sigma_{ij}]$ također simetrična pozitivno definitna matrica.

- Q ... kvadratna forma

$$Q(\underbrace{x_1, \dots, x_n}_x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma_{ij} (x_i - \mu_i)(x_j - \mu_j) = (x - \mu)A^{-1}(x - \mu)^\top.$$

Slučajni vektor ima n -dimenzionalnu normalnu razdiobu ako mu je funkcija gustoće zadana s

$$f(x) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} (\det A)^{\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2}Q(x)\right).$$

Provjerimo kako se zaista radi o funkciji gustoće. Kao i u Primjeru 2.2.7, jedino netrivialno je izračunati pripadni integral. Jer je A^{-1} simetrična pozitivno definitna matrica, ona se može dijagonalizirati, tj. postoje ortogonalna matrica U i dijagonalna matrica $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, pri čemu su svi d_i pozitivni, td. vrijedi

$$UA^{-1}U^\top = D.$$

Neka je nadalje $y \in \mathbb{R}^n$ td. $x - \mu = y \cdot U$. Imamo

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\frac{1}{2}Q(x)\right) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{1}{2}yDy^\top} dy \\ &= \prod_{i=1}^n \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}d_i y_i^2} dy \right) = \left[\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}ax^2} dx = \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \right] \\ &= \prod_{i=1}^n \left(\frac{2\pi}{d_i} \right)^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

iz čega lako slijedi $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = 1$. ✕

§2.3 Vjerojatnosti na beskonačno dimenzionalnim prostorima

Još malo metrike/topologije. Neka je $\Omega \neq \emptyset$ s metrikom d . S \mathcal{B}_Ω označavamo najmanju σ -algebru na otvorenim skupovima. Neka su $x \in \Omega$ i $A \subseteq \Omega$. Definiramo

$$d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y).$$

Lema 2.3.1.

$A \subseteq \Omega$ je zatvoren ako i samo ako vrijedi izreka

$$d(x, A) = 0 \iff x \in A.$$

Lema 2.3.2.

Funkcija $\Omega \ni x \mapsto d(x, A)$ je uniformno neprekidna.

Definicija 2.3.3. Neka je $A \subseteq \Omega$. Reći ćemo kako je A

- **G_δ –skup**, ako se može prikazati kao presjek prebrojivo mnogo otvorenih skupova.
- **F_σ –skup**, ako se može prikazati kao unija prebrojivo mnogo zatvorenih skupova.

Napomena 2.3.4.

$$A \text{ je } G_\delta - \text{skup} \iff A^c \text{ je } F_\sigma - \text{skup}.$$

Lema 2.3.5.

- (i) Svaki zatvoren skup je G_δ –skup.
- (ii) Svaki otvoren skup je F_σ –skup.

Dokaz. Dovoljno je dokazati tvrdnju (i). Ona lako slijedi iz

$$A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left\{ x \in \Omega \mid d(x, A) < \frac{1}{n} \right\}.$$

Budući je funkcija $x \mapsto d(x, A)$ neprekidna, svi skupovi u presjeku su otvoreni. \square

Definicija 2.3.6. Vjerojatnosna mjera \mathbb{P} na $(\Omega, \mathcal{B}_\Omega)$ je **regularna** ako za sve $A \in \mathcal{B}_\Omega$ vrijedi

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \sup \{ \mathbb{P}(C) \mid C \subseteq A, C \text{ zatvoren} \} \\ &= \inf \{ \mathbb{P}(U) \mid U \subseteq A, U \text{ otvoren} \}. \end{aligned}$$

Napomena 2.3.7.

Uočimo kako je \mathbb{P} regularna ako i samo ako za sve $A \in \mathcal{B}_\Omega$ i svaki $\varepsilon > 0$ postoje zatvoren skup C_ε i otvoren skup U_ε td. vrijedi $C_\varepsilon \subseteq A \subseteq U_\varepsilon$ te $\mathbb{P}(U_\varepsilon \setminus C_\varepsilon) < \varepsilon$.

Teorem 2.3.8.

Svaka vjerojatnosna mjera na $(\Omega, \mathcal{B}_\Omega)$ je regularna.

Dokaz. Stranica 278 u knjizi. □

Pretpostavimo sad kako je Ω potpun separabilan metrički prostor te uzmimo $A \in \mathcal{B}_\Omega$. Tada vrijedi

$$\mathbb{P}(A) = \sup \{ \mathbb{P}(K) \mid K \subseteq A, K \text{ kompaktan} \}.$$

Dakle, na potpunom separabilnom metričkom prostoru svaka mjera je napeta³. ✕Promotrimo sada \mathbb{R}^T , pri čemu je T proizvoljan skup indeksa. Neka je $\{t_1, \dots, t_n\}$ proizvoljan konačan podskup od T . Imamo pripadnu projekciju $\pi_{t_1, \dots, t_n} : \mathbb{R}^T \rightarrow \mathbb{R}^n$ definiranu s

$$\pi_{t_1, \dots, t_n}(\omega) = (x_{t_1}, \dots, x_{t_n}).$$

Definicija 2.3.9. Za skup $A \subseteq \mathbb{R}^T$ kažemo kako je **cilindar s bazom M nad koordinatama t_1, \dots, t_n** ako postoje neprazan konačni podskup $\{t_1, \dots, t_n\}$ od T i skup $M \subseteq \mathbb{R}^n$ td. vrijedi

$$A = \pi_{t_1, \dots, t_n}^{-1}(M) = \{ \omega \in \mathbb{R}^T \mid (x_{t_1}, \dots, x_{t_n}) \in M \}.$$

A je **Borelov cilindar** ako dodatno vrijedi $M \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$.

S \mathcal{F}^T označavamo familiju⁴ svih Borelovih cilindara na \mathbb{R}^T . Neka je $\mathcal{B}^T = \sigma(\mathcal{F}^T)$. Kažemo kako je \mathcal{B}^T **σ -algebra Borelovih skupova** u \mathbb{R}^T .

Ako je baza M cilindra A oblika

$$M = \prod_{i=1}^n B_i \subseteq \mathbb{R}^n,$$

tada A zovemo **pravokutnik** u \mathbb{R}^T sa **stranicama** B_1, \dots, B_n . A je **Borelov pravokutnik** ako dodatno vrijedi $B_i \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ za sve $i = 1, \dots, n$.

Konačno, s \mathcal{P}^T označavamo familiju svih Borelovih pravokutnika u \mathbb{R}^T .

Napomena 2.3.10.

(a) \mathcal{P}^T je pravi podskup od \mathcal{F}^T .

(b) Vrijedi

$$\sigma(\mathcal{P}^T) = \sigma(\mathcal{F}^T) = \mathcal{B}^T.$$

Sada imamo $(\mathbb{R}^T, \mathcal{B}^T, -)$. Pretpostavimo kako je za svaki neprazan konačan podskup $\{t_1, \dots, t_n\}$ od T zadana vjerojatnosna funkcija distribucije F_{t_1, \dots, t_n} . Imamo $1 - 1$

³Ovim pojmom se ne trebamo zamarati.

⁴Lako vidimo kako je \mathcal{F}^T algebra.

korespondenciju između F_{t_1, \dots, t_n} i P_{t_1, \dots, t_n} . Cilj nam je pomoću $(F_{t_1, \dots, t_n})_{\{t_1, \dots, t_n\} \subseteq T}$ generirati vjerojatnosnu mjeru na \mathcal{B}^T .

Uvjeti suglasnosti (Kolmogorova) su sljedeći

(i) Ako je (i_1, \dots, i_n) proizvoljna permutacija od $(1, \dots, n)$, onda vrijedi

$$F_{t_{i_1}, \dots, t_{i_n}}(x_{i_1}, \dots, x_{i_n}) = F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n).$$

(ii) Ako je $m \leq n$, onda vrijedi

$$F_{t_1, \dots, t_m}(x_1, \dots, x_m) = F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_m, +\infty, \dots, +\infty).$$

Definicija 2.3.11. Familiju $\{F_{t_1, \dots, t_n}\}$ koja zadovoljava uvjete suglasnosti zovemo **suglasna familija**.

Od sada pa nadalje pretpostavljamo uvjete suglasnosti. Definiramo $\mathbb{P}^T: \mathcal{F}^T \rightarrow [0, 1]$ na sljedeći način. Neka je $A \in \mathcal{F}^T$, onda je $A = \pi_{t_1, \dots, t_n}^{-1}(M)$. Stavimo

$$\mathbb{P}_T(A) := \mathbb{P}_{t_1, \dots, t_n}(M). \quad (*)$$

Definicija je dobra, tj. ne ovisi o izboru reprezentacije cilindra (DZ).

Teorem 2.3.12.

Neka je $\{F_{t_1, \dots, t_n}\}$ suglasna familija konačno dimenzionalnih funkcija distribucije. Tada postoji vjerojatnosna mjera \mathbb{P}_T na \mathcal{B}^T td. (*) vrijedi za svaki Borelov cilindar A . Osim toga, \mathbb{P}_T je jednoznačno određena sa (*).

Dokaz. Stranice 282 i 283 u knjizi. □

Korolar 2.3.13.

\mathbb{P}_T je σ -aditivna na \mathcal{F}^T .

Dokaz. Prema osnovnom teoremu o proširenju vjerojatnosti imamo kako se \mathbb{P}_T na jedinstven način proširuje do vjerojatnosti na \mathcal{B}^T . □

3 Matematičko očekivanje. Momenti

Prvo ćemo ponoviti konstrukciju integrala (stranica 33). Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ prostor mjere. Definiramo

$$\mathcal{S}_+ = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid f \geq 0, f \text{ izmjeriva, } \text{Im}(f) \text{ konačan}\}.$$

Tada $f \in \mathcal{S}_+$ ima dekompoziciju

$$f = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{A_k},$$

pri čemu su $a_k \in [0, +\infty)$ i $A_k \in \mathcal{F}$. Definicija

$$\int_{\Omega} f d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k) \in [0, +\infty]$$

je dobra, integral je pozitivno linearan te vrijedi monotonost integrala.

Lema 3.0.1.

Neka su $(f_n)_n$ niz u \mathcal{S}_+ te $f \in \mathcal{S}_+$ td. $f_1 \leq f_2 \leq \dots \nearrow f$ po točkama. Tada vrijedi

$$\lim_n \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} f d\mu.$$

Dokaz. Iz monotonosti integrala slijedi $\int_{\Omega} f_n d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu$. Stoga postoji $I := \lim_n \int_{\Omega} f_n d\mu$ te vrijedi $I \leq \int_{\Omega} f d\mu$. Jer je $f \in \mathcal{S}_+$ imamo $f = \sum_{k=1}^p a_k \mathbf{1}_{A_k}$. Definiramo

$$A_{k,n} = \{\omega \in A_k \mid f_n(\omega) \geq (1 - \varepsilon)a_k\}.$$

Gledamo $g_n := \sum_{k=1}^p (1 - \varepsilon)a_k \mathbf{1}_{A_{k,n}}$; vrijedi $\int_{\Omega} g_n d\mu \rightarrow (1 - \varepsilon) \int_{\Omega} f d\mu$ i $f_n \geq g_n$ pa imamo

$$\lim_n \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} f d\mu.$$

□

Neka je sada $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ nenegativna izmjeriva funkcija. Definiramo

$$\int_{\Omega} f d\mu = \sup \left\{ \int_{\Omega} g d\mu \mid g \in \mathcal{S}_+, g \leq f \right\} \in [0, +\infty].$$

Za $f \in \mathcal{S}_+$ imamo $f \in \{g \in \mathcal{S}_+ \mid g \leq f\}$, tako da se ova definicija podudara s prethodnom.

Nadalje, ako su f, g izmjerive funkcije td. $0 \leq f \leq g$, onda $\int_{\Omega} f d\mu \leq \int_{\Omega} g d\mu$ (monotonost). Znamo kako se svaka nenegativna izmjeriva funkcija f može odozgo aproksimirati nizom funkcija iz \mathcal{S}_+ , tj. postoji neopadajući niz $(g_n)_n$ u \mathcal{S}_+ td. za sve $\omega \in \Omega$ vrijedi $\lim_n g_n(\omega) = f(\omega)$. Integral se dobro ponaša s obzirom na limese; po definiciji i monotonosti integrala imamo

$$\int_{\Omega} g_n d\mu \leq \int_{\Omega} g_{n+1} d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu$$

pa postoji $I := \lim_n \int_{\Omega} g_n d\mu$ i vrijedi $I \leq \int_{\Omega} f d\mu$. Nadalje, za zadani $\int_{\Omega} f d\mu \in [0, +\infty]$ postoji niz $(f_n)_n$ u \mathcal{S}_+ td.

$$\lim_n \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} f d\mu.$$

Sve ovo je slično kao i prije.

Primjer 3.0.2.

Neka je $A \in \mathcal{F}$ td. $\mu(A) = 0$ te neka je $f := (+\infty) \cdot \mathbf{1}_A \notin \mathcal{S}_+$. Definiramo $f_n = n \cdot \mathbf{1}_A \nearrow f$. Jasno, radi se o nenegativnim izmjerivim funkcijama. Imamo

$$\int_{\Omega} f d\mu = \lim_n \int_{\Omega} f_n d\mu = \lim_n n \cdot \mu(A) = 0.$$

Neka je f izmjeriva funkcija te neka je $f = f^+ - f^-$ td. $\int_{\Omega} f^+ d\mu, \int_{\Omega} f^- d\mu \in [0, +\infty]$. Kažemo kako f ima integral ako je barem jedan od integrala $\int_{\Omega} f^+ d\mu$ i $\int_{\Omega} f^- d\mu$ konačan. Kažemo kako je f integrabilna ako su oba integrala $\int_{\Omega} f^+ d\mu$ i $\int_{\Omega} f^- d\mu$ konačna. U oba slučaja definiramo

$$\int_{\Omega} f d\mu := \int_{\Omega} f^+ d\mu - \int_{\Omega} f^- d\mu \in [-\infty, +\infty].$$

Napomena 2.1.28; f integrabilna ako i samo ako vrijedi izreka

$$\int_{\Omega} f d\mu \in \mathbb{R} \iff \int_{\Omega} |f| d\mu \in \mathbb{R}.$$

Sada definiramo

$$\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = \{f \text{ izmjeriva} \mid f \text{ integrabilna}\}.$$

Neka su $f, g \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ td. $\mu(\{w \in \Omega \mid f(w) = g(w)\}) = 0$. Tada vrijedi $\int_{\Omega} f d\mu = \int_{\Omega} g d\mu$.

Definiramo relaciju \sim s

$$f \sim g \text{ ako } f = g \mu - (\text{g.s.}).$$

Lako se vidi kako je \sim relacija ekvivalencije. Definiramo

$$L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu) / \sim.$$

Definicija 3.0.3. Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ vjerojatnosni prostor i $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ slučajna varijabla. Reći ćemo kako X ima **očekivanje** ako X ima integral u odnosu na \mathbb{P} . Reći ćemo kako X ima **konačno očekivanje** ako je X integrabilna u odnosu na \mathbb{P} . U tom slučaju uvodimo oznaku

$$\mathbb{E}[X] := \int_{\Omega} X d\mathbb{P}.$$

Primjer 3.0.4.

Neka je

$$X \sim \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots \end{pmatrix}.$$

Na maloj vjerojatnosti je očekivanje od X bilo $\sum_k a_k p_k$, što je u skladu s našom definicijom.

Napomena 3.0.5.

X ima konačno očekivanje ako i samo ako vrijedi izreka

$$\mathbb{E}[|X|] < +\infty \iff X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

✕

Neka je $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ vjerojatnosni prostor, $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ slučajna varijabla te $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Borelova. Prema Propoziciji 1.2.5 (i), $g \circ X$ je slučajna varijabla. Nadalje, X inducira P_X , za $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ je $P_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$. Imamo

$$\int_B dP_X = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_B dP_X = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{X^{-1}(B)} d\mathbb{P} = \int_{X^{-1}(B)} d\mathbb{P}.$$

Proširimo po linearnosti na jednostavne funkcije pa onda i na sve izmjerive funkcije. Onda imamo

$$\int_{\Omega} g(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) \text{ postoji (konačan)} \iff \int_{\mathbb{R}} g(x) dP_X(x) \text{ postoji (konačan)}$$

i u tom slučaju su jednaki.

II

Ljeto

