

Chapter 2. The Klein-Gordon Field

2-3. The Klein-Gordon Field as Harmonic Oscillators

Max Miyazaki

各種 SNS

X (旧 Twitter): [@miya_max_study](#)

Instagram : [@daily_life_of_miya](#)

YouTube : [@miya-max-active](#)

Abstract

このノートは Peskin&Schroeder の “An Introduction to Quantum Field Theory” の第 2 章の 3 節をまとめたものである。要点や個人的な追記, 計算ノートのなまとめを行っているが, それらはすべて原書の内容を出発点としている。参考程度に使っていただきたいが, このノートは私の勉強ノートであり, そのままの内容をそのまま鵜呑みにすると間違った理解を招く可能性があることをご了承ください。ぜひ原著を手に取り, その内容をご自身で確認していただくことを推奨します。てへぺろ $v(\hat{\partial})v$

2-3. The Klein-Gordon Field as Harmonic Oscillators

これから場の量子論の議論を単純な場である Klein-Gordon 場から形式的に始める。

概要

- 古典スカラー場の理論を量子化することで、量子スカラー場の理論を得る。
- 量子化：力学変数を演算子に置き換えて正準交換関係を課す。
- この理論を解くために Hamiltonian の固有値と固有状態を求める。
- その際に調和振動子のアナロジーを用いる。

実 Klein-Gordon 場の古典論は前節で十分議論した。関連する式は以下の通りである。

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2, \\ &= \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2.\end{aligned}\tag{2-6}$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + m^2\right)\phi = 0 \quad \text{or} \quad (\partial^\mu\partial_\mu + m^2)\phi = 0\tag{2-7}$$

$$H = \int d^3x \mathcal{H} = \int d^3x \left(\frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2 \right)\tag{2-8}$$

量子化するために、力学変数 ϕ と π を演算子に置き換え、交換関係を課す。
離散的な粒子系については、正準交換関係は次のように与えられる。

$$\begin{aligned}[q_i, p_j] &= i\hbar\delta_{ij}; \\ [q_i, q_j] &= [p_i, p_j] = 0.\end{aligned}$$

連続系に対しては $\pi(\mathbf{x})$ が運動量密度なので、Kronecker delta の代わりに Dirac delta (デルタ関数) が出てくる。

$$\begin{aligned}[\phi(\mathbf{x}), \pi(\mathbf{y})] &= i\hbar\delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}); \\ [\phi(\mathbf{x}), \phi(\mathbf{y})] &= [\pi(\mathbf{x}), \pi(\mathbf{y})] = 0.\end{aligned}\tag{2-20}$$

(※時間に依存しない Schrödinger 描像で議論している。次節で Heisenberg 描像に移行するときも、両方の演算子が同時刻に評価される限り、同時刻交換関係は保持される。)

Hamiltonian は、 ϕ と π の関数なので、それ自体も演算子となる。よって、次の仕事は Hamiltonian からスペクトル（固有値群）を見つけることである。

※ここでのスペクトルとは？

一言で言えば Hamiltonian のエネルギー固有状態に対応する固有値の集合である。
数式では、以下のように固有値 E と固有状態 $|\psi\rangle$ の組である。

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle\tag{2-3.a1}$$

これを直接的に見つける方法はないので、Fourier 空間で Klein-Gordon 方程式を書くことでヒントを得ることにする。

※ Hamiltonian のスペクトルを直接的に見つけられない理由。

『Hamiltonian が無限次元の演算子であるため』

Klein-Gordon 場の Hamiltonian は,

$$H = \int d^3x \left(\frac{1}{2} \pi^2 + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \right). \quad (2-3.a2)$$

$\phi(\mathbf{x})$, $\pi(\mathbf{x})$ は無限個の自由度を持つ演算子である.

- 無限次元空間に作用する演算子となる.
 \Rightarrow Hamiltonian に対して行列のように直接固有値を求めるのは通常不可能.
- Hamiltonian が依存する場 $\phi(\mathbf{x})$, $\pi(\mathbf{x})$ は無限個の自由度を持つ.
 \Rightarrow \mathbf{x} にわたる積分が含まれるので, 固有値方程式の形にならない.
- 演算子の作用する空間が複雑
通常固有値問題:
 \Rightarrow あるベクトル空間で, 線形演算子を作用させてスカラー倍になる状態を求める.
場の量子論:
 \Rightarrow 関数空間上の演算子に対するスペクトルを知りたいが, 空間が複雑で難しい.

具体的には状態空間が無限次元であることが根本的な問題である.

量子力学では (ex. 1 粒子系).
状態空間は $L^2(\mathbb{R}^3)$ のような可積分系で, 一般的に Hilbert 空間である. 内積は,

$$\langle \psi | \phi \rangle = \int d^3x \psi^*(\mathbf{x}) \phi(\mathbf{x}). \quad (2-3.a3)$$

場の理論では,

$$\langle \Psi_1 | \Phi_2 \rangle = \int \mathcal{D}\phi \Psi_1^*[\phi] \Phi_2[\phi]. \quad (2-3.a4)$$

$\mathcal{D}\phi$ は関数 ϕ 全体にわたる積分測度. これは無限次元積分で数学的に厳密に定義するのは非常に困難である (Riemann 積分や Lebesgue 積分の拡張では扱えない).

まあ, そんなこともありどうやってスペクトルを求めるかというと, Fourier 変換を用いて間接的にスペクトルを構築する.

古典的な Klein-Gordon 場を Fourier 展開すると:

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \phi(\mathbf{p}, t).$$

ここで, $\phi^*(\mathbf{p}) = \phi(-\mathbf{p})$ とすることで, $\phi(\mathbf{x})$ が実数になることを保証する.

Proof. $\phi^*(\mathbf{p}) = \phi(-\mathbf{p})$ という条件で $\phi(\mathbf{x})$ が実数になることを確認する.
まず考えているのは『古典的な場 $\phi(\mathbf{x}, t)$ が実関数である』という物理的要請である.
このとき Fourier 変換した右辺が実関数になるようにしたい.

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \phi(\mathbf{p}, t) \quad (2-3.a5)$$

$e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}$ は複素数で $\phi(\mathbf{x}, t)$ も一般的には複素関数になる可能性がある. そこで $\phi(\mathbf{x}, t)$ を実関数にしたいとき必要な条件が $\phi^*(\mathbf{p}) = \phi(-\mathbf{p})$ となる. (2-3.a5) の複素共役をとると,

$$\phi^*(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \phi^*(\mathbf{p}, t). \quad (2-3.a6)$$

積分変数を置き換えて, $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$, $dp^3 \rightarrow dp^3$, $e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \rightarrow e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$, $\phi^*(\mathbf{p}) \rightarrow \phi^*(-\mathbf{p})$ とすると,

$$\phi^*(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \phi^*(-\mathbf{p}, t). \quad (2-3.a7)$$

これらの式を比較すると, $\phi^*(-\mathbf{p}, t) = \phi(\mathbf{p}, t) \iff \phi^*(\mathbf{p}) = \phi(-\mathbf{p})$.
 このような条件が課されれば $\phi(\mathbf{x}, t)$ は実関数になることが保証される.

□

このとき, Klein-Gordon 方程式 (2-7) は次のようになる.

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial t^2} + (|\mathbf{p}|^2 + m^2) \right] \phi(\mathbf{p}, t) = 0 \quad (2-21)$$

これは, 単純な調和振動子 (simple harmonic oscillator) の運動方程式と同じ形をしており, 対応する角振動数は以下となる.

$$\omega_{\mathbf{p}} = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} \quad (2-22)$$

(2-21) は, モードごとに異なる調和振動子の式となる. 運動量モードごとに見ると, 場のダイナミクスが独立に分離されるため, 全体の場合を解析する代わりに各モードについて個別で解析できる. つまり, 「場をモードごとに分解する」ということは「無限個の調和振動子に分ける」ということである.

ここで『モード』とは, ある波動関数や場を Fourier 変換したときの1つの平面波成分 (運動量固有状態) のこと. 物理的には, 「特定の運動量・エネルギーを持つ粒子の状態」を表す. $\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \phi(\mathbf{p}, t)$ について,

- $e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$: 運動量 \mathbf{p} を持つ平面波 (波の形) \iff \mathbf{p} モード
- $\phi(\mathbf{p}, t)$: その \mathbf{p} モードの「振幅」や「係数」

なので, モード = 波の「形」, 振幅 (係数) = 波の形の「重み」というイメージ.
 僕が少しピアノ齧ってるので, ピアノの音の例で表してみると,

- モード = ピアノの「特定の音の高さ」や「音階」(= \mathbf{p})
- 振幅 = その音の「音量」や「強さ」(= $\phi(\mathbf{p}, t)$)

というイメージになるが, ピンとこない人は無視してもらって構わない.
 周りくどい説明をしてしまったが, 場の量子論で重要な構図は以下のことである.

- 場をモードごとに分解, \mathbf{p} モード \implies 運動量 \mathbf{p} を持つ1粒子状態.
- 各モードが独立に振動する \implies 「独立した調和振動子」として量子化される.

単純調和振動子 (simple harmonic oscillator) は, 私たちがすでにスペクトルをよく知っている系. ここで, その手順を簡単に思い出しておく.

Hamiltonian は次のように書かれる.

$$H_{\text{SHO}} = \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}\omega^2\phi^2$$

H_{SHO} の固有値を求めるために, ϕ と p を昇降演算子を使って表現する.

$$\phi = \frac{1}{\sqrt{2\omega}}(a + a^\dagger), \quad p = -i\sqrt{\frac{\omega}{2}}(a - a^\dagger) \quad (2-23)$$

ここで, 正準交換関係 $[\phi, p] = i$ は, 昇降演算子に対して

$$[a, a^\dagger] = 1 \quad (2-24)$$

という関係に対応する.

H_{SHO} を昇降演算子を使って表すと, エネルギースペクトル (固有値) が簡単に得られる. 昇降演算子は次のように定義される演算子である:

$$a = \sqrt{\frac{\omega}{2}}\phi + i\frac{1}{\sqrt{2\omega}}p, \quad (2-3.b1)$$

$$a^\dagger = \sqrt{\frac{\omega}{2}}\phi - i\frac{1}{\sqrt{2\omega}}p. \quad (2-3.b2)$$

この定義の意図は,

- a : 励起状態を1つ作る.
- a^\dagger : 励起状態を1つ減らす.

つまり, 1次元調和振動子のエネルギー固有値を構成するための演算子である.

※ここでの ϕ は「場」ではなく, 「位置演算子」である. そして p はその「共役運動量演算子」であるので, 通常量子力学の正準交換関係を満たす. 最終的には場 ϕ のモードに対応することを見越してあえて ϕ を使っているのを勘違いしないように.

昇降演算子 a と a^\dagger の係数は, 交換関係 $[a, a^\dagger] = 1$ を満たすように選ばれている. 実際に確認してみると,

$$[a, a^\dagger] = \left(\sqrt{\frac{\omega}{2}}\phi + i\frac{1}{\sqrt{2\omega}}p \right) \left(\sqrt{\frac{\omega}{2}}\phi - i\frac{1}{\sqrt{2\omega}}p \right) - \left(\sqrt{\frac{\omega}{2}}\phi - i\frac{1}{\sqrt{2\omega}}p \right) \left(\sqrt{\frac{\omega}{2}}\phi + i\frac{1}{\sqrt{2\omega}}p \right) \quad (2-3.b3)$$

$$= \frac{\omega}{2}\phi^2 - i\frac{1}{2}\phi p - i\frac{1}{2}p\phi + \frac{1}{2\omega}p^2 - \left(\frac{\omega}{2}\phi^2 + i\frac{1}{2}\phi p - i\frac{1}{2}p\phi + \frac{1}{2\omega}p^2 \right) \quad (2-3.b4)$$

$$= i(-\phi p + p\phi) \quad (2-3.b5)$$

$$= i(-[\phi, p]) \quad (2-3.b6)$$

$$= i(-i) \quad (2-3.b7)$$

$$= 1 \quad (2-3.b8)$$

$[a, a^\dagger] = 1$ は量子力学の正準交換関係 $[\phi, p] = i$ を保ちながら, のちに計算する $H = \omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right)$ のようにエネルギー準位が簡単に表現され, $a^\dagger a$ が「粒子数」を表す自然な形になるようにできており, 非常に都合が良い.

このとき, Hamiltonian は次のように書き直すことができる.

$$H_{\text{SHO}} = \omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right).$$

Proof.

$$H_{\text{SHO}} = \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}\omega^2\phi^2 \quad (2-3.c1)$$

$$= \frac{1}{2} \left(-i\sqrt{\frac{\omega}{2}}(a - a^\dagger) \right)^2 + \frac{1}{2}\omega^2 \left(\frac{1}{\sqrt{2\omega}}(a + a^\dagger) \right)^2 \quad (2-3.c2)$$

$$= -\frac{\omega}{4}(a - a^\dagger)^2 + \frac{\omega}{4}(a + a^\dagger)^2 \quad (2-3.c3)$$

$$= \frac{\omega}{4} \{ (a + a^\dagger)^2 - (a - a^\dagger)^2 \} \quad (2-3.c4)$$

$$= \frac{\omega}{2}(\underline{aa^\dagger} + a^\dagger a) \quad (2-3.c5)$$

$$[a, a^\dagger] = 1 \iff aa^\dagger = a^\dagger a + 1 \quad (2-3.c6)$$

$$= \frac{\omega}{2}(a^\dagger a + 1 + a^\dagger a) \quad (2-3.c7)$$

$$= \omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) \quad (2-3.c8)$$

□

基底状態 $|0\rangle$ は, $a|0\rangle = 0$ を満たし, エネルギー固有値 $\frac{1}{2}\omega$ を持つ.

Proof. 基底状態の定義は,

$$a|0\rangle = 0 \quad (2-3.d1)$$

を満たす状態で定義される. つまり, 「一番エネルギーが低い状態」ということ.
Hamiltonian を基底状態に作用させると,

$$H_{\text{SHO}}|0\rangle = \omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) |0\rangle \quad (2-3.d2)$$

$$= \omega \left(a^\dagger a|0\rangle + \frac{1}{2}|0\rangle \right) \quad (2-3.d3)$$

$$= \omega \left(a^\dagger 0 + \frac{1}{2}|0\rangle \right) \quad (2-3.d4)$$

$$= \frac{1}{2}\omega|0\rangle. \quad (2-3.d5)$$

よって, 基底状態はエネルギー固有値 $\frac{1}{2}\omega$ を持つことが分かる. □

さらに, 次の交換関係が成り立つ.

$$[H_{\text{SHO}}, a^\dagger] = \omega a^\dagger, \quad [H_{\text{SHO}}, a] = -\omega a.$$

Proof.

$$[H_{\text{SHO}}, a^\dagger] = \left[\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right), a^\dagger \right] \quad (2-3.e1)$$

$$= \omega [a^\dagger a, a^\dagger] \quad (\because \text{定数との交換はゼロ}) \quad (2-3.e2)$$

$$= \omega \left(a^\dagger [a, a^\dagger] + [a^\dagger, a^\dagger] a \right) \quad (\because \text{交換関係のライプニッツ則}) \quad (2-3.e3)$$

$$[a, a^\dagger] = 1, \quad [a^\dagger, a^\dagger] = 0 \quad (2-3.e4)$$

$$= \omega a^\dagger \quad (2-3.e5)$$

同様に,

$$[H_{\text{SHO}}, a] = \left[\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right), a \right] \quad (2-3.e6)$$

$$= \omega [a^\dagger a, a] \quad (2-3.e7)$$

$$= \omega \left(a^\dagger [a, a] + [a^\dagger, a] a \right) \quad (2-3.e8)$$

$$[a, a] = 0, \quad [a^\dagger, a] = -1 \quad (2-3.e9)$$

$$= -\omega a \quad (2-3.e10)$$

□

これにより, 以下の状態

$$|n\rangle \equiv (a^\dagger)^n |0\rangle$$

が H_{SHO} の固有状態であり, 固有値 $\left(n + \frac{1}{2}\right) \omega$ を持つことが簡単に確認できる.

Proof. $|n\rangle \equiv (a^\dagger)^n |0\rangle$ は調和振動子の n 番目の励起状態. ここで数演算子 $\hat{N} = a^\dagger a$ が

$$\hat{N}|n\rangle = \hat{N}(a^\dagger)^n |0\rangle \quad (2-3.f1)$$

$$= a^\dagger a (a^\dagger)^n |0\rangle \quad (2-3.f2)$$

$$a(a^\dagger)^n = n(a^\dagger)^{n-1} + (a^\dagger)^n a \quad (2-3.f3)$$

$$= a^\dagger \left(n(a^\dagger)^{n-1} |0\rangle + (a^\dagger)^n a |0\rangle \right) \quad (2-3.f4)$$

$$a|0\rangle = 0 \quad (2-3.f5)$$

$$= a^\dagger n(a^\dagger)^{n-1} |0\rangle \quad (2-3.f6)$$

$$= n(a^\dagger)^n |0\rangle \quad (2-3.f7)$$

$$= n|n\rangle \quad (2-3.f8)$$

を満たすので,

$$H_{\text{SHO}}|n\rangle = \omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) |n\rangle \quad (2-3.f9)$$

$$= \omega \left(\hat{N} + \frac{1}{2} \right) |n\rangle \quad (2-3.f10)$$

$$= \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) |n\rangle \quad (2-3.f11)$$

したがって, $|n\rangle$ は H_{SHO} の固有状態であり, 固有値 $\left(n + \frac{1}{2}\right) \omega$ を持つことが分かる.

□

※ (2-3.f3) の恒等式は数学的帰納法を用いることで証明できる:
 $n = 1$ のとき,

$$a(a^\dagger)^1 = aa^\dagger \quad (2-3.f12)$$

$$= a^\dagger a + 1 \quad (2-3.f13)$$

$$= 1 \cdot (a^\dagger)^0 + (a^\dagger)^1 a \quad (2-3.f14)$$

となり, 恒等式が成り立つ.

ある n について, 以下の恒等式が成り立つと仮定する:

$$a(a^\dagger)^n = n(a^\dagger)^{n-1} + (a^\dagger)^n a. \quad (2-3.f15)$$

$n+1$ のとき,

$$\text{LHS} = a(a^\dagger)^{n+1} \quad (2-3.f16)$$

$$= a[(a^\dagger)^n a^\dagger] \quad (2-3.f17)$$

$$= [a(a^\dagger)^n] a^\dagger \quad (\because \text{結合則 } A(BC) = (AB)C) \quad (2-3.f18)$$

$$a(a^\dagger)^n = n(a^\dagger)^{n-1} + (a^\dagger)^n a \quad (2-3.f19)$$

$$= n(a^\dagger)^{n-1} a^\dagger + (a^\dagger)^n \underline{a a^\dagger} \quad (2-3.f20)$$

$$a a^\dagger = a^\dagger a + 1 \quad (2-3.f21)$$

$$= n(a^\dagger)^n + (a^\dagger)^n (a^\dagger a + 1) \quad (2-3.f22)$$

$$= n(a^\dagger)^n + (a^\dagger)^{n+1} a + (a^\dagger)^n \quad (2-3.f23)$$

$$= (n+1)(a^\dagger)^n + (a^\dagger)^{n+1} a \quad (2-3.f24)$$

よって, $n+1$ のときも恒等式が成り立つ. 数学的帰納法により, すべての $n \in \mathbb{N}$ について

$$a(a^\dagger)^n = n(a^\dagger)^{n-1} + (a^\dagger)^n a \quad (2-3.f25)$$

が成り立つことが示された.

これらの状態がスペクトル全体を形成する. Klein-Gordon Hamiltonian のスペクトルを見つけるため同じ手法を使う. つまり, 場の各 Fourier モードがそれぞれ独立した調和振動子として振る舞うことになり, それぞれ独自の a と a^\dagger を持つ.

(2-23) を参考にして, 次のように書く.

$$\phi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}) \quad (2.25)$$

$$\pi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} (a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}) \quad (2.26)$$

Proof. (2.25), (2.26) は理論的背景により導出される結果なので, それを示す.

正確には, Klein-Gordon 場 $\phi(\mathbf{x})$ の量子化をするにあたり, Fourier モードごとに場を分解 (無限個の調和振動子としてみる), そのモードを量子化して, 最終的に場を $a_{\mathbf{p}}$ と $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ を用いて表すという流れになる.

まず古典場 $\phi(\mathbf{x}, t)$ を空間について Fourier 展開する:

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} f_{\mathbf{p}}(t) e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \quad (2-3.g1)$$

ここで $f_{\mathbf{p}}(t)$ は時間に依存するモード成分であり, 実場条件 $f_{\mathbf{p}}^*(t) = f_{-\mathbf{p}}(t)$ を満たす.

次に Klein-Gordon 方程式に (2-3.g1) を代入すると,

$$(\partial_t^2 - \nabla^2 + m^2)\phi(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (2-3.g2)$$

$$(\partial_t^2 - \nabla^2 + m^2) \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} f_{\mathbf{p}}(t) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} = 0 \quad (2-3.g3)$$

$$\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \left[\left(\ddot{f}_{\mathbf{p}}(t) + \mathbf{p}^2 f_{\mathbf{p}}(t) + m^2 f_{\mathbf{p}}(t) \right) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \right] = 0 \quad (2-3.g4)$$

よって, 括弧内の係数がゼロになる:

$$\ddot{f}_{\mathbf{p}}(t) + \mathbf{p}^2 f_{\mathbf{p}}(t) + m^2 f_{\mathbf{p}}(t) = 0 \quad (2-3.g5)$$

ここで,

$$\omega_{\mathbf{p}} = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2} \quad (2-3.g6)$$

とおくと,

$$\left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega_{\mathbf{p}}^2 \right) f_{\mathbf{p}}(t) = 0 \quad (2-3.g7)$$

となる. これは調和振動子の運動方程式である. これ一般解は,

$$f_{\mathbf{p}}(t) = A_{\mathbf{p}} e^{-i\omega_{\mathbf{p}} t} + B_{\mathbf{p}} e^{i\omega_{\mathbf{p}} t} \quad (2-3.g8)$$

ここで実場条件 $B_{\mathbf{p}} = A_{\mathbf{p}}^*$ を満たすように選ぶ必要があり, のちに ϕ と π の正準交換関係 $[\phi(\mathbf{x}), \pi(\mathbf{x}')] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$ を満たすように規格化定数を選ぶと次のようになる:

$$f_{\mathbf{p}}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \left(a_{\mathbf{p}} e^{-i\omega_{\mathbf{p}} t} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{i\omega_{\mathbf{p}} t} \right) \quad (2-3.g9)$$

(2-3.g1) に代入すると,

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \left(\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \left(a_{\mathbf{p}} e^{-i\omega_{\mathbf{p}} t} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{i\omega_{\mathbf{p}} t} \right) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \right) \quad (2-3.g10)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \left(a_{\mathbf{p}} e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - \omega_{\mathbf{p}} t)} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} + \omega_{\mathbf{p}} t)} \right) \quad (2-3.g11)$$

$$\phi(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{x}, t = 0) \quad (2-3.g12)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \left(a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \right), \quad (2-3.g13)$$

ここで変数変換 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ を行くと, $a_{-\mathbf{p}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \rightarrow a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$, $a_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \rightarrow a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$, dp^3 は積分範囲が変わらないので, 符号は変わらない. よって,

$$\phi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \left(a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \right) \quad (2-3.g14)$$

となる. これで (2.25) が示されたので, 次に (2.26) を示す.
共役運動量 $\pi(\mathbf{x}, t)$ の定義は

$$\pi(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi}(\mathbf{x}, t) \quad (2-3.g15)$$

である. よってこれを計算すると,

$$\pi(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \left(a_{\mathbf{p}} e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - \omega_{\mathbf{p}} t)} + a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - \omega_{\mathbf{p}} t)} \right) \quad (2-3.g16)$$

$$= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \left(-i\omega_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}} e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - \omega_{\mathbf{p}} t)} + i\omega_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - \omega_{\mathbf{p}} t)} \right) \quad (2-3.g17)$$

$$\pi(\mathbf{x}) = \pi(\mathbf{x}, t = 0) \quad (2-3.g18)$$

$$= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \left(-i\omega_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + i\omega_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (2-3.g19)$$

$$= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} \left(a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (2-3.g20)$$

となる. これで (2.26) が示された. □

$a_{\mathbf{p}}$ と $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ を ϕ と π を使って逆に表す式も簡単に導出できるが, 実際の計算ではほとんど必要にならない.

$\phi(\mathbf{x})$ に $e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}$ をかけて積分する.

$$\int d^3 x \phi(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} = \int d^3 x \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}'}}} \left(a_{\mathbf{p}'} e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} + a_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{-i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} \right) e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \quad (2-3.h1)$$

$$= \int d^3 x \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}'}}} \left(a_{\mathbf{p}'} e^{i(\mathbf{p}' - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{x}} + a_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{-i(\mathbf{p}' + \mathbf{p}) \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (2-3.h2)$$

$$= \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}'}}} \left(a_{\mathbf{p}'} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') + a_{\mathbf{p}'}^\dagger (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}') \right) \quad (2-3.h3)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} a_{\mathbf{p}} + \frac{1}{\sqrt{2\omega_{-\mathbf{p}}}} a_{-\mathbf{p}}^\dagger \quad (2-3.h4)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \left(a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \quad (\because \omega_{-\mathbf{p}} = \omega_{\mathbf{p}}) \quad (2-3.h5)$$

同様に, $\pi(\mathbf{x})$ に $e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}$ をかけて積分すると,

$$\int d^3 x \pi(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} = \int d^3 x \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{2}} \left(a_{\mathbf{p}'} e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{-i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} \right) e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \quad (2-3.h6)$$

$$= \int d^3 x \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{2}} \left(a_{\mathbf{p}'} e^{i(\mathbf{p}' - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{-i(\mathbf{p}' + \mathbf{p}) \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (2-3.h7)$$

$$= \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{2}} \left(a_{\mathbf{p}'} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{p}) - a_{\mathbf{p}'}^\dagger (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}' + \mathbf{p}) \right) \quad (2-3.h8)$$

$$= -i \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} a_{\mathbf{p}} + i \sqrt{\frac{\omega_{-\mathbf{p}}}{2}} a_{-\mathbf{p}}^\dagger \quad (2-3.h9)$$

$$= -i \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} \left(a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \quad (\because \omega_{-\mathbf{p}} = \omega_{\mathbf{p}}) \quad (2-3.h10)$$

2つの式をまとめると,

$$\int d^3x \phi(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} = \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger), \quad (2-3.h11)$$

$$\int d^3x \pi(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} = -i\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} (a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger). \quad (2-3.h12)$$

連立方程式として解くと,

$$(2-3.h11) + i \cdot (2-3.h12) \rightarrow \int d^3x e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \left(\phi(\mathbf{x}) + \frac{i}{\omega_{\mathbf{p}}} \pi(\mathbf{x}) \right) = \sqrt{\frac{2}{\omega_{\mathbf{p}}}} a_{\mathbf{p}} \quad (2-3.h13)$$

$$a_{\mathbf{p}} = \int d^3x \left[\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \phi(\mathbf{x}) - \frac{i}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \pi(\mathbf{x}) \right] \quad (2-3.h14)$$

同様の手順で, 今後は $e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$ をかけて積分すると, $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ が得られる:

$$a_{\mathbf{p}}^\dagger = \int d^3x \left[\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} e^{+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \phi(\mathbf{x}) + \frac{i}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} e^{+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \pi(\mathbf{x}) \right]. \quad (2-3.h15)$$

とまあ, こんな感じで計算可能だが, 多くの場の量子論の計算 (散乱振幅, 真空期待値, Wick 展開など) では生成消滅演算子の交換関係を前提として構成されるため, ϕ, π を使うより $a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger$ を基本変数として議論する方が自然である.

以下の計算では, (2.25) と (2.26) の共役パートを $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ と並び替えた形が役に立つ:

$$\phi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \quad (2.27)$$

$$\pi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} (a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \quad (2.28)$$

交換関係 (2-24) は次のようになる:

$$[a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}'). \quad (2.29)$$

※係数に $(2\pi)^3$ がついているのは, ϕ と π の交換関係を考えるときに, 積分の係数を上手く打ち消すため. これは場を展開するときの係数の置き方で変わる.

これにより, ϕ と π の交換子が正しく再現されることが確認できる:

$$\begin{aligned} [\phi(\mathbf{x}), \pi(\mathbf{x}')] &= \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \left(-\frac{i}{2} \right) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{\omega_{\mathbf{p}}}} \left([a_{\mathbf{p}}^\dagger, a_{\mathbf{p}'}] - [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}'}^\dagger] \right) e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} + \mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}')} \\ &= i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}'). \end{aligned} \quad (2.30)$$

(もしこの種の計算や次に続く計算に不慣れであれば, 丁寧に手を動かして確認するのが推奨. 少し練習すれば, すぐに簡単にできるようになるし, 次章以降の基礎にもなる.)

Proof. (2.30) の証明.

$$[\phi(\mathbf{x}), \pi(\mathbf{x}')] = \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \left(-\frac{i}{2} \right) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{\omega_{\mathbf{p}}}} \left\{ [(a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger), (a_{\mathbf{p}'} - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger)] \right\} e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}')} \quad (2-3.i1)$$

$$\{\cdots\} = (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) - (a_{\mathbf{p}'} - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger)(a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger) \quad (2-3.i2)$$

$$= a_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}'} - a_{\mathbf{p}}a_{-\mathbf{p}'}^\dagger + a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}'}^\dagger - (a_{\mathbf{p}'}a_{\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}'}a_{-\mathbf{p}}^\dagger - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger) \quad (2-3.i3)$$

$$= (a_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}'} - a_{\mathbf{p}'}a_{\mathbf{p}}) - (a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}'}^\dagger - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger) - (a_{\mathbf{p}}a_{-\mathbf{p}'}^\dagger - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}}) + (a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} - a_{\mathbf{p}'}a_{-\mathbf{p}}^\dagger) \quad (2-3.i5)$$

$$= [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}'}] - [a_{-\mathbf{p}}^\dagger, a_{-\mathbf{p}'}^\dagger] - [a_{\mathbf{p}}, a_{-\mathbf{p}'}^\dagger] + [a_{-\mathbf{p}}^\dagger, a_{\mathbf{p}'}] \quad (2-3.i6)$$

$$= -[a_{\mathbf{p}}, a_{-\mathbf{p}'}^\dagger] + [a_{-\mathbf{p}}^\dagger, a_{\mathbf{p}'}] \quad (\because [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}'}] = [a_{-\mathbf{p}}^\dagger, a_{-\mathbf{p}'}^\dagger] = 0) \quad (2-3.i7)$$

$$= -(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}') - (2\pi)^3 \delta^{(3)}(-\mathbf{p} - \mathbf{p}') \quad (2-3.i8)$$

$$= -2(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}') \quad (\because \delta^{(3)}(-\mathbf{p} - \mathbf{p}') = \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}')) \quad (2-3.i9)$$

$$= \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \left(-\frac{i}{2} \right) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{\omega_{\mathbf{p}}}} (-2(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}')) e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}')} \quad (2-3.i10)$$

$$= \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^3} i \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{\omega_{\mathbf{p}}}} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}')} \quad (2-3.i11)$$

$$= i \sqrt{\frac{\omega_{-\mathbf{p}}}{\omega_{\mathbf{p}}}} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')} \quad (2-3.i12)$$

$$= i \sqrt{\frac{\omega_{-\mathbf{p}}}{\omega_{\mathbf{p}}}} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \quad \left(\because \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')} = \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \right) \quad (2-3.i13)$$

$$= i \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}'). \quad (\because \omega_{-\mathbf{p}} = \omega_{\mathbf{p}}) \quad (2-3.i14)$$

□

昇降演算子 $a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger$ を使って Hamiltonian を表現する. (2-8) から出発して,

$$H = \int d^3x \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} e^{i(\mathbf{p} + \mathbf{p}') \cdot \mathbf{x}} \times \left\{ -\frac{\sqrt{\omega_{\mathbf{p}}\omega_{\mathbf{p}'}}}{4} (a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) + \frac{-\mathbf{p} \cdot \mathbf{p}' + m^2}{4\sqrt{\omega_{\mathbf{p}}\omega_{\mathbf{p}'}}} (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} + a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) \right\}.$$

これを整理すると,

$$H = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}} \left(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] \right). \quad (2.31)$$

Proof. (2.31) の証明.

$$H = \int d^3x \mathcal{H}(\mathbf{x}) \quad (2-3.j1)$$

$$= \int d^3x \left(\frac{1}{2} \pi^2 + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \right) \quad (2-3.j2)$$

(2.27) と (2.28)

$$\phi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \left(a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \quad (2-3.j3)$$

$$\pi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} (a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \quad (2-3.j4)$$

より, 各項を計算すると,

$\frac{1}{2}\pi^2$ 項

$$\pi^2 = \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^3} (-i)^2 \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}\omega_{\mathbf{p}'}}{4}} (a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{p}')\cdot\mathbf{x}} \quad (2-3.j5)$$

$$\frac{1}{2}\pi^2 = \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^3} \left\{ -\frac{1}{4} \sqrt{\omega_{\mathbf{p}}\omega_{\mathbf{p}'}} (a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) \right\} e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{p}')\cdot\mathbf{x}} \quad (2-3.j6)$$

$\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2$ 項

$$\nabla\phi = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{i\mathbf{p}}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} \left(a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \quad (2-3.j7)$$

$$(\nabla\phi)^2 = \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \frac{-\mathbf{p}\cdot\mathbf{p}'}{2\sqrt{\omega_{\mathbf{p}}\omega_{\mathbf{p}'}}} \left(a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(a_{\mathbf{p}'} + a_{-\mathbf{p}'}^\dagger \right) e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{p}')\cdot\mathbf{x}} \quad (2-3.j8)$$

$$\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 = \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \left\{ -\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{p}'}{4\sqrt{\omega_{\mathbf{p}}\omega_{\mathbf{p}'}}} \left(a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(a_{\mathbf{p}'} + a_{-\mathbf{p}'}^\dagger \right) \right\} e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{p}')\cdot\mathbf{x}} \quad (2-3.j9)$$

$\frac{1}{2}m^2\phi^2$ 項

$$\phi^2 = \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \frac{1}{2\sqrt{\omega_{\mathbf{p}}\omega_{\mathbf{p}'}}} \left(a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(a_{\mathbf{p}'} + a_{-\mathbf{p}'}^\dagger \right) e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{p}')\cdot\mathbf{x}} \quad (2-3.j10)$$

$$\frac{1}{2}m^2\phi^2 = \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \left\{ \frac{m^2}{4\sqrt{\omega_{\mathbf{p}}\omega_{\mathbf{p}'}}} \left(a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(a_{\mathbf{p}'} + a_{-\mathbf{p}'}^\dagger \right) \right\} e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{p}')\cdot\mathbf{x}} \quad (2-3.j11)$$

よって Hamiltonian は,

$$H = \int d^3x \left(\frac{1}{2} \pi^2 + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \right) \quad (2-3.j12)$$

$$= \int d^3x \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \left\{ -\frac{1}{4} \sqrt{\omega_{\mathbf{p}} \omega_{\mathbf{p}'}} (a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) \right. \\ \left. - \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{p}'}{4 \sqrt{\omega_{\mathbf{p}} \omega_{\mathbf{p}'}}} (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} + a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) \right. \\ \left. + \frac{m^2}{4 \sqrt{\omega_{\mathbf{p}} \omega_{\mathbf{p}'}}} (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} + a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) \right\} e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{p}') \cdot \mathbf{x}} \quad (2-3.j13)$$

$$= \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \left\{ -\frac{1}{4} \sqrt{\omega_{\mathbf{p}} \omega_{\mathbf{p}'}} (a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) \right. \\ \left. - \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{p}'}{4 \sqrt{\omega_{\mathbf{p}} \omega_{\mathbf{p}'}}} (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} + a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) \right. \\ \left. + \frac{m^2}{4 \sqrt{\omega_{\mathbf{p}} \omega_{\mathbf{p}'}}} (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} + a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) \right\} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}') \quad (2-3.j14)$$

$$= \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^3} \left\{ -\frac{1}{4} \sqrt{\omega_{\mathbf{p}} \omega_{\mathbf{p}'}} (a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} - a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) \right. \\ \left. + \frac{-\mathbf{p} \cdot \mathbf{p}' + m^2}{4} (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{\mathbf{p}'} + a_{-\mathbf{p}'}^\dagger) \right\} \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}') \quad (2-3.j15)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \left\{ -\frac{1}{4} \sqrt{\omega_{\mathbf{p}} \omega_{-\mathbf{p}}} (a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{-\mathbf{p}} - a_{\mathbf{p}}^\dagger) \right. \\ \left. + \frac{|\mathbf{p}|^2 + m^2}{4} (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{-\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}}^\dagger) \right\} \quad (2-3.j16)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\omega_{\mathbf{p}}}{4} \left\{ -(a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{-\mathbf{p}} - a_{\mathbf{p}}^\dagger) + (a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger)(a_{-\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}}^\dagger) \right\} \quad (2-3.j17)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\omega_{\mathbf{p}}}{4} \left(-a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} \right) \quad (2-3.j18)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2} \left(a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}} \right) \quad (2-3.j19)$$

$$[a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(0) \iff a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger = a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + (2\pi)^3 \delta^{(3)}(0) \quad (2-3.j20)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2} \left(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + (2\pi)^3 \delta^{(3)}(0) + a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}} \right) \quad (2-3.j21)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2} \left(2a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] \right) \quad (2-3.j22)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}} \left(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] \right) \quad (2-3.j24)$$

□

第2項は $\delta(0)$ に比例する無限大の c -数である。これは全モードに渡るゼロ点エネルギー $\frac{1}{2} \omega_{\mathbf{p}}$ の和に過ぎず、自然に現れる。この無限大の定数項によるエネルギーシフトは実験で検出できない。実験では常に基底状態とのエネルギー差のみが測定されるから。したがって、今後すべての計算ではこの無限大定数を無視する。

※量子力学での調和振動子は

$$H = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) \quad (2-3.k1)$$

であり, 基底状態はエネルギーがゼロではなく,

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad (2-3.k2)$$

と与えられる. 場の量子論では $[a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0})$ が無限のモード数を表すので, $\omega_{\mathbf{p}} \cdot \frac{1}{2}[a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] = \frac{1}{2}\omega_{\mathbf{p}} \cdot (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p})$ は, 各モード \mathbf{p} におけるゼロ点エネルギーの和となる. 後々, 正規順序積 (Normal ordering) を用いて無限大定数項を除去することが可能となる.

この Hamiltonian を使うと, 交換子は簡単に求められる:

$$[H, a_{\mathbf{p}}^\dagger] = \omega_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger, \quad [H, a_{\mathbf{p}}] = -\omega_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}. \quad (2.32)$$

Proof.

$$[H, a_{\mathbf{p}}^\dagger] = \left[\int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}'} (a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}'} + \frac{1}{2} [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}'}^\dagger], a_{\mathbf{p}}^\dagger \right] \quad (2-3.11)$$

$$= \left[\int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}'} (a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}'}), a_{\mathbf{p}}^\dagger \right] + \left[\int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}'} \frac{1}{2} [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}'}^\dagger], a_{\mathbf{p}}^\dagger \right] \quad (2-3.12)$$

$$= \left[\int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}'} (a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}'}), a_{\mathbf{p}}^\dagger \right] \quad (\because [[a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}'}^\dagger], a_{\mathbf{p}}^\dagger] = 0) \quad (2-3.13)$$

$$= \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}'} [a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}}^\dagger] \quad (2-3.14)$$

$$= \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}'} \left(a_{\mathbf{p}'}^\dagger [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] + [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] a_{\mathbf{p}'} \right) \quad (2-3.15)$$

$$= \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}'}^\dagger [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] \quad (\because [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] = 0) \quad (2-3.16)$$

$$= \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}'}^\dagger (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \quad (2-3.17)$$

$$= \int d^3 p' \omega_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}'}^\dagger \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \quad (2-3.18)$$

$$= \omega_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger \quad (2-3.19)$$

$[H, a_{\mathbf{p}}]$ についても同様の計算を行えば, $[H, a_{\mathbf{p}}] = -\omega_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}$ が示せる. □

これより, 調和振動子と同様に理論のスペクトルを書くことができる. 基底状態 $|0\rangle$ は

$$a_{\mathbf{p}}|0\rangle = 0,$$

をすべての \mathbf{p} について満たす状態であり, ゼロ点エネルギーを除いた $E = 0$ を持つ. 他のすべての励起状態は, $|0\rangle$ に生成演算子を作用させて構成される. 一般に,

$$a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger \cdots |0\rangle$$

はエネルギー $\omega_{\mathbf{p}} + \omega_{\mathbf{q}} + \cdots$ を持つ固有状態である.

$H a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle = (\omega_{\mathbf{p}} + \omega_{\mathbf{q}}) a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle$ であることを示す.

Proof.

$$H a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} |0\rangle = \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}'} \left(a_{\mathbf{p}', a_{\mathbf{p}'}}^{\dagger} + \frac{1}{2} [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}'}^{\dagger}] \right) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} |0\rangle \quad (2-3.m1)$$

$\frac{1}{2} [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}'}^{\dagger}] = \frac{1}{2} \delta^{(3)}(0)$ で無限大となるが, (2.31) を出した際に今後の計算では無視するという約束をしたので, ここでも無視していることに注意. 残りの項については交換関係を用いて式変形を行う.

$$H a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} |0\rangle = \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}'} \underline{a_{\mathbf{p}'}^{\dagger} a_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} |0\rangle} \quad (2-3.m2)$$

$$= a_{\mathbf{p}', a_{\mathbf{p}'}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} |0\rangle \quad (2-3.m3)$$

$$a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}'} + [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^{\dagger}] \quad (2-3.m4)$$

$$= a_{\mathbf{p}'}^{\dagger} (a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}'} + [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^{\dagger}]) a_{\mathbf{q}}^{\dagger} |0\rangle \quad (2-3.m5)$$

$$= a_{\mathbf{p}'}^{\dagger} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} \underline{a_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} |0\rangle} + a_{\mathbf{p}'}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^{\dagger}] |0\rangle \quad (2-3.m6)$$

$$a_{\mathbf{q}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}'} + [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{q}}^{\dagger}] \quad (2-3.m7)$$

$$= a_{\mathbf{p}'}^{\dagger} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} (a_{\mathbf{q}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}'} + [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{q}}^{\dagger}]) |0\rangle + a_{\mathbf{p}'}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^{\dagger}] |0\rangle \quad (2-3.m8)$$

$$= a_{\mathbf{p}'}^{\dagger} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} \underline{a_{\mathbf{q}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}'} |0\rangle} + a_{\mathbf{p}'}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{q}}^{\dagger}] |0\rangle + a_{\mathbf{p}'}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^{\dagger}] |0\rangle \quad (2-3.m9)$$

$$a_{\mathbf{p}'} |0\rangle = 0 \quad (2-3.m10)$$

$$= a_{\mathbf{p}'}^{\dagger} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{q}}^{\dagger}] |0\rangle + a_{\mathbf{p}'}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^{\dagger}] |0\rangle \quad (2-3.m11)$$

$$= (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{q}) a_{\mathbf{p}'}^{\dagger} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle + (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} |0\rangle \quad (2-3.m12)$$

$$= \int d^3 p' \omega_{\mathbf{p}'} \left\{ \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{q}) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle + \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} |0\rangle \right\} \quad (2-3.m13)$$

$$= \omega_{\mathbf{q}} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle + \omega_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} |0\rangle \quad (2-3.m14)$$

$$= (\omega_{\mathbf{p}} + \omega_{\mathbf{q}}) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} |0\rangle \quad (\because a_{\mathbf{q}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle = a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} |0\rangle) \quad (2-3.m15)$$

□

次に運動量固有状態について考える.

$$P^i = \int T^{0i} d^3 x = - \int \pi \partial_i \phi d^3 x \quad (2.19)$$

$$H = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \omega_{\mathbf{p}} \left(a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^{\dagger}] \right) \quad (2.31)$$

を使って全運動量演算子は次のように書ける:

$$\mathbf{P} = - \int d^3 x \pi(\mathbf{x}) \nabla \phi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \mathbf{p} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}}$$

Proof.

$$\mathbf{P} = - \int d^3x \pi(\mathbf{x}) \nabla \phi(\mathbf{x}) \quad (2-3.n1)$$

$$= - \int d^3x \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} (-i) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{2}} (a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}) \frac{i\mathbf{p}}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}'}}} (a_{\mathbf{p}'} e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{-i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}}) \quad (2-3.n2)$$

$$= - \int d^3x \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{\omega_{\mathbf{p}}}} \frac{\mathbf{p}'}{2} (a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}) (a_{\mathbf{p}'} e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{-i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}}) \quad (2-3.n3)$$

$$\int d^3x (a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}) (a_{\mathbf{p}'} e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{-i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}}) \quad (2-3.n4)$$

$$= \int d^3x (a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}'} e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{p}') \cdot \mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{i(\mathbf{p}-\mathbf{p}') \cdot \mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} e^{-i(\mathbf{p}-\mathbf{p}') \cdot \mathbf{x}} + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{-i(\mathbf{p}+\mathbf{p}') \cdot \mathbf{x}}) \quad (2-3.n5)$$

$$= a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}'} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}') - a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}'}^\dagger (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') - a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'}^\dagger (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}') \quad (2-3.n6)$$

$$= - \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{\omega_{\mathbf{p}}}} \frac{\mathbf{p}'}{2} \left\{ a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}'} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}') - a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}'}^\dagger (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') - a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'}^\dagger (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}') \right\} \quad (2-3.n7)$$

$$= - \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{\omega_{\mathbf{p}}}} \frac{\mathbf{p}'}{2} \left\{ a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}') - a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}'}^\dagger \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') - a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'}^\dagger \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}') \right\} \quad (2-3.n8)$$

$$= - \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (-a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} - a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger - a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} - a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}) \quad (2-3.n9)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}) \quad (2-3.n10)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}) + \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger) \quad (2-3.n11)$$

$$A = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger) \quad (2-3.n12)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{-\mathbf{p}}{2} (a_{-\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger) \quad (\text{変数変換 } \mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}) \quad (2-3.n13)$$

$$= -A \quad (\because [a_{\mathbf{p}}, a_{-\mathbf{p}}] = 0 \rightarrow a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} = a_{-\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}, \quad a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger \text{ も同様}) \quad (2-3.n14)$$

$$2A = 0 \implies A = 0 \quad (2-3.n15)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}) \quad (2-3.n16)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}) \quad (2-3.n17)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \left(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] \right) \quad (2-3.n18)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \mathbf{p} a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} \quad \left(\because \frac{1}{2} [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] = \frac{1}{2} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(0) \text{ の無限大は同様に無視} \right) \quad (2-3.n19)$$

□

この式から, $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ は運動量 \mathbf{p} を持ち, エネルギー $\omega_{\mathbf{p}} = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}$ を持つ励起を作る
ことが分かる. また, $a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger \cdots |0\rangle$ は運動量 $\mathbf{p} + \mathbf{q} + \cdots$ を持つ状態になる.

$Ha_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle = (\mathbf{p} + \mathbf{q})a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle$ であることを示す.

Proof.

$$\mathbf{p}a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle = \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \mathbf{p}' a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle \quad (2-3.01)$$

$$= a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle \quad (2-3.02)$$

$$a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} + [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] \quad (2-3.03)$$

$$= a_{\mathbf{p}'}^\dagger (a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} + [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^\dagger]) a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle \quad (2-3.04)$$

$$= a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle + a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] |0\rangle \quad (2-3.05)$$

$$a_{\mathbf{q}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} + [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{q}}^\dagger] \quad (2-3.06)$$

$$= a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger (a_{\mathbf{q}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} + [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{q}}^\dagger]) |0\rangle + a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] |0\rangle \quad (2-3.07)$$

$$= a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} |0\rangle + a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{q}}^\dagger] |0\rangle + a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] |0\rangle \quad (2-3.08)$$

$$a_{\mathbf{p}'} |0\rangle = 0 \quad (2-3.09)$$

$$= a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{q}}^\dagger] |0\rangle + a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] |0\rangle \quad (2-3.10)$$

$$= (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{q}) a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle + (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{p}) a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle \quad (2-3.11)$$

$$= \int d^3 p' \mathbf{p}' \left\{ \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{q}) a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle + \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{p}) a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle \right\} \quad (2-3.12)$$

$$= \mathbf{q} a_{\mathbf{q}}^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle + \mathbf{p} a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle \quad (2-3.13)$$

$$= (\mathbf{p} + \mathbf{q}) a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle \quad (\because a_{\mathbf{q}}^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle) \quad (2-3.14)$$

□

これらの励起は離散的であり, 適切な相対論的エネルギー運動量の関係に従うので, 粒子 (particles) と呼ぶのが自然である (離散的とは粒子数が整数で数えられて固有値が離散的であるということ. そして1粒子状態のエネルギーと運動量は, $\omega_{\mathbf{p}} = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}$. これは相対論的エネルギー $E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2$ と一致するので物理的に粒子と見なすのが自然).
なお, $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ が作るのは運動量空間の粒子であり, 空間局所化されたものではない.

※生成演算子 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ が作る状態 $|\mathbf{p}\rangle = a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ は運動量が \mathbf{p} に定まった状態だが, $|\mathbf{p}\rangle$ の空間 (位置) 表現をとると平面波になっており, 局在化してないことが分かる.
1粒子状態 $|\mathbf{p}\rangle = a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ に対して, 位置空間での波動関数を $\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x})$ とすると,

$$\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) \equiv \langle 0 | \phi(\mathbf{x}) | \mathbf{p} \rangle = \langle 0 | \phi(\mathbf{x}) a_{\mathbf{p}}^\dagger | 0 \rangle \quad (2-3.p1)$$

これは運動量 \mathbf{p} を持つ粒子が空間 \mathbf{x} に存在する振幅を表す. さらにいうと, 位置 \mathbf{x} における場 (検出器) で粒子 $|\mathbf{p}\rangle$ を検出したときに真空が残るという状況. 計算すると,

$$\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}'}}} (\langle 0 | a_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}}^\dagger | 0 \rangle e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} + \langle 0 | a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}} | 0 \rangle e^{-i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}}) \quad (2-3.p2)$$

$$a_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}}^\dagger = a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} + [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^\dagger], \quad \langle 0 | a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}} | 0 \rangle = 0. \quad (2-3.p3)$$

$$= \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}'}}} (\langle 0 | a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} | 0 \rangle e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} + [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] \langle 0 | 0 \rangle e^{-i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}}) \quad (2-3.p4)$$

$$a_{\mathbf{p}'} | 0 \rangle = 0, \quad \langle 0 | 0 \rangle = 1 \quad (\because \text{真空の定義と期待値}) \quad (2-3.p5)$$

$$= \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}'}}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} \quad (2-3.p6)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \quad (2-3.p7)$$

よって $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ が作る粒子は局在化されておらず、運動量 \mathbf{p} を持つ平面波であることが分かる。
 ※ (2-3.p3) の $\langle 0 | a_{\mathbf{p}'}^\dagger a_{\mathbf{p}} | 0 \rangle = 0$ は、粒子数ゼロの真空状態と粒子数2の状態との内積であり、異なる粒子数状態が Fock 空間において互いに直交することから成り立つ。Fock 空間は、各粒子数に対応する Hilbert 空間の直和として構成されており、このような粒子数による直交性が自然に保証される。難しいから初学者はそんなに気にしないでいいよ笑

今後、 $\omega_{\mathbf{p}}$ を粒子エネルギー $E_{\mathbf{p}}$ と呼び、以下で与える：

$$E_{\mathbf{p}} = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}.$$

エネルギーは常に正の値を取る。

この形式論は、粒子の統計も決定する。例えば、二粒子状態 $a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger | 0 \rangle$ を考えると、 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ と $a_{\mathbf{q}}^\dagger$ は交換可能なので、粒子を入れ替えても状態は変わらない。よって、Klein-Gordon 粒子は**ボース＝アインシュタイン統計** (Bose-Einstein statistics) に従う。

我々は自然に真空状態を以下のように規格化する：

$$\langle 0 | 0 \rangle = 1.$$

一粒子状態 $|\mathbf{p}\rangle \propto a_{\mathbf{p}}^\dagger | 0 \rangle$ はしばしば現れるので、よくこの規格化を採用する。単純な規格化は多くの教科書で使われるが、

$$\langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}),$$

これは Lorentz 不変でない。z 軸方向への Lorentz Boost を考えると：

$$p'_3 = \gamma(p_3 + \beta E),$$

$$E' = \gamma(E + \beta p_3).$$

デルタ関数の変換公式は、

$$\delta(f(x) - f(x_0)) = \frac{1}{|f'(x_0)|} \delta(x - x_0). \quad (2.34)$$

これを用いて変換すると：

$$\begin{aligned} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) &= \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') \cdot \frac{dp'_3}{dp_3} \\ &= \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') \cdot \gamma \left(1 + \beta \frac{dE}{dp_3} \right) \\ &= \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') \cdot \frac{E'}{E}. \end{aligned}$$

Proof. Lorentz Boost を z 軸方向にかけると,

$$p'_3 = \gamma(p_3 + \beta E), \quad (2-3.q1)$$

$$E' = \gamma(E + \beta p_3). \quad (2-3.q2)$$

ここで, $E = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}$, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$, $\beta = v$ である ($c = 1$).

デルタ関数の変換では, 測度 (微小体積) の変換を考える必要がある. 今回は z 軸 (p_3) 方向についての変換なので,

$$\delta(p_3 - q_3) = \delta(p_3 - p'_3) \left| \frac{dp'_3}{dp_3} \right|^{-1}. \quad (2-3.q3)$$

$$p'_3 = \gamma(p_3 + \beta E(\mathbf{p})) \implies \frac{dp'_3}{dp_3} = \gamma \left(1 + \beta \frac{dE}{dp_3} \right). \quad (2-3.q4)$$

ここで,

$$E = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} \implies \frac{dE}{dp_3} = \frac{p_3}{E} \quad (2-3.q5)$$

より,

$$\frac{dp'_3}{dp_3} = \gamma \left(1 + \beta \frac{p_3}{E} \right). \quad (2-3.q6)$$

よって,

$$E' = \gamma(E + \beta p_3) \quad (2-3.q7)$$

$$\frac{E'}{E} = \gamma \left(1 + \beta \frac{p_3}{E} \right) \quad (2-3.q8)$$

$$= \frac{dp'_3}{dp_3}. \quad (2-3.q9)$$

元の 3 次元デルタ関数は,

$$\delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) = \delta(p_3 - q_3) \delta(p_1 - q_1) \delta(p_2 - q_2). \quad (2-3.q10)$$

このうち z 軸方向が Lorentz Boost されるので,

$$\delta(p_3 - q_3) = \delta(p_3 - p'_3) \left| \frac{dp'_3}{dp_3} \right|^{-1} = \delta(p_3 - p'_3) \frac{E'}{E}. \quad (2-3.q11)$$

したがって, 全体としては

$$\delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) = \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') \frac{E'}{E}, \quad (2-3.q12)$$

となる. これは Lorentz 不変でない. □

このことから, $\delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q})$ はローレンツ変換下で変化することがわかる.

一方, $E_{\mathbf{p}} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q})$ はローレンツ不変である.

そこで, 一粒子状態を次のように定義する:

$$|\mathbf{p}\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle \quad (2.35)$$

このとき、内積は：

$$\langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}). \quad (2.36)$$

$$\langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle = (\sqrt{2E_{\mathbf{p}}} \langle 0 | a_{\mathbf{p}}) (\sqrt{2E_{\mathbf{q}}} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} | 0 \rangle) \quad (2-3.r1)$$

$$= 2E_{\mathbf{p}} \langle 0 | a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{q}}^{\dagger} | 0 \rangle \quad (2-3.r2)$$

$$= 2E_{\mathbf{p}} \langle 0 | (a_{\mathbf{q}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}} + [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{q}}^{\dagger}]) | 0 \rangle \quad (2-3.r3)$$

$$= 2E_{\mathbf{p}} \langle 0 | a_{\mathbf{q}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}} | 0 \rangle + 2E_{\mathbf{p}} \langle 0 | [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{q}}^{\dagger}] | 0 \rangle \quad (2-3.r4)$$

$$a_{\mathbf{p}} = 0 \quad (2-3.r5)$$

$$= 2E_{\mathbf{p}} [a_{\mathbf{q}}^{\dagger}, a_{\mathbf{p}}] \langle 0 | 0 \rangle \quad (2-3.r6)$$

$$= 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (2-3.r7)$$

ローレンツ変換 Λ により、ユニタリー演算子 $U(\Lambda)$ を介して状態は：

$$U(\Lambda) | \mathbf{p} \rangle = | \Lambda \mathbf{p} \rangle \quad (2.37)$$

演算子に作用させる形式で書けば：

$$U(\Lambda) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} U^{-1}(\Lambda) = \sqrt{\frac{E_{\Lambda \mathbf{p}}}{E_{\mathbf{p}}}} a_{\Lambda \mathbf{p}}^{\dagger} \quad (2.38)$$

$U(\Lambda)$ は Lorentz 変換に対応するユニタリー演算子である。真空状態は Lorentz 不変：

$$U(\Lambda) | 0 \rangle = | 0 \rangle. \quad (2-3.s1)$$

1 粒子状態に Lorentz 変換を作用させると、

$$\begin{aligned} U(\Lambda) | \mathbf{p} \rangle &= U(\Lambda) \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} | 0 \rangle \\ &= \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} U(\Lambda) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} U^{-1}(\Lambda) U(\Lambda) | 0 \rangle. \end{aligned} \quad (2-3.s2)$$

$$= \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} U(\Lambda) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} U^{-1}(\Lambda) \quad (\because U(\Lambda) | 0 \rangle = | 0 \rangle) \quad (2-3.s3)$$

一方、 $| \Lambda \mathbf{p} \rangle$ は定義から、

$$| \Lambda \mathbf{p} \rangle = \sqrt{2E_{\Lambda \mathbf{p}}} a_{\Lambda \mathbf{p}}^{\dagger} | 0 \rangle. \quad (2-3.s4)$$

この式と一致させるために先ほどの式と比較すると、

$$U(\Lambda) | \mathbf{p} \rangle = | \Lambda \mathbf{p} \rangle = \sqrt{2E_{\Lambda \mathbf{p}}} a_{\Lambda \mathbf{p}}^{\dagger} | 0 \rangle. \quad (2-3.s5)$$

よって、

$$\sqrt{2E_{\mathbf{p}}} U(\Lambda) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} U^{-1}(\Lambda) | 0 \rangle = \sqrt{2E_{\Lambda \mathbf{p}}} a_{\Lambda \mathbf{p}}^{\dagger} | 0 \rangle \quad (2-3.s6)$$

$$U(\Lambda) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} U^{-1}(\Lambda) | 0 \rangle = \sqrt{\frac{E_{\Lambda \mathbf{p}}}{E_{\mathbf{p}}}} a_{\Lambda \mathbf{p}}^{\dagger} | 0 \rangle \quad (2-3.s7)$$

という演算子の変換法則が導かれる。係数 $\sqrt{\frac{E_{\Lambda \mathbf{p}}}{E_{\mathbf{p}}}}$ は状態の Lorentz 不変な規格化を保つために必要な補正である。1 粒子状態の内積 $\langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q})$ が Lorentz 不変であるためには、演算子の変換法則にもエネルギーのスケールリングが必要である。

この規格化に基づく完備性関係は：

$$(\mathbf{1})_{1\text{-particle}} = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} |\mathbf{p}\rangle \langle \mathbf{p}| \quad (2.39)$$

これは Lorentz 不変な運動量測度であり，次のようにも表せる：

$$\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} (2\pi) \delta(p^2 - m^2) \theta(p^0) \quad (2.40)$$

3次元の測度 $\frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}$ が 4次元 Lorentz 不変な測度 $\frac{d^4p}{(2\pi)^4} (2\pi) \delta(p^2 - m^2) \theta(p^0)$ と等価であることを示す．

Proof. まず任意の関数 $f(p)$ に対して次の恒等式を考える：

$$\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} f(p) \delta(p^2 - m^2) \theta(p^0) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} f(E_{\mathbf{p}}, \mathbf{p}) \quad (2-3.t1)$$

この積分は 4次元時空全体を走るが，デルタ関数によって On Shell $p^2 = m^2$ 上だけに制限され (On Shell 条件)，さらに階段関数 $\theta(p^0)$ によって $p^0 > 0$ のみ選ばれる．On Shell 条件を用いて p^0 積分を行う．デルタ関数の恒等式から，

$$\delta(f(x)) = \sum_i \frac{1}{|f'(x_i)|} \delta(x - x_i). \quad (2-3.t2)$$

これを用いると，

$$\delta(p^2 - m^2) = \delta((p^0)^2 - |\mathbf{p}|^2 - m^2) = \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} (\delta(p^0 - E_{\mathbf{p}}) + \delta(p^0 + E_{\mathbf{p}})) \quad (2-3.t3)$$

$\theta(p^0)$ は $p^0 > 0$ のみを選ぶので，

$$\delta(p^2 - m^2) \theta(p^0) = \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \delta(p^0 - E_{\mathbf{p}}) \quad (2-3.t4)$$

となる．これを用いて p^0 積分を行うと，デルタ関数から $p^0 = E_{\mathbf{p}}$ が代入される：

$$\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} (2\pi) \delta(p^2 - m^2) \theta(p^0) f(p) = \int \frac{d^3p dp^0}{(2\pi)^4} (2\pi) \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \delta(p^0 - E_{\mathbf{p}}) f(p^0, \mathbf{p}) \quad (2-3.t5)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^4} \frac{(2\pi)}{2E_{\mathbf{p}}} f(E_{\mathbf{p}}, \mathbf{p}) \quad (2-3.t6)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} f(E_{\mathbf{p}}, \mathbf{p}) \quad (2-3.t7)$$

よって，任意の関数 $f(p)$ に対して，

$$\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} f(E_{\mathbf{p}}, \mathbf{p}) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \delta(p^2 - m^2) \theta(p^0) f(p). \quad (2-3.t8)$$

$f(p) = 1$ を選べば，

$$\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \delta(p^2 - m^2) \theta(p^0) \quad (2-3.t9)$$

d^4p は明らかに Lorentz 不変． $\delta(p^2 - m^2) \theta(p^0)$ はスカラーであるから Lorentz 不変．よって，右辺全体が Lorentz 不変量となるので，左辺も Lorentz 不変量である． \square

場の演算子 $\phi(\mathbf{x})$ を真空状態に作用させると：

$$\phi(\mathbf{x})|0\rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} |\mathbf{p}\rangle. \quad (2.41)$$

$$\phi(\mathbf{x})|0\rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} (a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}) |0\rangle \quad (2-3.u1)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (\because a_{\mathbf{p}}|0\rangle = 0) \quad (2-3.u2)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} |\mathbf{p}\rangle \quad (2-3.u3)$$

この式は、運動量が明確に定義された1粒子状態の線形重ね合わせで、係数 $\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}$ を除けば位置固有状態 $|\mathbf{x}\rangle$ に対応する非相対論的な波動関数の表現と同じである。よって、我々は同じ解釈を採用して演算子 $\phi(\mathbf{x})$ は真空状態に作用することで位置 \mathbf{x} に粒子を生成する演算子という解釈を持つ。この解釈は以下の計算によって裏付けられる：

$$\begin{aligned} \langle 0|\phi(\mathbf{x})|\mathbf{p}\rangle &= \langle 0|\int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}'}}} \left(a_{\mathbf{p}'} e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} + a_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{-i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} \right) \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \\ &= e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \end{aligned} \quad (2.42)$$

これは運動量固有状態 $|\mathbf{p}\rangle$ の位置空間における波動関数と解釈できる。ちょうど非相対論的量子力学において $\langle \mathbf{x}|\mathbf{p}\rangle \propto e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$ が状態 $|\mathbf{p}\rangle$ の波動関数となるのと同様である。

(2.42) の計算.

Proof.

$$\langle 0|\phi(\mathbf{x})|\mathbf{p}\rangle = \langle 0|\int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}'}}} \left(a_{\mathbf{p}'} e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} + a_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{-i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} \right) \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (2-3.v1)$$

$$= \sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{E_{\mathbf{p}'}}} \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \left(e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} \langle 0|a_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle + e^{-i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} \langle 0|a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'}^\dagger |0\rangle \right) \quad (2-3.v2)$$

$$= \sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{E_{\mathbf{p}'}}} \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \left(e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} \langle 0|a_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \right) \quad (\because \langle 0|a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = 0) \quad (2-3.v3)$$

$$= \sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{E_{\mathbf{p}'}}} \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \left(e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} \langle 0|a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}'} |0\rangle + e^{-i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} [a_{\mathbf{p}'}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] \langle 0|0\rangle \right) \quad (2-3.v4)$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{E_{\mathbf{p}'}}} \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} e^{-i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{p}) \quad (\because a_{\mathbf{p}'}|0\rangle = 0) \\ &= e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \end{aligned} \quad (2-3.v5)$$

□