Tener en cuenta:

- Cada ejercicio debe entregarse en hojas separadas, numeradas y con el nombre y apellido en todas las hojas.
- Una vez terminadas las derivaciones de un ejercicio, escribir el programa-resultado final.
- 1. Considere la siguiente especificación:

```
\begin{aligned} & \text{Const } N: Int, A: array[0,N) \ of \ Int; \\ & \text{Var } r: Int; \\ & \{P:N \geq 1\} \\ & \text{S} \\ & \{Q:r = \langle N\,i\,: 0 < i < N: \ A.i > A.(i-1)\,\rangle \} \end{aligned}
```

- a) Explicar en palabras qué problema se calcula de acuerdo a la especificación.
- b) Derivar un programa imperativo que satifaga la especificación.

Ayuda: agregar $1 \le n \le N$ al invariante.

- c) ¿Cuál es el resultado para el arreglo A = [2, 3, 2, 1, 0, 8]?
- 2. Derivar un programa imperativo que calcule si existe algún segmento inicial del arreglo A cuya suma sea -1, especificado de la siguiente manera:

```
Const N:Int, A:array[0,N) of Int; Var r:Bool; \{P:N\geq 0\} S \{Q:r=\langle\,\exists\,i:0\leq i\leq N:\,\langle\,\sum j:0\leq j< i:\,A.j\,\rangle=-1\,\rangle\}
```

- 3. Especificar con pre y post condición los siguientes problemas. No derivar.
 - a) Calcular el máximo y el mínimo de un arreglo no vacío de N enteros A.
 - b) Calcular si un número entero dado N es un cuadrado perfecto (o sea, el cuadrado de un entero).





