

CH CORBEIL - OSTEODENSITOMETRIE

116 Boulevard Jean Jaurès 91100 CORBEIL ESSONS

Service Rhumatologie du Dr Hilliquin

Rapport établi par:

13/05/2025 00:36

Où:

116 Jean Jaurès Boulevard, 91100 Corbeil-Essonnes

Rapport d'Analyse de la Composition Corporelle

Nom: John Do

ID du Patient:

Médecin Traitant:

Sexe: Masculin

Date de Naissance: 1999-07-09

Âge: 25,0

Taille: 178,0 cm

Poids: 56,0 kg

IMC: 17,67

Résultats

Patient de sexe Masculin de âge 25,0 ans.

Mode de vie

Non Tabagique.

Non Consommation excessive d'alcool (plus de 3 verres par jour).

Non Activité physique régulière.

Supplémentation en vitamine D.

Antécédents Fracturaires

Non Antécédent de fracture de faible énergie.

Non Fracture de fragilité du col fémoral chez un parent du premier degré.

Non Chutes à répétition.

Autres traitements inducteurs de l'ostéoporose

Traitement spécifique de l'ostéoporose

Corticothérapie pour plus de 3 mois ou reçu depuis au moins 3 mois

FRAX:

Informations Complémentaires

Densitométrie Osseuse

Région		Classification OMS
Rachis AP (L1-L4)		
Col du Fémur		Ostéopénie
Hanche Totale		Ostéopénie
Distal Radius		

Les critères d'interprétation de DMO de l'Organisation mondiale de la santé classent les patients comme

- Normaux: supérieur ou égal à -1.0
- Ostéopéniques: entre -1.0 et -2.5
- Ostéoporotiques: inférieur ou égal à -2.5

Synthèse

Traitement anti-ostéoporotique recommandé

[True, '<<<<- ', True, 1000, '->', 'M', 'Tscore>-1']

■ ---- Homme ---- ■ Acide zolédronique (zolédronate) 5 mg 1 perfusionune fois par an ■ Acide risédronique (risédronate) 35 mg hebdomadaire ou 75 mg 1 comprimé 2 j de suite 1 fois par mois (ou 5 mg/j)

Source:

Traitement Information

Mesures générales indiquées chez tous les patients ayant subi la castration dans le cancer de la prostate