


Чи бували Ви в цій
маніпуляційній?



Ін'єкції **Олфен**[®] – лікування
болю зі знеболенням ¹⁻⁴

Страх інекцій відчувають до
38% дорослого населення ⁵



Ін'єкції **Олфен**[®] – місцеве
знеболення в місці ін'єкції
після її здійснення ¹



Олфен[®] – єдиний
ін'єкційний диклофенак
з вмістом 75 мг в 2 мл. *,¹



Ін'єкції **Олфен**[®]-75
– лікування болю зі знеболенням ¹⁻⁴

teva

Олфен®-75

Диклофенак натрію + лідокаїну гідрохлорид



1 ампула 1-2 рази на добу¹



2 мл в ампулі¹



Місцевий анестетик у складі¹



Олфен®-100 СР Депокапс

Диклофенак натрію



1 капсула на добу⁶



Діє до 24 год⁶



Приймати перед їдою⁶



Нейрорубін™

тіаміну гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, ціанокобаламін



високі дози
трьох вітамінів:
B1, B6, B12⁷



1 ампула на добу^{**7}



Нейрорубін™-Форте Лактаб

тіаміну гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, ціанокобаламін



1-2 таблетки на добу⁸



Курс лікування
4 тижні⁸



вітаміну B12
1000 мкг⁸



****У тяжких (гострих) випадках:**
1 ампула на добу до зменшення інтенсивності гострих симптомів.

Після послаблення симптомів:
1 ампула 1-3 рази на тиждень.

Назва продукту: **ОЛФЕН®-75**: склад: диклофенаку натрію 75 мг та лідокаїну гідрохлориду 20 мг. **Характеристика** – розчин для ін'єкцій, прозорий, від практично безбарвного до легкого жовтого кольору розчин. **Лікувальні властивості** – нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби, і як результат має протизапальні, знеболювальні та жарознижувальні властивості. **Можлива побічна дія** – посилене серцебиття, біль у грудях, інфаркт міокарда, серцева недостатність, артеріальна гіпертензія, васкуліт, аритмія, уповільнення провідності серця, зупинка серцевої діяльності, колапс; абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, абдомінальні спазми, диспепсія, метеоризм, анорексія, гастрит, виразки шлунка і кишечника, у тому числі з кровотечею, або з перфорацією (іноді з летальними наслідками, особливо у пацієнтів літнього віку), коліт, запор, підвищений рівень трансамін, повідомлялося про підвищений ризик тромботичних ускладнень (наприклад, інфаркт міокарда або інсульт), пов'язаний із застосуванням диклофенаку, зокрема у високих терапевтичних дозах (150 мг на добу) та тривалий час. Повний перелік побічних реакцій наведено у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу <http://www.drzl.com.ua/>

Назва продукту: **ОЛФЕН®-100 СР ДЕПОКАПС**: склад: диклофенаку натрію 100 мг. **Характеристика** – тверді желатинові капсули пролонгованої дії з рожевою кришечкою та білим непрозорим корпусом, зі штампом «100», що містять пелети білого або майже білого кольору. **Лікувальні властивості** – нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби, і як результат має протизапальні, знеболювальні та жарознижувальні властивості. **Можлива побічна дія** – посилене серцебиття, біль у грудях, інфаркт міокарда, серцева недостатність, артеріальна гіпертензія, васкуліт, аритмія, уповільнення провідності серця, зупинка серцевої діяльності, колапс; абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, абдомінальні спазми, диспепсія, метеоризм,

анорексія, гастрит, виразки шлунка і кишечника, у тому числі з кровотечею, або з перфорацією (іноді з летальними наслідками, особливо у пацієнтів літнього віку), коліт, запор, підвищений рівень трансамін, повідомлялося про підвищений ризик тромботичних ускладнень (наприклад, інфаркт міокарда або інсульт), пов'язаний із застосуванням диклофенаку, зокрема у високих терапевтичних дозах (150 мг на добу) та тривалий час. Повний перелік побічних реакцій наведено у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу <http://www.drzl.com.ua/>

Назва продукту: **НЕЙРОРУБІН™**: склад: тіаміну гідрохлориду (вітамін B1) 100 мг, піридоксину гідрохлориду (вітамін B6) 100 мг, ціанокобаламіну (вітамін B12) 1 мг. **Характеристика** – розчин для ін'єкцій, прозорий, червоного кольору розчин. **Лікувальні властивості** – вітамін B1 у комбінації з вітаміном B6 та/або вітаміном B12. **Можлива побічна дія** – хроматурія, реакції гіперчутливості, в тому числі ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції, анафілактичний шок переважно у пацієнтів із підвищеною чутливістю. Повний перелік побічних реакцій наведено у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу <http://www.drzl.com.ua/>

Назва продукту: **Нейрорубін™-Форте Лактаб**: склад: тіаміну нітрату (вітамін B1) 200 мг, піридоксину гідрохлориду (вітамін B6) 50 мг, ціанокобаламіну (вітамін B12) 1 мг. **Характеристика** – рожеві, круглі, двоопуклі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з тисненням «ТР» на одній стороні. **Лікувальні властивості** – вітамін B1 у комбінації з вітаміном B6 та/або вітаміном B12. **Можлива побічна дія** – реакції гіперчутливості, анафілактичний шок, анафілаксія. Повний перелік побічних реакцій наведено у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу <http://www.drzl.com.ua/>

* За даними <http://www.drzl.com.ua/> на 15.09.2020

¹ Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ОЛФЕН®75.

² Оlfen®75 Ampoules (Data on file);

³ Nourddin W.A et al. The Pharma Innovation Journal 2014; 3(6): 5764;

⁴ Машкунова О.В. і соавт. Трудный пациент. - 2013. - 12: 3

⁵ McMurtry et al. Far From "Just a Poke" Common Painful Needle Procedures and the Development of Needle Fear//Clin J Pain 2015;31:S3-S11

⁶ Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ОЛФЕН®75 Олфен®-100 СР Депокапс.

⁷ Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Нейрорубін™, розчин для ін'єкцій.

⁸ Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Нейрорубін™ Форте Лактаб.

Інформація для визначеного обмеженого кола осіб. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтеся з лікарем. Протипоказання та можливі побічні ефекти наведені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Представник виробника: ТОВ «ТЕВА УКРАЇНА»: проспект П. Тичини, 1-в, 9-й поверх, м. Київ, 02152. Тел. +38 (044) 594 70 80 • www.teva.ua
NRRU-UA-00065. Термін придатності промоматеріалу – September 2022.