

Tutorato 3

Complementi di Matematica per le Scienze Chimiche

A.A. 2021/2022

prof. Emanuele Bottazzi

Calcolo differenziale in più variabili reali

Esercizio 1. Determina il più grande insieme aperto $A \subseteq \mathbb{R}^3$ sul quale le seguenti funzioni sono di classe C^1 .

1. $f(x, y, z) = zx^2 - xy^3 + z^4$;
2. $f(x, y, z) = \frac{\cos(xy)}{\sin(z)}$;
3. $f(x, y, z) = |x|y$;
4. $f(x, y, z) = \frac{x}{y+z^2}$.

Esercizio 2. Considera la funzione $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x, y, z) = \cos(xy)(z - 1)^3$. Per ogni versore $v \in \mathbb{R}^3$, calcola $\frac{\partial f(0,0,1)}{\partial v}$ e $\frac{\partial f(0,0,0)}{\partial v}$.

Suggerimento: al posto di calcolare le derivate direzionali con la definizione (che si può comunque utilizzare senza alcun problema), giustifica che ci sono le ipotesi sufficienti per applicare la formula del gradiente. Poi calcola le derivate direzionali con la formula del gradiente.

Esercizio 3. Determina il più grande insieme aperto $A \subseteq \mathbb{R}^2$ sul quale le seguenti funzioni sono di classe C^2 .

1. $f(x, y) = \sin(xy) \cos(\pi - x^2 + y^2)$;
2. $f(x, y) = \sqrt[3]{x} \sqrt[3]{y}$;
3. $f(x, y) = |x|y$;
4. $f(x, y) = \frac{1}{x^2 - y + 1}$.

Esercizio 4. Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione $f(x, y) = x \sqrt[3]{y}$ e $g_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ le funzioni $g_i(t) = t^i$ per $i = 2, 3, 4$. Per ciascuno di questi i calcola, se esiste,

- $\nabla g_i(f(0, 0))$ e $H_{g_i(f)}(0, 0)$,
- $\nabla g_i(f(1, 8))$ e $H_{g_i(f)}(1, 8)$,
- $\nabla g_i(f(-3, 0))$ e $H_{g_i(f)}(-3, 0)$,
- $\nabla g_i(f(0, -9))$ e $H_{g_i(f)}(0, -9)$.

Suggerimento: $g_3(f(x, y)) = (x \sqrt[3]{y})^3 = \dots$