

# ОВИТМ

Хоружий Тимофей

16 января 2022 г.

## 1

Математическая модель в которой мы будем работать - это  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ , где  $\Omega$  - это пространство элементарных исходов,  $\mathcal{F}$  - это  $\sigma$ -алгебра событий,  $P$  - это  $\sigma$ -аддитивная вероятностная мера.

В этом курсе предмет нашего исследования - это случайный эксперимент.

1. повторяемость
2. отсутствие детерминистической регулярности
3. статистическая устойчивость частот

**Элементарный исход** - это результат случайного эксперимента.  $(\Omega)$

**События** - это множество элементарных исходов (нам обычно интересно именно множество, например множество оценок на сессии, чтобы не упал средний балл)  $(\mathcal{F})$

**Вероятность** - это частота события, если мы будем много раз повторять случайный эксперимент. Идеализация!

Не стоит воспринимать  $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N(A)}{n}$  потому что это не про жизнь!

## 2

**Опр** будем называть модели дискретными, если  $\Omega$  не более чем счетно.

**Пример** будем рассматривать модель где у нас есть мешок, в котором есть шарики ( $M$  - белых и  $N - M$  - черных)

Эксперименты могут быть с(без) возвращением(я) и с(без) учетом(а) порядка.

Тогда элементарный исход это или кортеж или множество. А возвращение влияет на мощность элементарных исходов. Комбу надо было учить!

**Классическая теория вероятности** занимается дискретными моделями в которых элементарные исходы равновероятны. *Замечание* классическая модель занимается только конечными моделями, так как сумма вероятностей должна равняться 1.

## 3

## 4

## 5

Два события называются независимыми, если они не влияют на вероятность друг друга, то есть  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ . Если  $P(B) \neq 0$ , то определение эквивалентно  $P(A|B) = P(A)$

Множество событий называют **попарно независимыми**, если любая пара элементов независима.

Множество событий называют **независимо в совокупности**, если для любого подмножества выполняется  $P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$ .

**Замечание** Очевидно что из независимости в совокупности следует попарная независимость.

## 6

**Опр 1** Случайная величина - это функция  $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  если  $\mathcal{F} = 2^\Omega$  и  $\Omega$  или конечное или счетное.  $P(A) = \sum_{w \in A} P(w)$  Это не требовал Иван Генрихович в лекциях прошлого года, не понятно зачем это вообще требовать

**Опр 1\*** Случайная величина - это функция  $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  такая что  $\forall a \in \mathbb{R} : \xi^{-1}((-\infty, a]) \in \mathcal{F}$  (Измеримость функции)

**Опр 2** Математическое ожидание от случайной величины - это  $E\xi = \sum_{w \in \Omega} \xi(w)P(w)$

**Опр 2\***  $E\xi = \int_{x \in \Omega} \xi(w)dP$

**Опр 3** Распределение случайной величины - это значение сл. в. и вероятности  $P(\xi = x_i) = p_i$

**Опр 3\*** Распределение случайной величины ( $P_\xi$ ) - это вероятностная мера на  $\Omega$ . Такое что  $P_\xi(B) = P(\xi \in B)$