

Klausur „Mathematik II für MB“



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. Christian Stinner

Wintersemester 2020/21
31. März 2021

Name:

Matrikelnummer:

Vorname:

Studiengang:

Anzahl Zusatzblätter

Aufgabe	1	2	3	Σ	Note
Punktzahl	16	16	20	52	
erreichte Punktzahl					

Wichtige Hinweise – Nichtbeachtung kann zu Punktabzug führen

- **Bearbeitungszeit:** 90 Minuten.
- **Hilfsmittel:** Die einzigen erlaubten Hilfsmittel sind **vier** eigenhändig beschriebene Blätter im Format DIN A4, zweiseitig beschrieben. Taschenrechner, Handys oder andere elektronische Geräte sind **auszuschalten** und in einer Tasche zu verstauen. Taschen und Ähnliches sind **unter** dem Tisch aufzubewahren. Ein Verstoß gegen diese Regeln wird als Täuschungsversuch gewertet.
- Versehen Sie dieses Blatt gut lesbar mit Ihrem *Namen* und Ihrer *Matrikelnummer*.
- Die Farben *rot* und *grün* dürfen nicht verwendet werden. Antworten, die mit Bleistift geschrieben sind, werden nicht gewertet. Schreiben Sie durchgängig klar strukturiert und *gut lesbar*.
- Bei Aufgabe 1 ist jeweils genau eine Antwort richtig. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt. Bei fehlender, falscher oder mehr als einer angekreuzten Antwort wird die Frage mit 0 Punkten bewertet. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Tragen Sie bei Aufgabe 2 die Lösungen der Teilaufgaben in die entsprechenden Kästchen ein. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Bei Aufgabe 3 sind die Lösungen auf den angehängten Blättern herzuleiten und dabei wesentliche *Zwischenschritte* zu begründen. Die Angabe eines Ergebnisses allein genügt nicht.
- Zur Bearbeitung der Klausur verwenden Sie bitte ausschließlich die gestellten Aufgabenblätter (**kein eigenes Papier!**). Lösungen auf eigenem Papier werden **nicht** bewertet.
Sollte der Platz nicht reichen, so erhalten Sie zusätzliches Papier von der Aufsicht. Versehen Sie dieses gut lesbar mit Ihrem *Namen* und Ihrer *Matrikelnummer*. Verweisen Sie in diesem Fall bitte auf die zusätzliche Rechnung und kennzeichnen Sie eindeutig zu welcher Aufgabe diese gehören. Bei der Abgabe falten Sie die zusätzlichen Blätter bitte auf DIN A5-Größe und stecken die Klausur in die gefalteten Blätter – Vielen Dank!

Aufgaben beginnen auf der Rückseite. Viel Erfolg!

1. Aufgabe (Multiple Choice)

(16 Punkte)

Bitte kreuzen Sie im Folgenden die richtige Antwort an. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt. Bei fehlender, falscher oder mehr als einer Antwort wird die Frage mit 0 Punkten bewertet. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.

(a) Die Potenzreihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} (x-3)^n$ konvergiert für

☐

$x \in (2, 4),$

☐

$x \in [2, 4),$

☐

$x \in (2, 4],$

☐

$x \in [2, 4].$

(b) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = -e^{2x} - x^3$. Für die Ableitung $(f^{-1})'$ der Umkehrfunktion gilt

☐

$(f^{-1})'(-1) = 2,$

☐

$(f^{-1})'(-1) = -\frac{1}{2e^2+3},$

☐

$(f^{-1})'(-1) = -\frac{1}{2},$

☐

$(f^{-1})'(-1) = 2e^2 + 3.$

(c) Die Menge $G := \{[x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3 : z \in [0, 1] \text{ und } \sqrt{x^2 + y^2} \leq 2z\}$ beschreibt

☐

eine Kugel,

☐

einen Kegel,

☐

eine Halbkugel,

☐

einen Zylinder.

(d) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = \cos(2x)$. Das Taylorpolynom 5. Grades $T_5 f$ von f mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ ist

☐

$T_5 f(x) = 2x - \frac{8x^3}{3!},$

☐

$T_5 f(x) = 2x - \frac{8x^3}{3!} + \frac{32x^5}{5!},$

☐

$T_5 f(x) = 1 - \frac{4x^2}{2} + \frac{16x^4}{4!} - \frac{64x^6}{6!},$

☐

$T_5 f(x) = 1 - \frac{4x^2}{2} + \frac{16x^4}{4!}.$

(e) Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar mit $\nabla f(-3, 2) = \vec{0}$ und Hessematrix $D_f^2(-3, 2) = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$. Dann hat f in $[-3, 2]^T$

- ☐ ein lokales Maximum,
☐ einen Sattelpunkt,

- ☐ ein lokales Minimum,
☐ keinen kritischen Punkt.

(f) Betrachten Sie die Menge $M = \{[x, y]^T \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 16\}$. Welche Aussage ist **richtig**?

- ☐ M ist offen,
☐ M ist kompakt,

- ☐ M ist abgeschlossen,
☐ M hat keine der zuvor genannten Eigenschaften.

(g) Gegeben sei die 2π -periodische Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{für } x \in [-\pi, 0], \\ x^3 + 1 & \text{für } x \in (0, \pi). \end{cases}$$

Weiter sei Ff die Fourier-Reihe von f . Dann ist die Menge $M := \{x \in [-\pi, \pi] : f(x) = Ff(x)\}$ gegeben durch

- ☐ $M = [-\pi, \pi]$,
☐ $M = [-\pi, 0) \cup (0, \pi]$,

- ☐ $M = (-\pi, \pi)$,
☐ $M = (-\pi, 0) \cup (0, \pi)$.

(h) Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 + y^3}{x^2 + y^2} & \text{für } [x, y]^T \neq [0, 0]^T, \\ 0 & \text{für } [x, y]^T = [0, 0]^T. \end{cases}$$

Dann ist die partielle Ableitung $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ gegeben durch

- ☐ $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$,
☐ $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 3$,

- ☐ $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 1$,
☐ $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ existiert nicht.

(i) Ein geeigneter Ansatz für eine Partialbruchzerlegung für die Funktion $\frac{x^3 + 5x^2 + 4}{(x+2)^2(x^2+1)}$ ist

☐ $\frac{A}{(x+2)^2} + \frac{Bx+C}{x^2+1},$

☐ $\frac{A}{(x+2)^2} + \frac{B}{(x+1)^2},$

☐ $\frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1},$

☐ $\frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} + \frac{C}{(x+1)^2}.$

(j) Es sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ eine C^2 -Funktion und $N = \{(x, y)^T \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) = 0\}$ für eine C^1 -Funktion $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Welche Aussage über globale Maxima von f auf N (d.h. globale Maxima von f unter der Nebenbedingung N) ist **richtig**?

☐ f hat auf N immer ein globales Maximum.

☐ Wenn f auf N ein globales Maximum im Punkt $\vec{x}_0$ hat, so gilt $f(\vec{x}_0) > 0$.

☐ Wenn f auf N ein globales Maximum im Punkt $\vec{x}_0$ hat, so gilt $\nabla f(\vec{x}_0) = \lambda \nabla g(\vec{x}_0)$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$ oder $\nabla g(\vec{x}_0) = (0, 0)^T$.

☐ Wenn f auf N ein globales Maximum im Punkt $\vec{x}_0$ hat, so gilt $\nabla f(\vec{x}_0) = \lambda \nabla g(\vec{x}_0)$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$.

(k) Das uneigentliche Integral $\int_1^\infty \frac{1}{x} e^{-\alpha x} dx$ konvergiert

☐ nur für alle $\alpha \leq 0$,

☐ nur für alle $\alpha \geq 0$,

☐ nur für alle $\alpha < 0$,

☐ nur für alle $\alpha > 0$.

(l) Welche Aussage ist **für mindestens eine** symmetrische (3×3) -Matrix $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ mit $\det(A) = 0$ **richtig**?

☐ A ist positiv definit,

☐ A ist negativ definit,

☐ A ist indefinit,

☐ keine der zuvor genannten Aussagen.

- (m) Sei $c : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine Kurve in der xz -Ebene mit Schwerpunkt $\vec{x}_S = [3, 2]^T$ und Länge 4. Weiter sei F die Rotationsfläche, die durch Rotation von c um die z -Achse entsteht. Wie groß ist der Flächeninhalt $|F|$ von F ?

☐ $|F| = 8\pi,$

☐ $|F| = 16\pi,$

☐ $|F| = 12\pi$

☐ $|F| = 24\pi.$

- (n) Die Menge $G \subset \mathbb{R}^2$ bestehe aus dem Inneren und dem Rand des Dreiecks mit den Eckpunkten $[0, 0]^T$, $[1, 0]^T$ und $[0, 2]^T$. Welche Aussage ist **richtig**?

☐ $\int_G xy \, d(x, y) = \int_0^1 \int_0^{2x} xy \, dy \, dx,$

☐ $\int_G xy \, d(x, y) = \int_0^1 \int_0^{2-2x} xy \, dy \, dx$

☐ $\int_G xy \, d(x, y) = \int_0^2 \int_0^{2-y} xy \, dx \, dy,$

☐ $\int_G xy \, d(x, y) = \int_0^2 \int_0^y xy \, dx \, dy.$

- (o) Sei $G = \{[x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 9\}$, $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld und $\Phi_{\partial G}(F)$ der Fluss von F durch ∂G von außen nach innen. Welche Aussage ist **richtig**?

☐ $\Phi_{\partial G}(F) = \int_G \operatorname{div}(F),$

☐ $\Phi_{\partial G}(F) = - \int_G \operatorname{div}(F),$

☐ $\Phi_{\partial G}(F) = \int_G \operatorname{rot}(F),$

☐ $\Phi_{\partial G}(F) = - \int_G \operatorname{rot}(F).$

- (p) Es sei $M = \{[x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, y \geq 0, z \geq 0\}$ und $S = [x_S, y_S, z_S]^T$ der Schwerpunkt von M . Welche der folgenden Aussagen ist **richtig**?

☐ Es gilt $x_S = 0.$

☐ Es gilt $y_S = 0.$

☐ Es gilt $z_S = 0.$

☐ Es gilt $x_S = y_S = z_S.$

2. Aufgabe (Fill-In)

(16 Punkte)

Bitte tragen Sie die Lösungen der Teilaufgaben in die entsprechenden Kästchen ein, nur diese werden gewertet.

- (a) Berechnen Sie den Grenzwert für x gegen ∞ von

$$f(x) = x \arctan\left(\frac{5}{x}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$$

- (b) Gegeben sei die 2π -periodische Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^2$ für $x \in [-\pi, \pi)$. Bestimmen Sie die Koeffizienten a_0 und b_4 der zugehörigen Fourier-Reihe

$$(Ff)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx).$$

$$a_0 =$$

$$b_4 =$$

- (c) Bestimmen Sie das Taylorpolynom 3. Grades der Funktion

$$f(x) = \sin(x) \cdot e^x$$

mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.

$$Tf_3(x) =$$

- (d) Sei $F : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$F(x) = \int_1^{e^x} \frac{\ln(t)}{\sin(t) + t} dt$$

Bestimmen Sie die Ableitung von F .

$$F'(x) =$$

Platz für Nebenrechnungen zur Aufgabe 2

- (e) Berechnen Sie für $t \in (0, 1)$ den Wert des Integrals

$$I(t) = \int_0^{\pi} x \sin(tx) dx.$$

$I(t) =$

- (f) Sei $G = \{[x, y]^T \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, 2], 0 \leq y \leq 2x\}$ und $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x, y) = xy + 3y^2$. Bestimmen Sie den Wert des Gebietsintegrals

$$I = \int_G f(x, y) d(x, y)$$

$I =$

- (g) Sei $G := \{[x, y]^T \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4, y \leq 0\}$. Berechnen Sie das Integral

$$I = \int_G (x^2 + y^2)^2 d(x, y).$$

(Hinweis: Polarkoordinaten können bei der Berechnung hilfreich sein.)

$I =$

- (h) Die Kurve $\gamma : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^3$ sei gegeben durch

$$\gamma(t) = [\sin(t), \cos(t), -t + \pi]^T, \quad t \in [0, \infty).$$

Berechnen Sie die Länge L des Teils der Kurve γ , der zwischen den Punkten $(0, 1, \pi)$ und $(1, 0, \frac{\pi}{2})$ liegt.

$L =$

Platz für Nebenrechnungen zur Aufgabe 2

3. Aufgabe (Ausführliche Aufgabe)

(20 Punkte)

(a) Wir betrachten die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x, y) = 4x^4 - 2x^2y^2 - y^2 + 2x$.

- i. Bestimmen Sie die Richtungsableitung von f im Punkt $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ in Richtung $\vec{r} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$. (2 Punkte)
- ii. Bestimmen Sie alle kritischen Punkte von f und deren Typ. (5 Punkte)

Platz zum Lösen der Aufgabe 3a

Platz zum Lösen der Aufgabe 3a

(b) Betrachten Sie das Vektorfeld $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} 6x^2y^4 + 6x \\ 8x^3y^3 + 8y^3 \end{bmatrix}$$

und die Kurve $\gamma : [-1, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$\gamma(t) = \begin{bmatrix} \sin\left(\pi\left(\frac{1}{3}t + \frac{5}{6}\right)\right) \\ t^2 \end{bmatrix}.$$

Berechnen Sie das Arbeitsintegral $W_\gamma(f) = \int_\gamma f \cdot T$.

(6 Punkte)

Platz zum Lösen der Aufgabe 3b

Platz zum Lösen der Aufgabe 3b

-
- (c) Sei $G := \{[x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, z \geq 0\}$ mit einer Konstanten $a > 0$ und das Vektorfeld $V : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$V\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} x^3 \\ y^3 \\ z^3 \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie den Fluss $\phi_{\partial G}(V)$ von V durch die Oberfläche ∂G von G von innen nach außen.

(7 Punkte)

Platz zum Lösen der Aufgabe 3c

Platz zum Lösen der Aufgabe 3c

Weiterer Platz für Rechnungen – bitte Aufgabe klar ausweisen!