

Bipyc BI4-1, BI4-2, BI4-3.

Вірус нестійкий в зовнішньому середовищі: гине при температурі 56°С протягом 30 хвилин, при 78°С - протягом 10 хвилин, инактивується за 10 хвилин етиловим ефіром, ацетоном, 1% розчином глютаральдегіду, 0,2% розчином гипохлорида натрію. Разом з тим, вірус зберігається у висушеному вигляді 4-6 днів при температурі 22°С, а при більш низькій - значно довше.

А що коли...?

При попаданні заразливого або підозрілого на заразливий ВІЧ матеріалу це місце негайно обробляють дезрозчином.

Шкіру рук і інших частин тіла під забрудненим одягом протирають 70° спиртом.

При попаданні заразливого матеріалу на обличчя його ретельно миють з милом, очі промивають водою або розчином марганцевокислого калія.

При попаданні заразного матеріалу в рот, ротову порожнину полоскают 70° спиртом.

При порушенні цілісності шкірних покривів (порізи, уколи) з травмованої поверхні видавлюють кров, шкіру обробляють 70° спиртом, потім йодом

А як саме...?

Увтрата маси менше 10%, поверхневі вірусні, грибкові ураження шкіри і слизистих оболонок, оперізувальний лишай, повторний фарингіт....

Прогресуюча втрата маси тіла більше 10%, нез'ясовна диарея або лихоманка більше 1 місяця, туберкульоз легенів, повторні або стійкі вірусні, бактерійні, грибкові ураження шкіри і слизистих оболонок, внутрішніх органів ...

.... Генерализовані бактерійні, вірусні, грибкові захворювання статевих шляхів, кандидоз стравоходу....

•••