

Compte rendu TP n°3 : Interpolation polynomiale


But du TP : création de fonctions m-file et à travers l'étude de la convergence de l'interpolation de Lagrange

Exercice n°1 :

- La première question demande de définir deux vecteurs, nous avons rentré les coordonnées des vecteurs lignes X et Y dans deux matrices distinctes.

```
% QUESTION 1 : Enregistrement des vecteur X et Y :  
X = [-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10]  
Y = [3.1623 2.8284 2.4495 2.0000 1.4142 0 1.4142 2.0000 2.4495 2.8284 3.1623]
```

- Les trois questions suivantes nécessitent la création de trois fonctions m-file :
 - La **fonction de Lagrange** retourne pour un x et un i donnés la valeur du polynôme L_i . Les polynômes L_i seront ensuite utilisés pour i allant de 0 à n comme coefficients dans l'interpolation de Lagrange. Le x lui, définit la valeur en laquelle on identifie la fonction.
Ces polynômes correspondent à des produits. La première étape est celle de l'initialisation du polynôme à 1 et se poursuit par des itérations pour obtenir le produit final. Pour cela mise en place d'une boucle for balayant les indices de 0 à j. J est le nombre de valeurs connues pour la fonction qui correspond à la taille de la matrice : au nombre d'éléments. Nous excluons la valeur $i=j$ grâce à une condition imposée par un if à chaque itération.




```
Editor - C:\Users\Admin\Documents\PERSONNEL\Titouan\ECOLE\INSIC\IA\matlab\TP2 31051  
tp3.m  Discretisation.m  Interpole.m  Lagrange.m  +  
1  function L=Lagrange(X,x,i)  
2  -   L=1  
3  -   for j =1: length(X)  
4  -       if i~=j  
5  -         L = L * ((x-X(j))/(X(i)-X(j)))  
6  -       end  
7  -   end
```

On appelle la fonction créée dans notre programme et on l'évalue par exemple ici pour $(X,x,i) = (X,2,3)$

```
%QUESTION 2 : Fonction Lagrange  
%l'utilisateur doit rentrer i et x  
  
i=3  
x=2  
L=Lagrange(X,x,i);
```

- La **fonction Interpole** permet pour un x donné d'exécuter la fonction d'interpolation de Lagrange à partir des coefficients L_i de Lagrange connus et des matrices X et Y correspondant aux valeurs réelles connues de notre fonction.
Pour effectuer la somme, nous initialisons la somme à 0 puis nous mettons en place une boucle for balayant toutes les valeurs ($\text{length}(Y)=\text{length}(X)$). A chaque itération, nous ajoutons un terme à la somme en appelant le produit du polynôme de Lagrange L_i et du y_i correspondant.



```
Editor - C:\Users\Admin\Documents\PERSO Titouan\ECOLE\INSIC\1A\matlab\TP
tp3.m  Discretisation.m  Interpole.m  Lagrange.m  +
1  function Z=Interpole(X,Y,x)
2      Z=0
3      for k=1:length(X)
4          Z=Lagrange(X,x,k)*Y(k)+Z
5      end
```


Nous appelons la fonction créée dans notre programme et on l'évalue en $(X,Y,x) = (X,Y,3)$

```
%QUESTION 3 : Fonction interpol
%l'utilisateur doit rentrer x

x=3
Z=Interpole(X,Y,x)
```

- La **fonction discrétisation** discrétise un intervalle $[a;b]$ en fonction d'un nombre de sous-intervalles n décidé par l'utilisateur.

Nous utilisons une variable h pour trouver la taille de chaque intervalle. Ensuite, il suffit de mettre en place une boucle for qui à chaque itération complète le vecteur ligne $X_{théo}$. Les différentes coordonnées du vecteur sont trouvées grâce à une fonction récursive. Nous initialisons la fonction avec la valeur a et à chaque itération d'indice i on ajoute le pas. Cela revient à utiliser a à chaque itération et faire la somme de a avec le produit de l'indice par le pas.



```
Editor - C:\Users\Admin\Documents\PERSO Titouan\ECOLE\INSIC\1A\matlab\TP
tp3.m  Discretisation.m*  Interpole.m  Lagrange.m  +
1  function Xtheo=Discretisation(a,b,n)
2      h=(b-a)/n
3      for m=0:n
4          Xtheo(m+1)=a+h*m
5      end
```

Nous appelons la fonction créée dans notre programme et l'évaluons en $(a,b,n)=(-10,10,20)$ avec -10 et 10 nos bornes d'intervalle et 20 le nombre de sous-intervalles.

Cette fonction nous permet de créer un nouveau tableau, plus complet que le précédent. A chaque x_i trouvé, nous associons la valeur de l'interpolation de Lagrange connue grâce au premier tableau. Nous enregistrons les données dans deux nouveaux vecteurs lignes : Xthéo et Ythéo.

```
% QUESTION 4 :Fonction discrétisation
%l'utilisateur doit rentrer n

n=20
a=-10
b=10

Xtheo=Discretisation(a,b,n)
% Création de la matrice Y théorique
for k=1:n+1
    Ytheo(k)=Interpole(X,Y,Xtheo(k))
end
```



- Tracer les courbes des différentes fonctions :



L'étape suivante est la comparaison des graphes de la fonction dont on connaît seulement les coordonnées exactes (x_i, y_i) de 11 points d'après l'énoncé, de celui de la fonction interpolation de Lagrange trouvée à partir de ce même énoncé et de la fonction continue $[-10; 10] \rightarrow \mathbb{R}; x \rightarrow \sqrt{|x|}$.

```
% QUESTION 5 : Graphique des fonction interpol et racine de x sur l'interval [-10;10]

hold on,
fplot('sqrt(abs(x))', [-10 10])
hold on
plot(Xtheo,Ytheo)
hold on
plot(X,Y, '*')
axis equal
title('Comparaison de interpol et racine de valeur absolu de X')
xlabel('X')
ylabel('Y')
legend(' racine(absolu(x))', ' interpol', ' nuage de points')
```

Ci-dessous, les différents graphiques illustrant la variation de n :





Nous nous apercevons que nous avons onze points de collocation, ce qui est cohérent puisque le tableau initial possède 11 valeurs, le degré du polynôme de Lagrange. Plus le n augmente, plus on discrétise l'intervalle plus on applique la fonction interpolate à un grand nombre d'antécédents. Graphiquement plus n augmente plus la courbe d'interpole traduit le graphe d'une fonction continue et dérivable. Elle possède de moins en moins de points anguleux.

- La dernière question repose sur les calculs d'erreurs quadratiques et absolues.

Nous appliquons les formules des deux erreurs l'une après l'autre. Pour l'erreur quadratique une boucle for nous permet de sommer chaque terme à la somme globale à chaque itération.

L'utilisation des fonctions sqrt, abs et max nous permet de répondre à la question.

```
%QUESTION 7 : Erreur quadratique de l'approximation : E
E=0
for w=1:length(Ytheo)
    E=E+(Ytheo(w)-sqrt(abs(Xtheo(w))))^2
end

%QUESTION 6 : Erreur absolue de l'approximation : e


e=max(abs(Ytheo-sqrt(abs(Xtheo))))
```

Exercice n°2 :

Nous rappelons les 3 fonctions m-file pour interpoler avec Lagrange une nouvelle fonction f :

L'intervalle de travail de $[-1; 1]$ est discrétisé par la fonction discrétisation pour créer un tableau à 5 valeurs, dans $X3$. Ensuite le programme évalue la valeur exacte de la fonction en ces points x_i . La fonction interpolate permet d'évaluer l'interpolation de Lagrange de ces mêmes x_i . Puis, nous utilisons l'expression demandée pour créer un nouveau nuage de points donc une matrice X et re-appliquer la fonction à ces antécédents.

```
70 % exercice 2
71 %-----
72
73 - close all
74
75 %FONCTION F(x) :
76
77 %Déclaration des bornes de l'intervalle de travail
78 - a=-1;
79 - b=1;
80
81 %Creation des vecteurs X2 et Y2 comme ceux de l'exercice 1 à l'aide de la
82 %fonction discrétisation
83
84 %Il faut que l'utilisateur rentre le n
85 - n=4;
86
87 - X2=Discretisation(a,b,n);
88 - for q=1:length(X2)
89 -     Y2(q)=1/(1+25*(X2(q))^2)
90 - end
91
92 %Creation des vecteurs X3 et Y3 (comme Xtheo et Ytheo de l'exo 1)
93 - n2=500
94 - X3=Discretisation(a,b,n2);
95 - for s=1:length(X3)
96 -     Y3(s)=Interpole(X2,Y2,X3(s))
97 - end
98
99
100 %Graphique des fonctions interpol et f(x) sur l'intervalle [-1;1]
101
102 - hold on
103 - fplot('1/(1+25*x^2)',[-1 1]) %graph F(x) continue
104 - plot(X2,Y2,'*') %graph des valeurs discretes de X Y=F(X)
105 - plot(X3,Y3) %graph de l'interpol
106 - title('Comparaison de interpol et f(x)')
107 - xlabel('X')
108 - ylabel('Y')
109 - legend('f(x)', 'valeurs discretes de X Y=F(X)', 'interpol')
110
```




```


111
112 %FONCTION Nuage de points :
113
114 n=500
115 for i =1:n
116     X4(i) = ((b-a)/2)*cos(((2*i+1)/(2*(n+1)))*pi)+(b+a)/2
117 end
118
119 for s=1:length(X4)
120     Y4(s) = Interpole(X2,Y2,X4(s))
121 end
122
123 %Graphique des fonctions interpol et f(x) avec le nouveau nuage de points sur l'intervalle [-1;1]
124 close all
125 hold on
126 fplot('1/(1+25*x^2)', [-1 1]) %graph F(x) continue
127 plot(X2,Y2, '*') %graph des valeurs discrètes de X Y=F(X)
128 plot(X4,Y4) %graph de l'interpol avec le nuage de points
129 title('Comparaison de l'interpolé et f(x)')
130 xlabel('X')
131 ylabel('Y')
132 legend('f(x)', 'valeurs discrètes de X Y=F(X)', 'interpol par le nuage de points')
133
134
135

```

Plus n augmente plus le tableau initial possède de valeur, plus le degré du polynôme de Lagrange augmente, plus nous obtenons de points de collocations entre la courbe réelle et la courbe d'interpolation ; ainsi plus la courbe devient précise. Cependant plus n augmente plus la courbe d'interpolation oscille et s'éloigne de la valeur réelle. Cela correspond avec le constat fait en cours.

Ci-dessous les graphiques montrant cela :





On constate aussi le même phénomène de continuité et de dérivabilité vu dans l'exercice quand on fait varier le nombre d'antécédents auxquels on applique la fonction.

Après avoir utilisé le nuage de points proposé dans l'exercice plutôt que la fonction discrétisation, on constate que plus n est grand plus on se rapproche du graphique vu avec la fonction interpolé à partir de l'intervalle discrétisé. Concernant les points de collocations, la même observation est remarquée.

Ci-dessous les graphiques montrant cela :

