

1 Des exemples

Donner deux exemples différents dans chacune des situations suivantes :

- ☐ une suite décroissante positive dont le terme général ne tend pas vers 0 .
- ☐ une suite bornée non convergente.
- ☐ une suite positive non bornée ne tendant pas vers $+\infty$.
- ☐ une suite non monotone qui tend vers 0.
- ☐ une suite positive qui tend vers 0 et qui n'est pas décroissante.

2 Vrai ou Faux ?

Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses. On justifiera les réponses avec une démonstration ou un contre-exemple.

- ☐ Toute suite non-majorée tend vers $+\infty$.
- ☐ Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite à termes positifs convergeant vers 0. Alors, (u_n) est décroissante à partir d'un certain rang.
- ☐ Si (u_n) est une suite géométrique de raison $q \neq 0$, alors $\left(\frac{1}{u_n}\right)$ est une suite géométrique de raison $\frac{1}{q}$.
- ☐ Soit (u_n) une suite croissante et $\ell \in \mathbb{R}$. Si pour tout $N \in \mathbb{N}$, il existe $n_0 \geq N$ tel que $u_{n_0} > \ell$, alors (u_n) ne converge pas vers ℓ .
- ☐ Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est croissante et que (u_n) vérifie $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout entier n , alors (u_n) est croissante.
- ☐ Si u est divergente, alors u est non bornée.
- ☐ Si $u_n \rightarrow \ell$ et f continue, alors $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$

3 Étude de suites

Étudier la nature des suites suivantes, et déterminer un équivalent simple :

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| a) $u_n = \frac{\sin(n) + 3 \cos(n^2)}{\sqrt{n}}$ | d) $u_n = \sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}$ | g) $u_n = \frac{n!}{45^n}$ |
| b) $u_n = \frac{2n + (-1)^n}{5n + (-1)^{n+1}}$ | e) $u_n = 3^n e^{-3n}$. | h) $u_n = \frac{n!}{n^n}$ |
| c) $u_n = \frac{n^3 + 5n}{4n^2 + \sin(n) + \ln(n)}$ | f) $u_n = \frac{n}{2^n}$ | i) $u_n = \frac{n^3 + 2^n}{n^2 + 3^n}$. |

4 Plus difficile

Étudier la nature des suites suivantes, et déterminer un équivalent simple :

- | | |
|---|---|
| a) $u_n = \ln(2n^2 - n) - \ln(3n + 1)$ | d) $u_n = \frac{\ln(n+e^n)}{n}$ |
| b) $u_n = \sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 - n + 1}$ | e) $u_n = \frac{\ln(1+\sqrt{n})}{\ln(1+n^2)}$. |
| c) $n = \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}, a, b \in]0, +\infty[$ | |

5 Formule de Stirling

- Soit (x_n) une suite de réels et soit (y_n) définie par $y_n = x_{n+1} - x_n$. Démontrer que la série $\sum_n y_n$ et la suite (x_n) sont de même nature.
- On pose (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{n^n e^{-n} \sqrt{n}}{n!}$. Donner la nature de la série de terme général $v_n = \ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$.
- En déduire l'existence d'une constante $C > 0$ telle que :

$$n! \sim_{+\infty} C \sqrt{n} n^n e^{-n}$$

6 Télescopiques

- Déterminer deux réels a et b tels que $\frac{1}{k^2 - 1} = \frac{a}{k - 1} + \frac{b}{k + 1}$.
- En déduire la limite de la suite $u_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2 - 1}$.
- Sur le même modèle, déterminer la limite de la suite $v_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k^2 + 3k + 2}$.
- Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}$.
- En déduire le comportement de la suite (u_n) définie par $u_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Séries numériques

7 Paramètres

Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Pour $n \geq 1$, on pose $u_n = \ln(n) + a \ln(n+1) + b \ln(n+2)$.

- Pour quelle(s) valeur(s) de (a, b) la série $\sum u_n$ est-elle convergente ?
- Dans le(s) cas où la série converge, déterminer $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.

8 Avec l'exponentielle

Sachant que $e = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$, déterminer la valeur des sommes suivantes :

- $\sum_{n \geq 0} \frac{n+1}{n!}$
- $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2-2}{n!}$
- $\sum_{n \geq 0} \frac{n^3}{n!}$.