

## Composition de MATHÉMATIQUES (3h) : 35 points

### ■ Exercice 1 : Équations (8 points)

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations ou systèmes suivants :

1.  $e^{2x} - 2e^x + 1 = 0$

3.  $\cos\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$

2.  $\ln(4x^2) = 2$

4.  $\cos(7x) + \sin(7x) = 1$

### Solution

1.  $e^{2x} - 2e^x + 1 = 0$  L'ensemble de définition est  $\mathbb{R}$ .

On pose  $X = e^x$ , avec  $X > 0$ . L'équation devient :  $X^2 - 2X + 1 = 0 \iff (X - 1)^2 = 0 \iff X = 1$

Donc  $e^x = 1 \iff x = \ln(1) = 0$

**Ensemble solution :**  $\boxed{\{0\}}$

2.  $\ln(4x^2) = 2$  L'ensemble de définition est  $\mathbb{R}$ .

On utilise la propriété  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$  et  $\ln(e^2) = 2$  :

$$\ln(4x^2) = \ln 4 + \ln(x^2)$$

$$\ln(x^2) = \ln\left(\frac{e^2}{4}\right) \iff |x| = \frac{e}{2}$$

**Ensemble solution :**  $\boxed{\left\{-\frac{e}{2}; \frac{e}{2}\right\}}$

3.  $\cos\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$

On utilise la formule  $\cos\left(a - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(a)$  :

$$\sin(3x) = \frac{1}{2} \iff 3x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 3x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$$

$$\iff x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3} \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z}$$

**Ensemble solution :**

$$\boxed{x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

4.  $\cos(7x) + \sin(7x) = 1$  L'ensemble de définition est  $\mathbb{R}$ .

On cherche à écrire cette somme sous la forme :

$$\cos(7x) + \sin(7x) = R \cos(7x - \alpha)$$

où  $R = \sqrt{a^2 + b^2}$  avec  $a = 1$ ,  $b = 1$ , donc :

$$R = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \text{et} \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} \iff \alpha = \frac{\pi}{4}$$

On a donc :

$$\cos(7x) + \sin(7x) = \sqrt{2} \cos\left(7x - \frac{\pi}{4}\right)$$

L'équation devient alors :

$$\sqrt{2} \cos\left(7x - \frac{\pi}{4}\right) = 1 \iff \cos\left(7x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

On résout :

$$7x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } 7x - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

Deux cas :

$$- 7x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \iff 7x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \iff x = \frac{\pi}{14} + \frac{2k\pi}{7}$$

$$- 7x - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \iff 7x = 2k\pi \iff x = \frac{2k\pi}{7}$$

**Solution :**

$$x = \frac{2k\pi}{7} \text{ ou } x = \frac{\pi}{14} + \frac{2k\pi}{7}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

### ■ Exercice 2 : Réponse d'un capteur à un changement de température (6 points)

Un capteur de température est initialement à l'équilibre thermique dans un environnement à 20°C. À l'instant  $t = 0$ , il est brusquement plongé dans un liquide maintenu à 80°C.

On modélise la température  $T(t)$  indiquée par le capteur à l'instant  $t$  (en secondes) par la fonction :

$$T(t) = 80 - 60e^{-t/5}$$

où  $T(t)$  est exprimée en degrés Celsius.

1. Quelle est la température initiale lue par le capteur ? Et la température à long terme ?
2. À quelle date le capteur affiche-t-il une température de 50°C ?
3. Déterminer la dérivée  $T'(t)$ , puis montrer que :

$$T'(t) = \frac{12}{e^{t/5}}$$

4. Interpréter le signe de  $T'(t)$ . Que peut-on dire de l'évolution de la température ?
5. Déterminer le temps mis par le capteur pour atteindre 95% de la température finale.

### Solution

1. Température initiale :

$$T(0) = 80 - 60e^0 = 80 - 60 = 20^\circ\text{C}$$

Température à long terme :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (T(t)) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (80 - 60e^{-t/5}) = 80$$

2. On résout :  $T(t) = 50$

$$50 = 80 - 60e^{-t/5} \iff 60e^{-t/5} = 30 \iff e^{-t/5} = \frac{1}{2} \iff t = 5 \ln(2)$$

3. Dérivée de  $T$ , fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme somme de fonctions dérivables :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad T'(t) = -60 \cdot \left( \frac{d}{dt} e^{-t/5} \right) = -60 \cdot \left( -\frac{1}{5} e^{-t/5} \right) = \frac{60}{5} e^{-t/5} = 12 e^{-t/5}$$

Montrons :

$$\boxed{T'(t) = \frac{12}{e^{t/5}}} \quad \text{car} \quad e^{-t/5} = \frac{1}{e^{t/5}}$$

4.  $T'(t) > 0$  pour tout  $t \geq 0$  car une exponentielle réelle est toujours positive.

Donc  $T$  est strictement croissante : la température indiquée par le capteur augmente.

5. Température finale :  $T_f = 80^\circ\text{C}$ . On cherche  $t$  tel que :

$$T(t) = 0,95 \times 80 = 76 \iff 76 = 80 - 60e^{-t/5} \iff 60e^{-t/5} = 4 \iff e^{-t/5} = \frac{1}{15} \iff t = -5 \ln\left(\frac{1}{15}\right) = 5 \ln(15)$$

### ■ Exercice 3 : Logique, sommes et produits (10 points)

1. Donner la table de vérité de la proposition logique :

$$(P \Rightarrow Q)$$

2. Donner la table de vérité de la proposition logique :

$$(P \Rightarrow Q) \wedge (\neg Q \Rightarrow \neg P)$$

3. En déduire une équivalence logique.

4. Démontrer par récurrence que :

$$(*) \quad \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

5. Calculer les expressions suivantes :

$$- \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

$$- \prod_{k=1}^n e^{k-1}, \text{ on pourra utiliser la relation } (*).$$

### Solution

1. Table de vérité de  $(P \Rightarrow Q)$  :

$P$	$Q$	$P \Rightarrow Q$
$V$	$V$	$V$
$V$	$F$	$F$
$F$	$V$	$V$
$F$	$F$	$V$

2. Table de vérité de  $(P \Rightarrow Q) \wedge (\neg Q \Rightarrow \neg P)$  :

$P$	$Q$	$P \Rightarrow Q$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$	Conjonction
$V$	$V$	$V$	$V$	$V$
$V$	$F$	$F$	$F$	$F$
$F$	$V$	$V$	$V$	$V$
$F$	$F$	$V$	$V$	$V$

3. On en déduit :

$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P) \quad (\text{contraposée})$$

4. Montrons par récurrence que pour tout entier naturel  $n$  non nul

$$P_n : \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

est vraie.

**Initialisation :** pour  $n = 1$ , on a

$$\sum_{k=1}^1 k = 1 \text{ et } \frac{1(1+1)}{2} = 1$$

:  $P_1$  est vraie.

.

**Hérédité :** supposons la formule vraie au rang  $n$ , montrons-la au rang  $n+1$  :

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \left( \sum_{k=1}^n k \right) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Conclusion : la propriété est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  par récurrence.

5. **Calculs :**

—

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \ln \left( 1 + \frac{1}{k} \right) &= \sum_{k=1}^n \ln \left( \frac{k+1}{k} \right) = \sum_{k=1}^n [\ln(k+1) - \ln(k)] \\ &= \ln(n+1) - \ln(1) = \ln(n+1) \end{aligned}$$

—

$$\prod_{k=1}^n e^{k-1} = e^{\sum_{k=1}^n (k-1)} = e^{\sum_{k=0}^{n-1} k} = e^{\frac{(n-1)n}{2}} \quad (\text{formule (*) utilisée})$$

#### ■ Exercice 4 : Vecteurs et géométrie plane (11 points)

On considère dans le plan muni d'un repère orthonormé les points :  $A(1, 2, 0)$ ,  $B(0, 4, 6)$ ,  $C(7, -1, 2)$ .

1. Calculer les coordonnées des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
2. Calculer les longueurs  $AB$  et  $AC$ .
3. Calculer le produit scalaire entre les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  et le produit vectoriel vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
4. En déduire le cosinus et le sinus de l'angle  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ .
5. Donner une équation paramétrique de la droite  $(AB)$ .
6. Déterminer la distance du point  $C$  à la droite  $(AB)$ .

#### Solution

1. Calcul des vecteurs :

$$\overrightarrow{AB} : (0 - 1, 4 - 2, 6 - 0) = (-1, 2, 6)$$

$$\overrightarrow{AC} : (7 - 1, -1 - 2, 2 - 0) = (6, -3, 2)$$

2. Longueurs :

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(-1)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{1 + 4 + 36} = \sqrt{41}$$

$$AC = \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{(6)^2 + (-3)^2 + (2)^2} = \sqrt{36 + 9 + 4} = \sqrt{49} = 7$$

3. Produit scalaire :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-1)(6) + 2(-3) + 6(2) = 0$$

Produit vectoriel :

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (2 \cdot 2 - 6 \cdot (-3))\vec{i} - (-1 \cdot 2 - 6 \cdot 6)\vec{j} + (-1 \cdot (-3) - 2 \cdot 6)\vec{k} = 22\vec{i} + 38\vec{j} - 9\vec{k}$$

4. Angle entre les vecteurs :

Comme le produit scalaire est nul, on a :

$$\cos(\theta) = 0 \iff \theta = \frac{\pi}{2}, \quad \text{donc } \sin(\theta) = 1$$

5. Équation paramétrique de la droite  $(AB)$  :

Un point :  $A(1, 2, 0)$ , un vecteur directeur  $\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 6)$

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = 6t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

6. Distance du point  $C$  à la droite  $(AB)$  :

$$d(C, AB) = \frac{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}{\|\overrightarrow{AB}\|} = \frac{\sqrt{22^2 + 38^2 + (-9)^2}}{\sqrt{41}} = \frac{\sqrt{484 + 1444 + 81}}{\sqrt{41}} = \frac{\sqrt{2009}}{\sqrt{41}} = \sqrt{\frac{2009}{41}}$$