
Algèbre linéaire - Chapitre 4

Applications linéaires

4.1 Rappels : Familles de vecteurs et Systèmes linéaires

Pour étudier une famille de vecteurs $\mathcal{F} = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ de \mathbb{R}^n , on se ramène souvent à l'étude d'un système linéaire.

Ce que je dois savoir

Liens entre familles et systèmes linéaires ($AX = Y$)

- **Famille Libre** : La famille \mathcal{F} est dite **libre** si le système linéaire homogène $\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_p u_p = 0$ admet **une unique solution** (la solution nulle $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_p = 0$).
- **Famille Génératrice** : La famille \mathcal{F} est dite **génératrice** si pour tout vecteur $y \in \mathbb{R}^n$, le système $\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_p u_p = y$ admet **au moins une solution**.
- **Base** : C'est une famille à la fois libre et génératrice. Pour tout vecteur $y \in \mathbb{R}^n$, le système $\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_p u_p = y$ admet **une unique solution**.

4.2 Applications Linéaires

Une application $f : E \rightarrow F$ est dite **linéaire** si elle conserve les combinaisons linéaires.

Pour le démontrer en pratique, on vérifie séparément la conservation de la somme et du produit par un scalaire.

Méthode

Méthode : Montrer qu'une application est linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Pour prouver que f est linéaire, on procède en deux étapes :

1. Conservation de l'addition :

Soient $u, v \in \mathbb{R}^n$.

- D'un côté, on calcule l'image de la somme : $f(u + v)$.
- De l'autre, on calcule la somme des images : $f(u) + f(v)$.
- On constate que les deux résultats sont égaux.

2. Conservation de la multiplication scalaire :

Soient $u \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- D'un côté, on calcule l'image du vecteur multiplié : $f(\lambda u)$.
- De l'autre, on multiplie l'image par le scalaire : $\lambda f(u)$.
- On constate que les deux résultats sont égaux.

**Méthode****Méthode alternative : Une seule vérification**

f est linéaire si et seulement si pour tous $u, v \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$f(u + \lambda v) = f(u) + \lambda f(v)$$

Cela permet de vérifier les deux propriétés (additivité et homogénéité) d'un seul coup !

4.3 Exercices d'application**Exercice 1**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 3x$. Cette application est-elle linéaire ?

Exercice 2

Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x, y) = x$. Cette application est-elle linéaire ?

Indication : Tester $g((x_1, y_1) + (x_2, y_2))$ et $g(\lambda(x, y))$.

Exercice 3

Soit $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $h(x, y) = (0, 0)$. Cette application est-elle linéaire ?

Exercice 4

L'application $k : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $k(x, y) = (2x + y, x - 3y)$ est-elle linéaire ?

Indication : Appliquer la méthode ci-dessus avec $u = (x, y)$ et $v = (x', y')$.

Exercice 5

L'application $l : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $l(x) = x^2$ est-elle linéaire ?

Indication : Calculer $l(1 + 1)$ et comparer avec $l(1) + l(1)$.

Exercice 6

L'application $m : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $m(x, y, z) = x + y + z + 1$ est-elle linéaire ?

Indication : Vérifier si $m(0_{\mathbb{R}^3}) = 0$. Si ce n'est pas le cas, l'application ne peut pas être linéaire.