

Les nombres complexes

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

5 août 2026

« Les nombres complexes furent introduits par J. Cardan en 1545 dans le cadre de la résolution des équations du troisième degré et les opérations sur leur corps furent définies par R. Bombelli en 1572 » [Odifreddi, 2004, p. 38]. « La définition formelle des nombres complexes, comme couple de nombres réels, et des opérations de leur corps fut donnée par W. R. Hamilton en 1837 » [Odifreddi, 2004, p. 39].

Jérôme Cardan (1501-1576)
Raphaël Bombelli (1526-1572/1573)
William Rowan Hamilton (1805-1865)

1 Construction de l'ensemble $\mathbb{C}$

La construction de l'ensemble $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$ se démontre en utilisant l'algèbre linéaire. Si le lecteur n'est pas encore à l'aise avec ce domaine, il peut passer directement à la partie suivante. Toutefois, il doit garder en tête que les définitions expliquées et quelque peu déroutantes *a priori* se démontrent et se justifient pleinement.

1.1 Ensemble de nombres

Un **ensemble de nombres** est algébriquement un **corps**. Un corps possède deux opérations $+$ et $\times$ vérifiant cinq conditions.

1. Les opérations sont **associatives**.

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, (a + b) + c = a + (b + c) \quad (1)$$

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, (a \times b) \times c = a \times (b \times c) \quad (2)$$

2. Les opérations sont **commutatives**.

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a + b = b + a \quad (3)$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a \times b = b \times a \quad (4)$$

3. Les opérations possèdent chacune un **élément neutre**.

$$\forall a \in \mathbb{R}, a + 0 = a \quad (5)$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, a \times 1 = a \quad (6)$$

4. La **distributivité** de l'addition sur la multiplication existe.

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, (a + b) \times c = (a \times c) + (b \times c) \quad (7)$$

5. Tous les nombres possèdent un **opposé**, et tous les nombres possèdent un **inverse**.

N.B. Un corps qui contient $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

1.2 Corps des complexes

On recherche un ensemble de nombres $\mathbb{K}$ qui contient strictement $\mathbb{R}$ dans lequel tous les éléments possèdent une racine carrée.

1. Soit α un élément de $\mathbb{K}$ avec $\alpha \notin \mathbb{R}$, alors $\forall a, b \in \mathbb{R}, a + b\alpha \in \mathbb{K}$.
2. On suppose que tous les éléments de $\mathbb{K}$ puissent s'écrire ainsi. On suppose que l'on a :

$$\forall z \in \mathbb{K}, \exists a, b \in \mathbb{R}, z = a + b\alpha \quad (8)$$

Cela signifie que l'on obtient un plan de nombres.

a. On vérifie l'addition. Soient $x = a + b\alpha$ et $y = c + d\alpha$, alors :

$$x + y = (a + c) + (b + d)\alpha \quad (9)$$

b. On vérifie la multiplication.

$$\begin{aligned} xy &= (a + b\alpha)(c + d\alpha) \\ xy &= ac + bc\alpha + ad\alpha + bd\alpha^2 \\ xy &= ac + (bc + ad)\alpha + bd\alpha^2 \end{aligned} \quad (10)$$

Comme $\alpha^2 \in \mathbb{K}$, il existe deux nombres u et v dans $\mathbb{R}$ tels que :

$$\alpha^2 = u + v\alpha \Leftrightarrow \left(\alpha - \frac{1}{2}v\right)^2 = \frac{4u + v^2}{4} \quad (11)$$

1.2.1 Hypothèse 1 : $4u + v^2 \geq 0$

Si $4u + v^2 \geq 0$, alors $\exists r \in \mathbb{R}, \frac{4u+v^2}{4} = r^2$.

Si on considère l'équation $X^2 = A^2$ dans un corps $\mathbb{K}$ avec $A \in \mathbb{K}$.

$$\begin{aligned}
 & X^2 = A^2 \\
 \Leftrightarrow & X^2 - A^2 = 0_{\mathbb{K}} \\
 \Leftrightarrow & (X - A)(X + A) = 0_{\mathbb{K}} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} X - A = 0_{\mathbb{K}} \\ \text{ou} \\ X + A = 0_{\mathbb{K}} \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} X = A \\ \text{ou} \\ X = -A \end{cases}
 \end{aligned} \tag{12}$$

Si $4u + v^2 \geq 0$, alors on en déduit que :

$$\begin{cases} \alpha = \frac{1}{2}v + r \\ \text{ou} \\ \alpha = \frac{1}{2}v - r \end{cases} \tag{13}$$

Comme $\alpha \in \mathbb{R}$, on aboutit à une contradiction avec l'hypothèse de départ puisque $\alpha \notin \mathbb{R}$.

N.B. On a démontré la présence de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{K}$.

1.2.2 Hypothèse 2 : $4u + v^2 < 0$

$$\begin{aligned}
 & \left(\alpha - \frac{1}{2}v\right)^2 = \frac{4u+v^2}{4} \\
 \Leftrightarrow & (2\alpha - v)^2 = 4u + v^2
 \end{aligned} \tag{14}$$

Comme $-4u - v^2 \geq 0$, on en déduit que :

$$\left(\frac{2\alpha - v}{\sqrt{-4u - v^2}}\right)^2 = -1 \tag{15}$$

On pose $\frac{2\alpha - v}{\sqrt{-4u - v^2}} = i$. Il existe de fait un nombre $i^2 = -1$ pour vérifier les hypothèses de départ, à savoir un ensemble de nombres $\mathbb{K}$ qui contient $\mathbb{R}$ dans lequel tous les éléments possèdent une racine carrée.

Il existe une expression de α de la forme $s + ti$ avec $s \in \mathbb{R}$ et $t \in \mathbb{R}$, ce qui fait que tout élément de $\mathbb{K}$ peut s'écrire :

$$z = a + ib \tag{16}$$

1.2.3 Conclusion

La multiplication devient :

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc) \quad (17)$$

Comme l'addition, elle vérifie toutes les hypothèses d'un corps.

On montre que les propriétés du corps sont valides :

$$\mathbb{K} = \mathbb{C} = \{a + ib, (a, b) \in \mathbb{R}^2, i^2 = -1\} \quad (18)$$

Dans ce cas, pour obtenir un corps, il n'existe aucune autre solution : $i^2 = -1$.

1.3 Unicité du corps des complexes

Il a été démontré précédemment une solution à l'hypothèse de départ, mais existe-t-il un autre corps $\mathbb{K}$ de dimension finie vérifiant cette hypothèse.

On suppose que $\mathbb{K}$ est un corps contenant $\mathbb{R}$ et un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie. On choisit un nombre $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $\alpha \notin \mathbb{R}$.

Soit une famille $\{1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^n\}$, alors on peut écrire :

$$P(\alpha) = 1 \times \lambda_0 + \alpha \times \lambda_1 + \alpha^2 \times \lambda_2 + \alpha^3 \times \lambda_3 + \dots + \alpha^n \times \lambda_n \quad (19)$$

avec des coefficients λ_n réels. Si $P(\alpha) = 0$, on dit que la famille est libre. Dans ce cas, l'unique solution est : $\lambda_0 = \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \dots = \lambda_n$. Dans le cas contraire, il existe des coefficients $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$ et λ_n non nuls tels que la famille est **liée**.

Si la famille $\{1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^n\}$ est liée, il existe par conséquent un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré 2 tel que :

$$\lambda_0 + \lambda_1 \alpha + \lambda_2 \alpha^2 = 0 \quad (20)$$

α est la racine de ce polynôme. On peut calculer le discriminant du polynôme :

$$\Delta = \lambda_1^2 - 4\lambda_0\lambda_2 \quad (21)$$

On veut vérifier que $\alpha \in \mathbb{K}$ et $\alpha \notin \mathbb{R}$. De fait, Δ est négatif par obligation. Les solutions du polynôme sont :

$$\alpha_1 = \frac{-\lambda_1 - \sqrt{-\Delta}}{2\lambda_0} \quad (22)$$

et

$$\alpha_2 = \frac{-\lambda_1 + \sqrt{-\Delta}}{2\lambda_0} \quad (23)$$

Ainsi, il existe un élément i appartenant à $\mathbb{K}$ vérifiant $i^2 = -1$, et α peut s'écrire :

$$\alpha = s + ti \quad (24)$$

Le polynôme $X^2 + 1$ admet alors deux racines : $-i$ et i . En effet :

$$\Delta = 0 - 4 \times 1 \times 1 \quad (25)$$

donc :

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{4i^2} = 2i \quad (26)$$

donc :

$$X_1 = \frac{-2i}{2} = -i \quad (27)$$

$s = 0$ et $t = -1$, et :

$$X_2 = \frac{2i}{2} = i \quad (28)$$

$s = 0$ et $t = 1$

La famille $\{1, i\} = \{1, \alpha\}$ est un sous-espace vectoriel de $\{1, i, i^2, i^3, \dots, i^n\} = \{1, i, -1, -i, \dots, i^n\}$ avec $i^n = -1$ si n est impair et $i^n = 1$ si n est pair. La famille $\{1, i\}$ est génératrice. Tous les éléments de $\mathbb{R}[X]$ sont des combinaisons linéaires de 1 et i . Le sous-espace vectoriel $\{1, i\}$ engendre l'espace entier $\{1, i, i^2, i^3, \dots, i^n\}$.

K est par conséquent de dimension 2 : $\dim \mathbb{K} = 2$. L'ensemble $\mathbb{C}$ est l'**unique** solution à l'hypothèse de départ.

$$\mathbb{K} = \mathbb{C} = \{a + ib, (a, b) \in \mathbb{R}^2, i^2 = -1\} \quad (29)$$

De fait, pour obtenir un corps, il n'existe qu'une unique solution : poser $i^2 = -1$.

N.B. L'ensemble des quaternions, composé des nombres de la forme $z = a + ib + jc + kd$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, ne possède pas une multiplication commutative. Ce n'est pas un corps. L'unique corps possible incluant le corps des réels est le corps des complexes. Au-delà de $\mathbb{C}$, il n'existe aucune extension des ensembles de nombres.

2 Définitions

Définition 1. L'ensemble des nombres complexes est l'ensemble des nombres de la forme $a + ib$ avec $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$. On le note $\mathbb{C}$.

Un nombre complexe se note $z = a + ib$.

— a est la partie réelle de z : $\Re(z) = a$.

— b est la partie imaginaire pure de z : $\Im(z) = b$.

L'ensemble des imaginaires est noté $i\mathbb{R}$.

Si $\Re(z) = 0$, alors $z = ib$ est dit **imaginaire pur**.

Définition 2. Soit $\mathbb{R}$ le corps des réels, soit $\mathbb{C}$ l'ensemble-produit $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, dont chaque élément est un couple rangé $z = (a, b)$ de deux nombres réels a et b .

Définition 3. L'ensemble $\mathbb{C}$ se définit par deux opérations internes, conférant à $\mathbb{C}$ la structure de corps commutatif de telle manière que l'on puisse établir un isomorphisme entre $\mathbb{R}$ et une partie $\mathbb{C}^*$ de $\mathbb{C}$. Il faut préciser que $\mathbb{C}^*$ est l'ensemble des éléments de $\mathbb{C}$ de la forme $(a, 0)$.

Dit autrement, l'application $\underbrace{a}_{\in \mathbb{R}} \leftrightarrow \underbrace{(a, 0)}_{\in \mathbb{C}^*}$ réalise un isomorphisme pour l'addition entre les ensembles $\mathbb{C}^*$ et $\mathbb{R}$.

Soient $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$, alors :

1. l'égalité dans $\mathbb{C}$ est l'identité :

$$(a, b) \Leftrightarrow \begin{cases} a = a' \\ b = b' \end{cases} \quad (30)$$

$$2. z = 0 \Leftrightarrow a + ib = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \Re(z) = a = 0 \\ \Im(z) = b = 0 \end{cases}$$

$$3. z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Im(z) = 0$$

$$4. z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \Re(z) = 0$$

2.1 Opérations dans $\mathbb{C}$

Soient $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$, alors :

— les lois de composition interne sont :

■ l'addition :

◆ l'associativité : $z + z' = a + a' + i(b + b')$;

◆ la commutativité : $z + z' = z' + z$;

◆ l'opposé de z : $-z = -a - ib$;

◆ $z = 0 = (a + ib) + (-a - ib)$.

■ la multiplication :

◆ l'associativité : $zz' = (a + ib)(a' + ib') = aa' - bb' + i(ab' + a'b)$;

◆ la commutativité : $zz' = z'z$;

◆ l'élément neutre : $z \times 1 = (a + ib)(1 + i0) = a + ib = z$;

◆ l'élément absorbant : $z \times 0 = 0$;

- ◆ la distributivité par rapport à l'addition.
- tout élément non nul a un inverse noté $z^{-1} = \frac{1}{z}$;
- tout élément de $\mathbb{C}$ n'est simplifié que s'il est écrit sous sa forme algébrique : $a + ib$.

La valeur de la somme des termes d'une suite géométrique avec des nombres complexes vaut :

$$\forall z \neq 0, 1 + z + z^2 + \dots + z^n = \sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} \quad (31)$$

2.2 Interprétation géométrique

On considère le plan $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ (Fig. 1).

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{C} \xrightarrow{f} \delta \\ z = a + ib \mapsto M(a, b) \end{array} \right. \quad (32)$$

$\mathcal{P}$ est appelé **plan complexe**.

M est le point image de z .

z s'appelle l'**affixe** de M , noté $M(z)$ ou représente un vecteur $\vec{OM}$.

L'axe des abscisses est appelé l'**axe des réels**. $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow M \in (\text{axe des réels})$

L'axe des ordonnées est appelé l'**axe des imaginaires**. $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow M \in (\text{axe des imaginaires})$

$$\vec{v} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{v}(a, b) \\ \vec{v} \text{ est le vecteur image de } z \\ z \text{ est l'affixe de } \vec{v}, \text{ noté } \vec{v}(z) \end{array} \right. \quad (33)$$

2.3 Propriétés des vecteurs dans le plan complexe

$$\vec{u}(z) \text{ et } \vec{v}(z') \Leftrightarrow (\vec{u} + \vec{v})(z + z')$$

$$\vec{u}(z) \Leftrightarrow \lambda \vec{u}(\lambda z) \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} : z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$$

$$\text{Si } I \text{ est le milieu de } [AB], \text{ alors } z_I = \frac{1}{2}(z_A + z_B)$$

$$\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow z_{\vec{u}} = z_{\vec{v}}$$

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont colinéaires} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} \ z_{\vec{u}} = k z_{\vec{v}}$$

3 Le conjugué d'un nombre complexe

Soit $z = a + ib$, on appelle conjugué de z , le complexe $a - ib$. On le note $\bar{z}$, ce qui se lit « z barre ».




FIGURE 1 – Représentation d'un nombre complexe dans le plan complexe

3.1 Propriétés

$$\overline{(\overline{z})} = z$$

$$z + \bar{z} = 2a = 2\Re(z)$$

$$z - \bar{z} = 2ib = 2\Im(z)$$

$$z\bar{z} = a^2 + b^2$$

$$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z + \bar{z} = 2z$$

$$z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow z + \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z = -\bar{z}$$

3.2 Opérations

Théorème. La loi qui, à un nombre complexe, fait correspondre son conjugué est un automorphisme sur $\mathbb{C}$ muni d'une structure de corps.

$$\begin{aligned}
z + z' &= \bar{z} + \bar{z}' \\
z\bar{z}' &= \bar{z}z' = a^2 + b^2 \\
\left(\frac{1}{z}\right) &= \frac{1}{\bar{z}} \\
\left(\frac{z}{z'}\right) &= \frac{\bar{z}}{\bar{z}'} \\
\bar{\bar{z}} &= z \\
z = \bar{z} &\Leftrightarrow z \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

3.3 Interprétation géométrique

Soient $M(z) : a + ib$ et $M'(\bar{z}) : a - ib$, alors on obtient le plan complexe de la figure 2. La correspondance $z \leftrightarrow \bar{z}$ est une bijection **involutive** dans laquelle les seuls éléments invariants sont les nombres réels.




FIGURE 2 – Représentation d'un nombre complexe et de son conjugué dans le plan complexe

4 Racine carrée

Tout nombre complexe z admet deux racines carrée : ω et $-\omega$.

Soient $z = a + ib$ et $\omega = x + iy$, dont le carré vaut z , alors la forme générale des racines carrées de nombres complexes s'obtient en posant :

$$\begin{cases} \omega^2 = z \\ |\omega|^2 = |z| \end{cases} \quad (34)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x + iy)^2 = a + ib \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \quad (35)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2ixy - y^2 = a + ib \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \quad (36)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \quad (37)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 = \sqrt{a^2 + b^2} + a \\ 2y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} - a \\ 2xy = b \end{cases} \quad (38)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} + a} \\ y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} - a} \\ 2xy = b \end{cases} \quad (39)$$

On en déduit deux cas.

1. Si $b \geq 0$, alors x et y sont de mêmes signes ou nuls, donc :

$$\omega = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} + a} + i \sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} - a} \right) \quad (40)$$

2. Si $b \leq 0$, alors x et y sont de signes contraires, donc :

$$\omega = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} + a} - i \sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} - a} \right) \quad (41)$$

5 Polynôme du second degré dans $\mathbb{C}$

5.1 Définition

Soit le polynôme de second degré à coefficients réels, $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}$, et variables complexes $P(z)$ tel que :

$$P(z) = az^2 + bz + c \quad (42)$$

alors si z_0 est une racine de $P(z)$, alors $\bar{z}_0$ est une racine de $P(z)$.

$$P(z) = a(z - z_0)(z - \bar{z}_0) \quad (43)$$

5.2 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

Soit le polynôme du second degré $P(z) = az^2 + bz + c$, alors :

- si $\Delta \geq 0$, alors il existe une ou deux racines réelles ;
- si $\Delta \leq 0$, alors il existe deux racines complexes :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{\Delta}}{2a} = \bar{z}_2 \quad (44)$$

$$z_2 = \frac{-b + i\sqrt{\Delta}}{2a} = \bar{z}_1 \quad (45)$$

- avec $\Delta = -(-\Delta) = i^2 (\sqrt{-\Delta})^2$.

On remarque que :

- $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$;
- $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

6 Polynôme de degré quelconque dans $\mathbb{C}$

Théorème de d'Alembert-Gauss. Soit $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_2 z^2 + a_1 z^1 + a_0 z^0$, un polynôme de degré n avec $a_i \in \mathbb{C}$, alors $P(z) = 0$ possède n solutions $z_1, z_2, \dots, z_n$ dans $\mathbb{C}$ telles que :

$$P(z) = a_n (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n) \quad (46)$$

7 Module d'un nombre complexe

Soit $z = a + ib$, on appelle **module** de z le réel positif : $\sqrt{a^2 + b^2}$, noté $|z|$.

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (47)$$

On utilise souvent le carré du module z :

$$|z|^2 = a^2 + b^2 = z\bar{z} \quad (48)$$

Si $b = 0$, alors $z \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{a^2} = |a| \quad (49)$$

c'est-à-dire le module de z est égale à la valeur absolue de a .

Attention !

Jean
Le
Rond
d'Alem-
bert
(1717-
1783)
Carl
Frie-
dric
Gauss
(1777-
1855)

— Si $a \in \mathbb{R}$, alors $|a|^2 = a^2$.

— Si $z \in \mathbb{C}$, alors $|z|^2 \neq z^2$.

$$|z|^2 = z\bar{z} = (a - ib)(a + ib) = a^2 + b^2 \quad (50)$$

mais :

$$|z|^2 = (a - ib)(a + ib) \quad (51)$$

7.1 Propriétés

$$|zz'| = |z||z'|$$

$$|zz'|^2 = |z|^2 |z'|^2 = z\bar{z}$$

$$\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$$

$$\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$$

$$z \in \mathbb{R}, |z| = |a|$$

$$|i| = 1$$

$$|ib| = |b| \text{ (en valeur absolue)}$$

$$|\bar{z}| = |z|$$

$$|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

$$|z + z'| \leq |z| + |z'| \text{ (inégalité triangulaire)}$$

7.2 Interprétation géométrique

Le module de z est la distance entre l'origine et le point $M(z)$ d'affixe $a + ib$.

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = OM \quad (52)$$

1. $|z| = 1 \Leftrightarrow OM = 1 \Leftrightarrow M \in \mathcal{C}_{O,1}$ avec $\mathcal{C}_{O,1}$ le cercle de centre O et de rayon 1.

Pour écrire un vecteur $\vec{u}(z)$ dans le plan complexe. Il existe deux possibilités :

$$1. |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = |\vec{u}|$$

$$2. AB = ||AB|| = ||z_B - z_A||$$

Soient $\vec{OM}(z)$ et $\vec{MP}(z')$, alors :

$$z + z' \rightarrow \vec{OM} + \vec{MP} = \vec{OP} \quad (53)$$

$$|z + z'| = OP \quad (54)$$




FIGURE 3 – Forme trigonométrique d’un nombre complexe et cercle trigonométrique

8 Forme trigonométrique d’un nombre complexe

Soient $\mathcal{P}$ le plan complexe muni d’un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, $z \in \mathbb{C}^*$ et le point M d’affixe z , on peut représenter ce plan par la figure 3.

$\forall z \in \mathbb{C}^*$, z peut s’écrire sous la forme :

$$z = |z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta)) \quad (55)$$

donc $|z| = OM$ et l’angle orienté $\theta = (\vec{e}_1, \vec{OM})$.

L’argument principal de θ est compris dans l’intervalle $]-\pi, \pi]$.

8.1 Cas particuliers

Dans le plan complexe, 0 n'a pas d'angle.

- $z = 1$
- $|z| = 1$
- $\arg z = 0$

Dans le plan complexe, i forme un angle de 90° .

- $z = i$
- $|z| = 1$
- $\arg z = \frac{\pi}{2}$

Dans le plan complexe, -1 forme un angle de 270° .

- $z = -1$
- $|z| = 1$
- $\arg z = \pi$

Dans le plan complexe, $-i$ forme un angle de 360° .

- $z = -i$
- $|z| = 1$
- $\arg z = -\frac{\pi}{2}$

8.2 Cas général

On appelle l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe la valeur :

$$z = a + ib = |z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta)) \quad (56)$$

avec :

$$\begin{cases} a = |z| \cos(\theta) \\ b = |z| \sin(\theta) \end{cases} \quad (57)$$

Tout comme l'écriture algébrique, l'écriture trigonométrique est **unique**.

On remarque que :

- $z \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow \arg(z) = k\pi$;
- $z \in i\mathbb{R}^+ \Leftrightarrow \arg(z) = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

8.3 Propriétés

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} |z| = |z'| \\ \arg(z) = \arg(z') + 2k\pi \end{cases}$$

$$\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$$

$$\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z')$$

$$\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z)$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z')$$

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \arg(z^n) = n \arg(z)$$

La formule d'A. de Moivre :

$$z^n = |z|^n (\cos^n(\theta) + i \sin^n(\theta)) \quad (58)$$

Abraham
de
Moivre
(1667-
1754)

8.4 Écriture exponentielle d'un nombre complexe

La formule d'A. de Moivre permet de proposer une **écriture exponentielle** d'un nombre complexe. Soient $z \in \mathbb{C}$ $|z| = \tau$ et $\arg(\theta)$, alors il peut être noté :

$$z = \tau e^{i\theta} \quad (59)$$

8.4.1 Cas particuliers

$$z = 1 = e^{i0}$$

$$z = -1 = e^{i\pi}$$

$$z = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$z = -i = e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

8.4.2 Cas général

$$zz' = |zz'| e^{i(\theta+\theta')}$$

$$\frac{1}{z} = \left|\frac{1}{z}\right| e^{-i\theta}$$

$$\frac{z}{z'} = \left|\frac{z}{z'}\right| e^{i(\theta-\theta')}$$

$$z^n = |z|^n e^{ni\theta}$$

$$\bar{e}^{i\theta} = e^{-i\theta}$$

8.5 Interprétation géométrique

L'interprétation géométrique de la forme trigonométrique est donnée par la figure 4.

Soit $\vec{v}(z) : \vec{v} = \vec{OM} : M(z)$, alors $\arg(z) = (\vec{e}_1, \vec{OM}) = (\vec{e}_1, \vec{v})$ et $|z| = ||\vec{v}||$.




FIGURE 4 – Forme trigonométrique d'un nombre complexe

Soit $z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$, alors $\arg(z_B - z_A) = (\vec{e}_1, \vec{AB})$.

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) = \arg\left(\frac{z_{\vec{AC}}}{z_{\vec{AB}}}\right) = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) \text{ avec } \left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = \left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = \frac{AC}{AB}$$

8.6 Linéarisation

On sait que :

- $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$;
- $e^{-i\theta} = \cos(\theta) - i \sin(\theta)$.

On en déduit les formules de linéarisation :

- $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$
- $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

8.7 Racine n -ème de l'unité

Soient $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$, alors une **racine n -ème de l'unité** est un nombre $\omega \in \mathbb{C}$ tel que :

$$\omega^n = z \quad (60)$$

Les racines n -ème de l'unité $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}$, du nombre $z = \rho e^{i\theta}$ sont les n complexes tels que :

$$\omega_k = \rho^{\frac{1}{n}} e^{\frac{i\theta + 2ik\pi}{n}} \quad (61)$$

avec $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ et $k \in \mathbb{Z}$.

Ainsi $\omega_n = \omega_0$ est la solution module 2π .

9 Géométrie dans le plan complexe

9.1 Définition d'une droite

Soit D une droite du plan d'équation réelle $ax + by = c$ avec a, b et c des nombres réels, alors la droite a pour équation complexe :

$$\bar{\omega}z + \omega\bar{z} = k \quad (62)$$

avec $\omega = a + ib \in \mathbb{C}$, $k = 2c \in \mathbb{R}$ et $z = x + iy$.

9.2 Définition d'un cercle

Soit $\mathcal{C}(\Omega, r)$, le cercle de centre Ω et de rayon r , on note $\omega \in \mathbb{C}$ l'affixe du point Ω , alors M d'affixe z est sur le cercle $\mathcal{C}(\Omega, r)$ si et seulement si :

$$z\bar{z} - \bar{\omega}z - \omega\bar{z} = r^2 - |\omega|^2 \quad (63)$$

avec $\omega \in \mathbb{C}$ et $r \in \mathbb{R}$.

9.3 Ensemble de points

Étant donnés deux points A et B du plan et un réel $k \in \mathbb{R}_+$, soit l'ensemble des points M tels que $\frac{MA}{MB} = k$, alors :

$$\frac{MA}{MB} = k \Leftrightarrow (1 - k^2) z\bar{z} - z(\bar{a} - k^2\bar{b}) - \bar{z}(a - k^2b) + |a|^2 - |k|^2|b|^2 = 0 \quad (64)$$

— Si $k = 1$, on pose $\omega = a - b$, alors $z\bar{\omega} + \bar{z}\omega = |a|^2 - |b|^2$ est l'équation de droite de la médiatrice du segment $[AB]$.

— Si $k \neq 1$, on pose $\omega = \frac{a-k^2b}{1-k^2}$, alors $z\bar{z} - z\bar{\omega} - \bar{z}\omega = \frac{-|a|^2+k|b|^2}{1-k^2}$ est l'équation d'un cercle de centre ω et de rayon r , telle que $r^2 - |\omega|^2 = \frac{-|a|^2+k|b|^2}{1-k^2}$

On obtient la formule générale :

$$\frac{|z-a|}{|z-b|} = k \quad (65)$$

10 Transformations dans le plan et les nombres complexes

10.1 Les translations

Soient $f : M(z) \rightarrow M'(z')$ et $\vec{v}(b)$ avec $b \in \mathbb{C}$, alors f est une translation si et seulement si $z' = z + b$, c'est-à-dire $M\vec{M}' = \vec{v}$.

10.2 Les homothéties

Dans le plan complexe muni d'un repère, H est une homothétie si et seulement si $z' - z_A = k(z - z_A)$ avec $k \in \mathbb{R}$ et A le centre de l'homothétie $M(z) \xrightarrow{H_{A,k}} M'(z')$.

10.2.1 Composées d'homothéties de même centre

La composée d'homothéties de même centre est l'application $M(z) \xrightarrow{H_{A,k}} M'(z') \xrightarrow{H_{A,k'}} M''(z'')$ avec $k \neq 0$ et $k' \neq 0$. On en déduit que :

$$z'' - z_A = kk'(z - z_A) \quad (66)$$

On note que, si $k = k'$, alors :

$$z'' - z_A = k^2(z - z_A) \quad (67)$$

10.2.2 Composées d'homothéties de centres différents et de rapports inverses

L'écriture complexe est :

$$z'' - z = \frac{k-1}{k}(z_B - z_A) \quad (68)$$

avec $\frac{k-1}{k} \in \mathbb{R}$ et A et B les centres des deux homothéties.

10.2.3 Composées d'homothétie de centres différents

Soit $M(z) \xrightarrow{H_{A,k}} M_1(z_1) \xrightarrow{H'_{B,k'}} M'(z')$, alors on a :

$$z_1 - z_A = k(z - z_A) \quad (69)$$

et

$$z' - z_B = k'(z_1 - z_B) \quad (70)$$

En combinant les deux équations, on obtient :

$$z' = kk'z + k'(1 - k')z_B \quad (71)$$

On distingue deux cas :

- si $kk' = 1$, c'est-à-dire le cas précédent pour lequel $k = \frac{1}{k'}$, alors $z' - z = (1 - \frac{1}{k})(z_B - z_A)$ avec $(1 - \frac{1}{k}) \in \mathbb{R}$;
- si $kk' \neq 1$, alors :

1. on recherche d'éventuels points invariants tel que $(H' \circ H)(M) = M$

$$\Leftrightarrow z' = z \quad (72)$$

$$\Leftrightarrow kk'z + k'(1 - k)z_A + (1 - k')z_B = z \quad (73)$$

$$\Leftrightarrow (1 - kk')z = k'(1 - k)z_A + (1 - k')z_B \quad (74)$$

or $1 - kk' \neq 0$, donc :

$$\Leftrightarrow z = \frac{k'(1 - k)z_A + (1 - k')z_B}{1 - kk'} \quad (75)$$

2. la composée $H' \circ H$ est l'homothétie de centre I d'affixe $z_I = \frac{k'(1-k)z_A + (1-k')z_B}{1-kk'}$, et de rapport kk' . En effet, si on pose $z_0 = k'(1 - k)z_A + (1 - k')z_B$, alors :

$$z' = kk'z + z_0 \quad (76)$$

$$\Leftrightarrow z_I = kk'z_I + z_0 \quad (77)$$

$$\Leftrightarrow z' - z_I = kk'z - kk'z_I + z_0 - z_0 \quad (78)$$

$$\Leftrightarrow z' - z_I = kk'(z - z_I) \quad (79)$$

10.3 Les réflexions et les rotations

10.3.1 Réflexion

Dans le plan complexe, soient un repère orthonormé et une droite (Δ) d'équation $y = ax + b$, alors A est le point de coordonnées $(-\frac{b}{a}, 0)$. De plus, on sait que : $\tan(\alpha) = a [\pi]$.

Soient deux axes de réflexion (Δ) et $[Ox]$, alors la rotation r de centre A et de d'angle 2α s'écrit :

$$R_{(\Delta)} \circ R_{[Ox]} = r_{A, 2\alpha} \quad (80)$$

On déduit que :

$$(R_{(\Delta)} \circ R_{[Ox]}) \circ R_{[Ox]} = r_{A, 2\alpha} \circ R_{[Ox]} \quad (81)$$

$$R_{(\Delta)} = r_{A, 2\alpha} \circ R_{[Ox]} \quad (82)$$

Cela permet de proposer une écriture complexe d'une réflexion en prenant la composée obtenue :

$$M(z) \xrightarrow{R_{[Ox]}} M_1(z_1) \xrightarrow{r_{A, 2\alpha}} M'(z) \quad (83)$$

avec $Z_1 = \bar{z}$.

$$z' - z_A = e^{2i\alpha} (z_1 - z_A) = e^{2i\alpha} (\bar{z} - z_A) \quad (84)$$

$$z' = \bar{z}e^{2i\alpha} + z_A (1 + e^{2i\alpha}) \quad (85)$$

or $e^{2i\alpha} = \cos(2\alpha) + i \sin(2\alpha)$ et

$$\cos(2\alpha) = \frac{1 - \tan^2(\alpha)}{1 + \tan^2(\alpha)} = \frac{1 - a^2}{1 + a^2} \quad (86)$$

et

$$\sin(2\alpha) = \frac{2 \tan(\alpha)}{1 + \tan^2(\alpha)} = \frac{2a}{1 + a^2} \quad (87)$$

Au final, on obtient l'écriture complexe d'une réflexion :

$$z' = \left[\frac{(1 - a^2) + 2ia}{1 + a^2} \right] \bar{z} - \frac{b}{a} \left[1 - \frac{(1 - a^2) + 2ia}{1 + a^2} \right] \quad (88)$$

10.3.2 Rotation

Rotation de centre O Soit $f : M(z) \rightarrow M'(z')$, alors f est une rotation de centre O , O étant l'origine du repère du plan complexe, et d'angle θ si et seulement si $z' = ze^{i\theta}$, c'est-à-dire $OM = OM'$.

Rotation de centre quelconque Soit $f : M(z) \rightarrow M'(z')$, alors f est une rotation de centre $O(z_O)$, et d'angle θ si et seulement si $z' - z_O = e^{i\theta}(z - z_O)$, c'est-à-dire $OM = OM'$.

10.4 Les isométries

10.4.1 Écriture complexe des déplacements

Soit la transformation : $M(z) \rightarrow M'(z')$, alors :

— l'identité s'écrit :

$$z' = z \quad (89)$$

avec $|a| = 1$.

— la rotation de centre A et d'angle α s'écrit :

$$r_{A,\alpha} : z' - z_A = e^{i\alpha}(z - z_A) \quad (90)$$

avec $|a| = 1$.

N.B. $\arg(0)$ n'existe pas, car le vecteur nul n'a pas de sens propre, donc il est impossible de définir un angle.

— la translation de vecteur $\vec{u}$ s'écrit :

$$z' = z + z_{\vec{u}} \quad (91)$$

avec $|a| = 1$.

Théorème. Tout déplacement a comme écriture complexe $f : z \rightarrow z' = az + b$ avec $|a| = 1$, $a \in \mathbb{C}$ et $b \in \mathbb{C}$.

La réciproque de ce théorème est-elle vraie ? Pour le démontrer, on pose $\begin{cases} \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P} \\ M(z) \mapsto M(az + b) \end{cases}$ avec $|a| = 1$. On sait que :

$$\begin{aligned} A(z_A) &\rightarrow A'(z_{A'}) \quad z_{A'} = az_A + b \\ A(z_B) &\rightarrow B'(z_{B'}) \quad z_{B'} = az_B + b \end{aligned} \quad (92)$$

On en déduit que :

$$z_{A'}\vec{B'} = z_{B'} - z_{A'} = az_B + b - (az_A + b) = a(z_B - z_A) = z_{A'}\vec{B} \quad (93)$$

or $|z_{A'}\vec{B'}| = |az_{AB}| = |a||z_{AB}|$ avec $|a| = 1$, donc $A'B' = AB$, donc f est une isométrie. De fait, si $|a| \neq 1$, alors f n'est pas une isométrie. Pour conclure, il est nécessaire de savoir s'il y a conservation des angles.

$$\begin{aligned} A(z_A) &\rightarrow A'(z_{A'}) \\ B(z_B) &\rightarrow B'(z_{B'}) \\ C(z_C) &\rightarrow C'(z_{C'}) \\ D(z_D) &\rightarrow D'(z_{D'}) \end{aligned} \quad (94)$$

On en déduit que :

$$\begin{cases} \left(\vec{A'B'}, \vec{C'D'} \right) = \arg \left(\frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_{D'} - z_{C'}} \right) \\ \left(\vec{AB}, \vec{CD} \right) = \arg \left(\frac{z_B - z_A}{z_D - z_C} \right) \end{cases} \quad (95)$$

On en déduit que :

$$\left. \begin{aligned} z_{C'D'} &= az_{CD} \\ z_{A'B'} &= az_{AB} \end{aligned} \right\} \frac{z_{C'D'}}{z_{A'B'}} = \frac{az_{CD}}{az_{AB}} = \frac{z_{CD}}{z_{AB}} \quad (96)$$

donc :

$$\left(\vec{A'B'}, \vec{C'D'} \right) = \left(\vec{AB}, \vec{CD} \right) \quad (97)$$

Théorème réciproque. Tout transformation $f : M(z) \rightarrow M'(z')$ $z' = az + b$ avec $|a| = 1$ est un déplacement. Il existe trois cas.

- Si $|a| = 1$, alors la transformation est une translation.
- Si $|a| = -1$, alors la transformation est une symétrie centrale.
- Si $|a| \neq 1$, alors la transformation est une rotation.
 - Méthode pour déterminer le centre de cette rotation : poser et résoudre $z = z'$.
 - Méthode pour déterminer l'angle de cette rotation : calculer l'argument de a .

10.4.2 Écriture complexe des antidéplacements

Théorème. Tout antidéplacement a comme écriture complexe la fonction $f : z \rightarrow z' = a\bar{z} + b$ avec $|a| = 1$, $a \in \mathbb{C}$ et $b \in \mathbb{C}$. Soient A un antidéplacement tel que :

$$A \left\{ \begin{aligned} M &\rightarrow M' \\ P &\rightarrow P' \end{aligned} \right. \quad (98)$$

R la réflexion telle que :

$$R \left\{ \begin{aligned} M &\rightarrow M' \\ z &\rightarrow z' = \bar{z} \end{aligned} \right. \quad (99)$$

et $D = A \circ R$ un antidéplacement, R étant un antidéplacement, on en déduit que D est un déplacement, donc D peut s'écrire sous la forme $z' = az + b$. De plus, $D \circ R = A \circ S \circ S = A$, donc $M(z) \xrightarrow{R} M_1(z_1) \xrightarrow{D} M'(z')$. Pour finir :

$$\bar{z} = z_1 \quad (100)$$

et

$$z' = az_1 + b \quad (101)$$

avec $|a| = 1$, d'où :

$$z' = a\bar{z} + b \quad (102)$$

Le théorème réciproque est-il vrai ? Soit F un antidéplacement tel que $M(z) \rightarrow M'(z')$ $z' = a\bar{z} + b$ avec $|a| = 1$ et $(a, b) \in \mathbb{C}^2$. $R \circ F$ est-il un déplacement ? On a $M(z) \xrightarrow{F} M_1(z_1) \xrightarrow{R} M'(z')$.

$$z_1 = a\bar{z} + b \quad (103)$$

avec $|a| = 1$. On en déduit que :

$$z' = \bar{z}_1 \quad (104)$$

donc :

$$z' = a^{-1}\bar{z} + b = \bar{a}z + \bar{b} \quad (105)$$

avec $|\bar{a}| = |a| = 1$, donc $D = R \circ F$ est un déplacement. De plus

$$R \circ D = R \circ R \circ F = R \circ F \quad (106)$$

On en déduit que :

1. F est une réflexion s'il existe une infinité de points invariants ;
2. F est $T \circ R$, T étant une translation et R une réflexion, s'il n'existe aucun point invariant.

On détermine le cas en résolvant $z = z' = a\bar{z} + b$, ce qui se résout par une double identification, d'une part, de la partie réelle, et d'autre part, de la partie imaginaire.

10.5 Les similitudes

10.5.1 Écriture complexe d'une similitude

Théorème 1. $f : M(z) \rightarrow M'(z')$ est une **similitude directe** si et seulement si :

$$\exists (a, b) \in \mathbb{C}^2 \quad z' = az + b \quad (107)$$

avec $|a| = k$ et $|a| \neq 0$

Théorème 2. $f : M(z) \rightarrow M'(z')$ est une **similitude indirecte** si et seulement si :

$$\exists (a, b) \in \mathbb{C}^2 \quad z' = a\bar{z} + b \quad (108)$$

avec $|a| = k$ et $|a| \neq 0$

Démonstration 1

Démonstration de la première implication. Soit une similitude s , on sait que s peut se décomposer en une homothétie de centre A et de rapport k , et une rotation de centre A et d'angle θ , soit $s = h_{\Omega, k} \circ r_{A, \theta}$ ou $M(z) \xrightarrow{r} M_1(z_1) \xrightarrow{h} M'(z')$.

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} z_1 &= e^{i\theta} (z - z_A) + z_A \\ z' &= k(z_1 - z_\Omega) + z_\Omega \end{aligned} \right\} \\ \Rightarrow z' &= k(e^{i\theta} (z_A - z_\Omega) + z_\Omega) z' = \underbrace{ke^{i\theta}}_a z - \underbrace{ke^{i\theta} z_A - kz_\Omega + z_\Omega}_{+b} \end{aligned} \quad (109)$$

donc : $z' = az + b$. Ainsi, une similitude directe s'écrit $z' = az + b$ sous sa forme complexe avec $(a, b) \in \mathbb{C}^2$.

Démonstration de la seconde implication. Soit $M(z) \xrightarrow{F} M'(z')$ $z' = az + b$

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{aligned} F(M) &= M' : z_{M'} = az_M + b \\ F(N) &= M' : z_{N'} = az_N + b \end{aligned} \right. \\ \Leftrightarrow z_{M'} - z_{N'} &= a(z_M - z_N) \\ \Leftrightarrow |z_{M'} - z_{N'}| &= |a(z_M - z_N)| = |a| |z_M - z_N| \\ \Leftrightarrow M'N' &= |a| MN \\ \Leftrightarrow \arg(z_{M'} - z_{N'}) &= \arg(a) + \arg(z_M - z_N) \Rightarrow \arg\left(\frac{z_{M'} - z_{N'}}{z_M - z_N}\right) = \arg(a) \\ \left(\frac{z_{M'} - z_{N'}}{z_M - z_N}\right) \arg(a) &= \left(N\vec{M}, N'\vec{M}'\right) = \arg(a) \end{aligned} \quad (110)$$

On en déduit que :

$$\left\{ \begin{aligned} M'N' &= |a| MN \\ \left(N\vec{M}, N'\vec{M}'\right) &= \arg(a) \end{aligned} \right. \quad (111)$$

F est une similitude de rapport $|a|$ (pour le module de a).

Démonstration de la convergence des angles. Soient trois points A, B, C et leurs images par une similitude A', B', C' , $\theta = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B}\right)$, et $\theta' = \arg\left(\frac{z_{C'} - z_{A'}}{z_{C'} - z_{B'}}\right)$, alors :

$$\left. \begin{aligned} z_{C'} - z_{A'} &= a(z_C - z_A) \\ z_{B'} - z_{A'} &= a(z_B - z_A) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{z_{C'} - z_{A'}}{z_{B'} - z_{A'}} = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \quad (112)$$

donc $\theta = \theta'$.

En conclusion, la similitude directe s'écrit sous la forme complexe :

$$z' = az + b \quad (113)$$

Démonstration 2 La démonstration avec une similitude indirecte est exactement la même, mais on trouverait comme résultat :

$$z' = a\bar{z} + b \quad (114)$$

avec $\begin{cases} |a| \neq 0 \\ |a| \text{ est le rapport de la similitude.} \end{cases}$, $a \in \mathbb{C}^*$, et $b \in \mathbb{C}$.

10.5.2 Forme réduite d'une similitude directe

Théorème. Soit s une similitude directe, différente d'une translation, alors s est la composée d'une homothétie et d'une rotation de centre Ω , appelé le **centre de la similitude**. L'homothétie définit le **rapport de similitude directe** k . La rotation de centre Ω définit un angle θ constant appelé **angle de la similitude directe**.

Démonstration Soit s une similitude s'écrivant sous la forme $z' = az + b$ avec $|a| \neq 0$, $|a| \neq 1$, $|a| = k$, $k > 0$, et $b \in \mathbb{C}$.

Démonstration de la première implication. On cherche le point invariant :

$$z = az + b \Leftrightarrow z(1 - a) = b \Leftrightarrow z = \frac{b}{1 - a} = z_\Omega \quad (115)$$

On en déduit que :

$$\begin{cases} z' = az + b \\ z_\Omega = az_\Omega + b \end{cases} \Rightarrow z' - z_\Omega = a(z - z_\Omega) \quad (116)$$

d'où :

$$\begin{cases} |z' - z_\Omega| = |a| |z - z_\Omega| \Leftrightarrow M'\Omega = |a| M\Omega \\ \arg\left(\frac{z' - z_\Omega}{z - z_\Omega}\right) = \arg(a) = \left(\vec{M'\Omega}, \vec{M\Omega}\right) \end{cases} \quad (117)$$

Démonstration de la seconde implication. Soient la rotation $R_{\Omega, \theta}$ et l'homothétie $H_{\Omega, k}$, alors $M(z) \xrightarrow{R} M_1(z_1) \xrightarrow{H} M'(z')$.

$$\begin{aligned} z_1 - z_\Omega &= e^{i\theta} (z - z_\Omega) \Rightarrow z' - z_\Omega = ke^{i\theta} (z - z_\Omega) \text{ avec } |a| = k \\ z' - z_\Omega &= k(z_1 - z_\Omega) \\ z' &= az - az_\Omega + z_\Omega \\ z' &= az + z_\Omega(1 - a) = az + \left(\frac{b}{1-a}\right)(1 - a) = az + b \end{aligned} \quad (118)$$

Méthode de détermination du rapport et de l'angle de la similitude Pour déterminer le rapport de la similitude, on peut utiliser :

- soit la méthode avec les nombres complexes : $|a| = k$;
- soit la méthode géométrique : $k = \frac{A'B'}{AB}$.

Pour déterminer l'angle de la similitude, on peut utiliser :

- soit la méthode avec les nombres complexes : $\theta = \arg(a)$;
- soit la méthode géométrique : $\theta = (\vec{A'B'}, \vec{AB})$.

10.6 Représentation sphérique des nombres complexes. Projection stéréographique

Soit $\mathcal{P}$ le plan complexe, et une sphère $\mathcal{S}$ de rayon 1 tangente à $\mathcal{P}$ en $z = 0$, le diamètre NS est perpendiculaire à $\mathcal{P}$. On désigne par les points N et S respectivement le pôle nord et le pôle sud.

À chaque point A de $\mathcal{P}$, on peut associer la droite NA qui coupe $\mathcal{S}$ en A' . Ainsi, à chaque point du plan complexe $\mathcal{P}$, correspond un point et un seul de la sphère $\mathcal{S}$. On peut représenter tout nombre complexe par un point de la sphère.

Le point N correspond au « **point à l'infini** » du plan. L'ensemble de tous les points à l'infini est appelé le **plan complexe entier** (ou le plan complexe complété).

La sphère $\mathcal{S}$ est appelée **sphère de B. Riemann**.

Bernhard
Rie-
mann
(1826-
1866)

10.7 Produit scalaire et produit vectoriel

Soient deux nombres complexes $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$.

10.7.1 Produit scalaire (ou produit intérieur) de z_1 et z_2

Le produit scalaire est défini par :

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| |z_2| \cos(\theta) = x_1 x_2 + y_1 y_2 = \Re\{\bar{z}_1, z_2\} = \frac{1}{2}(\bar{z}_1 z_2 + z_1 \bar{z}_2) \quad (119)$$

avec θ l'angle compris entre 0 et π que font z_1 et z_2 .

10.7.2 Produit vectoriel (ou produit extérieur) de z_1 et z_2

Le produit vectoriel est défini par :

$$z_1 \wedge z_2 = |z_1| |z_2| \sin(\theta) = x_1 y_2 - y_1 x_2 = \Im\{\bar{z}_1, z_2\} = \frac{1}{2i}(\bar{z}_1 z_2 - z_1 \bar{z}_2) \quad (120)$$

avec $\bar{z}_1 z_2 = (z_1 \cdot z_2) + i(z_1 \wedge z_2) = |z_1| |z_2| e^{i\theta}$.

10.7.3 Propriétés

Si $z_1 \neq 0$ et $z_2 \neq 0$, alors :

1. une condition nécessaire et suffisante pour que z_1 et z_2 soient orthogonaux, est que $z_1 \cdot z_2 = 0$;
2. une condition nécessaire et suffisante pour que z_1 et z_2 soient parallèles, est que $z_1 \wedge z_2 = 0$;
3. la longueur de la projection de z_1 sur z_2 est $\frac{|z_1 \cdot z_2|}{|z_2|}$;
4. l'aire du parallélogramme ayant z_1 et z_2 pour côtés est $|z_1 \wedge z_2|$.

10.8 Coordonnées complexes conjugués

Un point du plan complexe peut être repéré par ses coordonnées rectangulaires (x, y) , ou polaire (r, θ) . On peut opérer de beaucoup d'autres manières. L'une d'entre elles utilise le fait que :

$$x = \frac{1}{2} (z + \bar{z}) \quad (121)$$

et

$$y = \frac{1}{2i} (z - \bar{z}) \quad (122)$$

avec $z = x + iy$. Les coordonnées $(z, \bar{z})$ qui déterminent un point sont appelées **coordonnées complexes conjuguées** (ou coordonnées conjuguées).

Références

[Odifreddi, 2004] ODIFREDDI, P. (2004). Les mathématiques à l'aube du XXIe siècle. Regards sur la science. Belin, Paris.

Table des figures

1	Représentation d'un nombre complexe dans le plan complexe . . .	8
2	Représentation d'un nombre complexe et de son conjugué dans le plan complexe	9
3	Forme trigonométrique d'un nombre complexe et cercle trigonométrique	13
4	Forme trigonométrique d'un nombre complexe	16

Liste des tableaux

Table des matières

1	Construction de l'ensemble $\mathbb{C}$	1
1.1	Ensemble de nombres	1
1.2	Corps des complexes	2
1.2.1	Hypothèse 1 : $4u + v^2 \geq 0$	3
1.2.2	Hypothèse 2 : $4u + v^2 < 0$	3
1.2.3	Conclusion	4
1.3	Unicité du corps des complexes	4
2	Définitions	5
2.1	Opérations dans $\mathbb{C}$	6
2.2	Interprétation géométrique	7
2.3	Propriétés des vecteurs dans le plan complexe	7
3	Le conjugué d'un nombre complexe	7
3.1	Propriétés	8
3.2	Opérations	8
3.3	Interprétation géométrique	9
4	Racine carrée	10
5	Polynôme du second degré dans $\mathbb{C}$	10
5.1	Définition	10
5.2	Équation du second degré dans $\mathbb{C}$	11
6	Polynôme de degré quelconque dans $\mathbb{C}$	11
7	Module d'un nombre complexe	11
7.1	Propriétés	12
7.2	Interprétation géométrique	12
8	Forme trigonométrique d'un nombre complexe	13
8.1	Cas particuliers	14
8.2	Cas général	14
8.3	Propriétés	15
8.4	Écriture exponentielle d'un nombre complexe	15
8.4.1	Cas particuliers	15
8.4.2	Cas général	15
8.5	Interprétation géométrique	15
8.6	Linéarisation	16
8.7	Racine n -ème de l'unité	17

9	Géométrie dans le plan complexe	17
9.1	Définition d'une droite	17
9.2	Définition d'un cercle	17
9.3	Ensemble de points	17
10	Transformations dans le plan et les nombres complexes	18
10.1	Les translations	18
10.2	Les homothéties	18
10.2.1	Composées d'homothéties de même centre	18
10.2.2	Composées d'homothéties de centres différents et de rap- ports inverses	18
10.2.3	Composées d'homothétie de centres différents	19
10.3	Les réflexions et les rotations	20
10.3.1	Réflexion	20
10.3.2	Rotation	20
10.4	Les isométries	21
10.4.1	Écriture complexe des déplacements	21
10.4.2	Écriture complexe des antidéplacements	22
10.5	Les similitudes	23
10.5.1	Écriture complexe d'une similitude	23
10.5.2	Forme réduite d'une similitude directe	25
10.6	Représentation sphérique des nombres complexes. Projection sté- réographique	26
10.7	Produit scalaire et produit vectoriel	26
10.7.1	Produit scalaire (ou produit intérieur) de z_1 et z_2	26
10.7.2	Produit vectoriel (ou produit extérieur) de z_1 et z_2	26
10.7.3	Propriétés	27
10.8	Coordonnées complexes conjugués	27
	Références	28