

Les applications dans le plan

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

21 août 2026

1 Les transformations du plan

Une **transformation** est une **bijection du plan dans le plan**.

Une transformation est un **groupe** si et seulement si, la loi rond vérifie :

- que la composée de deux transformations est la somme des transformations ;
- les lois d'associativité et de commutativité ;
- l'existence d'un élément neutre ;
- que la composée de la transformation avec sa réciproque donne l'élément neutre ;
- que la composée de la transformation avec l'élément neutre est la transformation elle-même ;
- l'existence d'un élément symétrique

1.1 Symétrie centrale

Une **symétrie centrale** de centre O est une transformation ponctuelle du plan qui, à tout point M , associe le point M' tel que O soit le milieu du segment $[MM']$.

1.2 Réflexion ou symétrie axiale ou symétrie orthogonale

On appelle **réflexion** R d'axe (Δ) la transformation du plan qui, à tout point M , associe le point M' tel que (Δ) soit la médiatrice du segment $[MM']$. On dit également que deux points M et M' sont symétriques par rapport à une droite (Δ) , si et seulement si (Δ) est la médiatrice du segment $[MM']$.

Si $R_{(\Delta)}(M) = M = R_{(\Delta)}(M')$, alors la réflexion est une **involution** $R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta)}(M) = M$.

La réflexion conserve :

- des distances ;
- des angles géométriques, mais pas des angles orientés ;
- des produits scalaires ;
- des barycentres ;
- des aires ;
- de l'alignement ;
- du parallélisme ;
- des milieux.

La réflexion transforme un angle orienté en son opposé.

L'image d'une droite est une droite.

L'image d'un cercle est un cercle de même rayon.

1.3 Translation

Une translation T de vecteur $\vec{u}$ est une transformation qui, à tout point M du plan, associe le point M' tel que $\vec{MM'} = \vec{u}$.

Si $T_{\vec{u}}(A) = A'$ et $T_{\vec{u}}(B) = B'$, alors $\vec{A'B'} = \vec{AB}$.

$\vec{AD} = \vec{BC}$ se traduit par B a pour image C par translation du vecteur $\vec{AD}$.

Les translations conservent :

- les distances ;
- les directions ;
- le parallélisme ;
- les milieux ;
- l'alignement ;
- les angles orientés ;
- les produits scalaires ;
- les barycentres.

Les translations ont trois grandes propriétés :

1. $T_{\vec{0}} = Id_P$;
2. $T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v}} = T_{\vec{v}} \circ T_{\vec{u}} = T_{\vec{u}+\vec{v}}$;
3. $(T_{\vec{u}})^{-1} = T_{-\vec{u}}$.

avec Id_P l'application identique du plan.

1.4 Rotation

On appelle **rotation** r de centre Ω la transformation du plan qui, à tout point M associe le point M' tel que :

$$\begin{cases} \Omega M = \Omega M' \\ (\Omega \bar{M}, \Omega \bar{M}') = \alpha [2\pi] \end{cases} \quad (1)$$

avec $\Omega \neq M$. On note la rotation $M \xrightarrow{r_{\Omega, \alpha}} M'$. M a pour image M' par la rotation de centre Ω d'angle α et de sens positif ou négatif.

Si $\Omega = M$, alors $r_{\Omega, \alpha}(M) = M'$.

On note que la relation réciproque est simplement :

$$M' = r_{\Omega, \alpha}(M) \Leftrightarrow M = r_{\Omega, -\alpha}(M') \quad (2)$$

Les rotations sont des **bijections**.

$$(r_{\Omega, \alpha})^{-1} = r_{\Omega, -\alpha} \quad (3)$$

Propriété fondamentale. Soient $r_{\Omega, \alpha}(A) A'$ et $r_{\Omega, \alpha}(B) B'$, alors :

$$(\bar{AB}, \bar{A'B'}) = \alpha [2\pi] \quad (4)$$

et

$$AB = A'B' \quad (5)$$

La rotation conserve :

- des distances ;
- des angles orientés ;
- du parallélisme ;
- de l'orthogonalité ;
- de l'alignement : $r([AB]) = [A'B']$;
- des barycentres ;
- des produits scalaires.

L'image d'une droite est une droite telle que l'angle entre les deux droites est égal à l'angle de la rotation.

L'image d'un cercle est un cercle de même rayon.

Il existe trois cas particuliers de rotation.

1. $r_{\Omega, \pi} = R_{\Omega} = H_{\Omega, -1}$;
2. $r_{\Omega, 0} = Id_P = T_{\vec{0}} = H_{\Omega, -1}$;
3. Si $r_{\Omega, \alpha}(M) = M'$, alors Ω appartient à la médiatrice $[MM']$.

avec R une réflexion, H une homothétie, T une translation et avec Id_P l'application identique du plan.

1.5 Propriétés communes à ces quatre transformations

Propriété 1. Elles conservent les longueurs.

Propriété 2. Elles conservent les angles.

Propriété 3. Elles conservent l'alignement.

Propriété 4. Elles conservent le parallélisme et la perpendicularité.

Propriété 5. Elles conservent les aires.

1.6 Homothéties

Une homothétie H de centre Ω et de rapport k avec $k \neq 0$ est une transformation ponctuelle qui, à tout point M du plan, associe le point M' tel que $\Omega\vec{M'} = k\Omega\vec{M}$.

- Si $k = 1$, on a une **identité**.
- Si $k = -1$, on a une **symétrie centrale**.
- Si $|k| > 1$, on a un **agrandissement**.
- Si $|k| < 1$, on a une **réduction**.
- Le centre Ω , le point M et son image M' sont alignés.
- Le centre Ω de l'homothétie est un **point invariant**.
- Le signe du rapport est positif si l'image M' et l'antécédent M sont du même côté par rapport au centre Ω .
- Le signe du rapport est négatif si l'antécédent M est l'opposé de l'image M' par rapport au centre Ω .

Si $H(A) = A'$ et $H(B) = B'$, alors $A'\vec{B'} = A\vec{B}$.

Soit H l'homothétie de centre Ω et de rapport k , soient M et N deux points, et M' , N' leurs images, alors :

- $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$ et $\overrightarrow{\Omega N'} = k\overrightarrow{\Omega N}$;
- $\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{M'\Omega} + \overrightarrow{\Omega N'} = k\overrightarrow{\Omega N'} - k\overrightarrow{M\Omega} = k\overrightarrow{MN}$;
- (MN) et $(M'N')$ sont parallèles et $|k| MN$.

Les homothéties conservent :

- les milieux ;
- les directions ;
- le parallélisme ;
- l'alignement ;
- les barycentres ;
- les angles orientés.

Les homothéties multiplient :

- les distances par $|k|$;
- les aires par k^2 ;
- les produits scalaires par k^2 .

L'image d'un cercle de rayon R est un cercle de rayon $|k| R$.

Les homothéties ont quatre grandes propriétés :

1. $H_{\Omega,1} = Id_P$;
2. $H_{\Omega,-1} = r_{\Omega,\pi}$;
3. $H_{\Omega,k} \circ h_{\Omega,k'} = H_{\Omega,k'} \circ h_{\Omega,k} = H_{\Omega,kk'}$;
4. $(H_{\Omega,k})^{-1} = H_{\Omega,\frac{1}{k}}$.

avec Id_P l'application identique du plan et r une rotation.

Si A, B et C sont trois points alignés, alors il existe une homothétie de centre A qui transforme B en C . Si $\vec{AC} = k\vec{AB}$, alors $B \xrightarrow{H_{A,k}} C$.

1.7 Synthèse

2 L'image d'une droite...

Une droite est un ensemble de points.

2.1 ... par une symétrie centrale

La droite (D) par la symétrie centrale autour du point I est une droite parallèle à (D) .

Propriété	Réflexion	Translation	Rotation Symétrie centrale	Homothétie
Conservation des longueurs	oui	oui	oui	non
Conservation des milieux de segment	oui	oui	oui	oui
Conservation du parallélisme	oui	oui	oui	oui
Conservation de l'orthogonalité	oui	oui	oui	oui
Conservation des aires	oui	oui	oui	non
Conservation des angles orientés	non	oui	oui	oui
L'image d'une droite est une droite parallèle	non	oui	non	oui
L'image d'un cercle est un cercle de même rayon	oui	oui	oui	non

TABLE 1 – Synthèse sur les transformations du plan dans le plan

2.2 ... par une réflexion

La réflexion R d'une droite (D) par l'axe (Δ) est une droite.

2.3 ... par une translation

La translation T d'une droite (D) est une droite obtenue par une translation d'un vecteur $\vec{u}$. $T_{\vec{u}}(D)$ est une droite parallèle à (D) .

2.4 ... par une homothétie

La homothétie H de centre Ω et de rapport k d'une droite (D) est une droite parallèle à (D) .

2.5 Propriété de conservation de la symétrie centrale, la réflexion, la translation et la rotation d'une droite

Les quatre transformations précédentes conservent toutes :

- le parallélisme ;
- l'orthogonalité.

2.6 ... par une rotation

La rotation r de centre Ω et de rayon α d'une droite (D) est une droite.

3 La composition entre deux transformations

3.1 La composée de deux symétries centrales de centres distincts

Soient la symétrie centrale S de centre I et la symétrie centrale S' de centre J , alors leur composée est :

$$S_J \circ S'_I = T_{2\vec{IJ}} \quad (6)$$

3.2 La composée de deux translations

La composée de deux translation est la somme des deux vecteurs translatés.

$$T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v}} = T_{\vec{v}} \circ T_{\vec{u}} = T_{\vec{u}+\vec{v}} \quad (7)$$

3.3 La composée de deux réflexions

La composée de deux réflexions de même axe (Δ) est l'identité du plan.

$$R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta)} = Id_P \quad (8)$$

La réciproque d'une réflexion vaut :

$$(R_{(\Delta)})^{-1} = R_{(\Delta)} \quad (9)$$

Si $(\Delta) // (\Delta')$, alors $R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta')} = T_{2\vec{u}}$, mais $R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta')} = T_{-2\vec{u}}$, avec T une translation.

Si $(\Delta) \perp (\Delta')$, alors $R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta')} = r_{\Omega,0}$, avec r une rotation et $\Omega (\Delta) \cap (\Delta')$.

3.3.1 Composée de deux réflexions munies de deux axes parallèles

Soient deux axes (Δ) et (Δ') parallèles, et on effectue les réflexions suivantes :

$$M \xrightarrow{R_{(\Delta)}} M' \xrightarrow{R_{(\Delta')}} M'' \quad (10)$$

alors I est le milieu de $[MM']$, et J est le milieu de $[M'M'']$ (Fig. 1).




FIGURE 1 – Composée de deux réflexions munies de deux axes parallèles

$$M\vec{M}'' = M\vec{M}' + M'\vec{M}'' = 2\vec{M}I + 2\vec{M}'J = 2\left(\vec{M}I + \vec{M}'J\right) = 2\left(\vec{M}I + \vec{M}'M + \vec{M}J\right) = 2\left(\vec{M}'I + I\vec{M}\right) \quad (11)$$

Théorème. Si $(\Delta) // (\Delta')$, alors $R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta')}$ est une translation de vecteur $2\vec{IJ}$.

3.3.2 Composée de deux réflexions munies de deux axes perpendiculaires

Soient deux droites perpendiculaires (D_1) et (D_2) , sécantes au point O , alors :

$$R_{(D_2)} \circ R_{(D_1)} = r_{O,\pi} \quad (12)$$

3.3.3 Composée de deux réflexions munies de deux axes sécants

Soient deux axes (Δ) et (Δ') sécantes au point $\Omega = (\Delta) \cap (\Delta')$, et on effectue les réflexions suivantes :

$$M \xrightarrow{R_{(\Delta)}} M' \xrightarrow{R_{(\Delta')}} M'' \quad (13)$$

alors I est le milieu de $[MM']$, et J est le milieu de $[M'M'']$ (Fig. 2).

Étape 1. Déterminer la nature de la composée de deux réflexions munies de deux axes sécants




FIGURE 2 – Composée de deux réflexions munies de deux axes sécants

- (Δ) est la médiatrice de $[MM']$, donc $\Omega M = \Omega M'$.
- (Δ') est la médiatrice de $[M'M'']$, donc $\Omega M' = \Omega M''$.
- On en déduit que $\Omega M = \Omega M' = \Omega M''$. M , M' et M'' sont sur un cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω et de rayon ΩM .

$$(M, M', M'') \in (\mathcal{C}_{\Omega, \Omega M})^3 \quad (14)$$

Étape 2. Calculer l'angle de la rotation $r_{\Omega, \Omega M}$. Si $M \neq \Omega$, alors :

$$(\Omega \vec{M}, \Omega \vec{I}) = (\Omega \vec{I}, \Omega \vec{M}') [2\pi] \quad (15)$$

et

$$(\Omega \vec{M}, \Omega \vec{J}) = (\Omega \vec{J}, \Omega \vec{M}'') [2\pi] \quad (16)$$

On en déduit que :

$$(\Omega \vec{M}, \Omega \vec{M}'') = (\Omega \vec{M}, \Omega \vec{M}') + (\Omega \vec{M}', \Omega \vec{M}'') = 2 (\Omega \vec{I}, \Omega \vec{M}') + 2 (\Omega \vec{M}', \Omega \vec{J}) = 2 (\Omega \vec{I}, \Omega \vec{J}) \quad (17)$$

Étape 3. Démontrer que l'angle $2 (\Omega \vec{I}, \Omega \vec{J})$ est indépendant de M .

Attention ! $(\Omega \vec{I}, \Omega \vec{J})$ dépend de M (Fig. 3).

- $(\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, -\vec{v})$ et $\beta = \alpha + \pi$
- On constate deux cas :

$$\begin{cases} \beta = \alpha + \pi + 2k\pi = \alpha + 2(k+1)\pi \\ \beta = \alpha + \pi + 2k\pi \end{cases} \quad (18)$$

$$\begin{cases} 2\beta = 2\alpha + 2(k+1)2\pi \\ 2\beta = 2\alpha + 2\pi + 2k\pi \end{cases} \quad (19)$$

donc : $2\beta = 2\alpha + 2k'\pi$, soit $\beta = \alpha + k'\pi$.




FIGURE 3 – L'angle $(\vec{\Omega I}, \vec{\Omega J})$

3.4 La composée de deux homothéties

3.4.1 La composée de deux homothéties de même centre

L'ensemble des homothéties de centre A munies de la loi rond est un **groupe commutatif** vérifiant :

- l'associativité ;
- l'existence d'un élément neutre ;
- que l'élément symétrique de $H_{A,k}$ est $H_{A,\frac{1}{k}}$;
- que la composée de deux homothéties de même centre A est une homothétie de centre A .

Attention ! La composée de deux homothéties de centre différents n'est pas forcément une homothétie. Par exemple, cela peut-être une translation pour les rapports inverses.

3.4.2 La composée de deux homothéties de centres différents et de rapports inverses

La composée de deux homothéties de centres A et B différents et, respectivement, de rapports k et k' tels que $k' = \frac{1}{k}$ est une translation. Cette composée n'est pas commutable, sauf pour $k = 1$

La relation vectorielle est : $\vec{MM'} = \frac{k-1}{k} \vec{AB}$.

3.4.3 La composée de deux homothéties de centres différents et de rapports quelconque

Soit $M(z) \xrightarrow{H_{A,k}} M_1(z_1) \xrightarrow{H'_{B,k'}} M'(z')$, alors on a :

$$M_1 = H(M) : A\vec{M}_1 = kA\vec{M} \quad (20)$$

et

$$M' = H'(M_1) : B\vec{M}' = k'B\vec{M}_1 \quad (21)$$

On distingue deux cas :

- si $kk' = 1$, c'est-à-dire le cas précédent pour lequel $k = \frac{1}{k'}$, alors $M\vec{M}' = (1 - \frac{1}{k})A\vec{B}$ avec $(1 - \frac{1}{k}) \in \mathbb{R}$. En résumé, la composée de deux homothéties de centres différents et de rapport inverse correspond à :

$$H'_{B, \frac{1}{k}} \circ H_{A,k} = T_{(1-\frac{1}{k})A\vec{B}} \quad (22)$$

$$H'_{A,k} \circ H_{B, \frac{1}{k}} = T_{(1-k)A\vec{B}} \quad (23)$$

- si $kk' \neq 1$, alors :

1. on recherche d'éventuels points invariants tel que $(H' \circ H)(M) = M$.
En général, on trouve un point I ;
2. la composée $H' \circ H$ est l'homothétie de centre I et de rapport kk' .

$$I\vec{M}' = kk'I\vec{M} \quad (24)$$

3.4.4 La composée d'une homothétie et d'une translation

Si H est une homothétie de centre A de rapport k avec $k \neq 1$. T est la translation de vecteur $\vec{u}$ tel que $\vec{u} \neq \vec{0}$, alors $T \circ H$ et $H \circ T$ sont des homothéties de rapport k dont les centres se situent sur la droite $(A, \vec{u})$.

Attention ! $T \circ H$ et $H \circ T$ ne sont pas commutables.

3.4.5 La méthode pour déterminer le centre d'homothétie de la composée deux homothéties

Soient f une homothétie de centre A et de rapport $k = 2$, g est une homothétie de centre B et de rapport $k' = -\frac{3}{4}$, calculer $g \circ f$.

1. On sait que $g \circ f$ est une homothétie de centre I , car $kk' = -\frac{3}{2}$.

2. Il suffit de connaître un point M et son image M' . On choisit le point A . A est par conséquent un point invariant, donc $g(A) = (g \circ f)(A) = A'$. De fait, $\vec{BA'} = -\frac{3}{4}\vec{BA}$, or $\vec{IA'} = \frac{3}{2}\vec{IA}$, donc $-\vec{BA'} + \vec{IA'} = \frac{3}{4}(\vec{BA} - 2\vec{IA})$.

$$\Leftrightarrow \vec{IB} = \frac{3}{4}\vec{BA} - \frac{3}{2}\vec{IA} \quad (25)$$

$$\Leftrightarrow \vec{IA} + \vec{AB} = \frac{3}{4}\vec{BA} - \frac{3}{2}\vec{IA} \quad (26)$$

$$\Leftrightarrow \frac{5}{2}\vec{IA} = \frac{7}{4}\vec{AB} \quad (27)$$

$$\Leftrightarrow \vec{AI} = \frac{7}{10}\vec{AB} \quad (28)$$

3.5 La composée entre deux rotations

3.5.1 Deux rotations de même centre

Soient deux rotations r_1 et r_2 de même centre Ω , mais d'angles orientés différents α et β , alors :

$$r_{\Omega,\beta} \circ r_{\Omega,\alpha} = r_{\Omega,\alpha+\beta} \quad (29)$$

Si $\alpha = \beta$, alors :

$$r_{\Omega,\alpha} \circ r_{\Omega,\alpha} = r_{\Omega,2\alpha} \quad (30)$$

3.5.2 Deux rotations de centres différents

Soit (Δ_1) la droite passant par Ω telle que l'angle entre (Δ_1) et $(\Omega\Omega')$ soit égal à $-\frac{1}{2}$ fois l'angle de la rotation α de $r_{\Omega,\alpha}$, donc l'angle entre (Δ_1) et $(\Omega\Omega')$ vaut $-\frac{\alpha'}{2}$.

$$r_{\Omega,\alpha} = R_{(\Omega\Omega')} \circ R_{(\Delta_1)} \quad (31)$$

avec R une réflexion.

Soit (Δ_2) la droite passant par Ω' telle que l'angle entre (Δ_2) et $(\Omega\Omega')$ soit égal à $\frac{\alpha}{2}$.

$$r_{\Omega',\alpha'} = R_{(\Delta_2 \circ R_{(\Omega\Omega')})} \quad (32)$$

On note que :

- $M_2 = r_{\Omega,\alpha}(M)$;
- $M' = r_{\Omega,\alpha'}(M_2)$.




FIGURE 4 – Composée de deux rotations de centres différents

Au final, on trouve la figure 4.

On a :

$$r_{\Omega', \alpha'} \circ r_{\Omega, \alpha} = R_{(\Delta_2)} \circ R_{\Omega\Omega'} \circ R_{\Omega\Omega'} \circ R_{(\Delta_1)} \quad (33)$$

or $R_{\Omega\Omega'} \circ R_{\Omega\Omega'} = Id_P$, donc :

$$r_{\Omega', \alpha'} \circ r_{\Omega, \alpha} = R_{(\Delta_2)} \circ R_{(\Delta_1)} \quad (34)$$

On recherche la valeur de l'angle de la rotation de centre I . On distingue deux cas :

1. $(\Delta_1, \Delta_2) = (\Delta_1, \Omega\Omega') + (\Omega\Omega', \Delta_2) = \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha'}{2} + k\pi$;
2. Si $(\Delta_1) \parallel (\Delta_2)$, alors $(\Delta_1, \Delta_2) = 0 + k\pi \Leftrightarrow \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha'}{2} = k\pi \Leftrightarrow \alpha + \alpha' = 2k\pi$.

En conclusion, on distingue deux cas en fonction de $\alpha + \alpha'$.

1. Si $\alpha + \alpha' = 2k\pi$, alors on a une translation.
2. Si $\alpha + \alpha' \neq 2k\pi$, alors on a une rotation.

La composée de deux rotations d'angles α et α' et de centres Ω et Ω' , notée $r_{\Omega', \alpha'} \circ r_{\Omega, \alpha}$ est :

1. une translation T de vecteur $2\vec{\Omega\Omega'}$ si $\alpha + \alpha' = 2k\pi$;
2. une rotation de centre $I = (\Delta_1) \cap (\Delta_2)$ et d'angle $\alpha + \alpha' \neq 2k\pi$.

Toutefois, en pratique, on ne recherchera jamais la composée avec cette méthode.

3.5.3 Décomposition d'une rotation en deux réflexions

Soient r la rotation de centre A et d'angle α , une droite (Δ) contenant le point A , alors il existe une unique droite (Δ') telle que $r_{A,\alpha} = R_{(\Delta')} \circ R_{(\Delta)}$.

(Δ') est la droite passant par A telle que $(\vec{u}, \vec{u}') = \frac{\alpha}{2}$ avec $\vec{u}$ un vecteur directeur de (Δ) et $\vec{u}'$ un vecteur directeur de (Δ') .

3.6 Composée d'une translation et d'une réflexion

$T_{\vec{u}} \circ R_{(\Delta)}$ n'est simplifiable que si $\vec{u}$ est un vecteur normal à (Δ) , ce qui signifie que la direction de $\vec{u}$ est orthogonale à celle de (Δ) .

Il existe deux cas (Fig. 5).

1. $T_{\vec{u}} = R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta')}$, mais $T_{\vec{u}} \circ R_{(\Delta)} = R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta')} \circ R_{(\Delta)}$;
2. $T_{\vec{u}} = R_{(\Delta')} \circ R_{(\Delta)}$, et $T_{\vec{u}} \circ R_{(\Delta)} = R_{(\Delta')} \circ R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta')} = R_{(\Delta')}$.




FIGURE 5 – Composée d'une translation et d'une réflexion

Si $\vec{u}$ n'est pas un vecteur normal, alors $T_{\vec{u}} \circ R_{(\Delta)} = R_{(\Delta_2)} \circ R_{(\Delta_1)} \circ R_{(\Delta)} = R_{(\Delta_2)} \circ r_{(O_1, 2\alpha)}$. La composée d'une translation et d'une réflexion n'est par conséquent pas simplifiable.

3.7 Composée d'une rotation et d'une réflexion

La composée $T_{\vec{u}} \circ r_{O,\alpha}$ correspond à la figure 6.

Pour obtenir la composée, il faut que $(\Delta_2) // (\Delta_3)$. Deux cas apparaissent (Fig. 7).

1. $T_{\vec{u}} = R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta_1)}$ et $r_{O,\alpha} = R_{(\Delta_2)} \circ R_{(\Delta)}$, mais $T_{\vec{u}} \circ r_{O,\alpha} = R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta_1)} \circ R_{(\Delta_2)} \circ R_{(\Delta)}$.
2. $T_{\vec{u}} = R_{(\Delta_1)} \circ R_{(\Delta)}$ et $r_{O,\alpha} = R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta_2)}$, donc $T_{\vec{u}} \circ r_{O,\alpha} = R_{(\Delta_1)} \circ R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta_2)} = r_{O', \frac{\alpha}{2}}$.




FIGURE 6 – Composée d’une rotation et d’une réflexion




FIGURE 7 – Composée d’une rotation et d’une réflexion

4 Les isométries

Une **isométrie** est une transformation conservant les distances.

4.1 Théorèmes

Théorème 1. La composée de deux transformations est une transformation. Généralement, la composée de deux bijections est une bijection.

$$\forall M'' \in \mathcal{P}, T(M) = M'' \Leftrightarrow (T_2 \circ T_1)(M) = M'' \Leftrightarrow T_2(T_1(M)) = M'' \quad (35)$$

or M'' a un seul et unique antécédent par T_2 et M' a un seul et unique antécédent

par T_1 .

Théorème 2. La composée de deux isométries est une isométrie. La démonstration s'effectue de la même manière que le théorème précédents en tenant compte des distances.

4.2 Classification

Les isométries conservant trois points A, B, C non alignés, c'est-à-dire trois points invariants non alignés fixés, existent-elles ? Pour le vérifier, on opère une démonstration par l'absurde. Si on a une isométrie, on sait que :

$$BM = BM' \text{ et } CM = CM' \quad (36)$$

et

$$M \neq M' \Rightarrow (A, B, C) \in (\text{médiatrice de } [MM'])^3 \quad (37)$$

or les points A, B, C ne sont pas alignés, donc c'est impossible.

Théorème. Une isométrie conservant trois points non alignés est l'identité.

Les isométries, différentes de l'identité, conservant deux points A et B non alignés existent-elles ? Pour le démontrer, on distingue deux cas. Soit $M' = I(M)$, I étant une isométrie, alors :

1. si $M \neq M'$, alors :

$$\left. \begin{array}{l} AM = AM' \\ BM = BM' \end{array} \right\} \Rightarrow () \text{ est la médiatrice de } [MM'] \Rightarrow M' = R_{(AB)}(M) \quad (38)$$

2. si $M \neq M'$, alors on opère une démonstration par l'absurde. Si $M \notin (AB)$, alors I serait l'identité, car M, A, B seraient trois points invariants non alignés, or I n'est pas l'identité, donc par contraposée $M \in (AB)$.

$$M' = R_{(AB)}(M) = M \quad (39)$$

Théorème. La seule isométrie différente de l'identité conservant deux points est la symétrie d'axe joignant ces deux points.

Les isométries conservant un et seul point existent-elle ? Soient $A' = I(A)$, I étant une isométrie, et (Δ) la médiatrice de $[AA']$, car $A \neq A'$, alors on peut définir I' , la composée de deux isométries, comme : $I' = R_{(\Delta)} \circ I$. Par définition, I' est également une isométrie.

$$I'(A) = R_{(\Delta)}(I(A)) = R_{(\Delta)}(A') = A \quad (40)$$

et

$$I'(O) = R_{(\Delta)}(I(O)) = R_{(\Delta)}(O) \quad (41)$$

On en déduit que :

$$\left. \begin{array}{l} I(O) = O \\ I(A) = A' \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Les distances sont conservées.} \quad (42)$$

$$OA' = OA \text{ et } O \in (\Delta) \Rightarrow R_{(\Delta)}(O) = O \quad (43)$$

Deux cas sont possibles pour I' , il s'agit soit d'une identité, soit d'une symétrie d'axe (OA) .

- Si $I' = R_{(\Delta)} \circ I = Id$, alors $R_{(\Delta)} \circ I = R_{(\Delta)} \circ Id = R_{(\Delta)}$. On a $R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta)} \circ I = R_{(\Delta)}$, donc $I = R_{(\Delta)}$, ce qui est impossible, car il n'existe qu'un point invariant.
- Si $I' = R_{(OA)}$, alors $I' = R_{(\Delta)} \circ I = R_{(OA)}$. On a $R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta)} \circ I = R_{(\Delta)} \circ R_{(OA)}$, donc $I = R_{(\Delta)} \circ R_{(OA)} = r_{O,\alpha}$

Théorème. L'unique isométrie différente de l'identité conservant un point est la rotation ayant pour centre ce point.

Des isométries n'ayant aucun point invariant existent-elles? Soient $O \in \mathcal{P}$, $I(O) = O'$, $O \neq O'$, et (Δ) la médiatrice du segment $[OO']$, alors :

$$I' = R_{(\Delta)} \circ I \quad (44)$$

et

$$I'(O) = R_{(\Delta)}(O') = O \quad (45)$$

Il existe éventuellement trois cas.

1. $I' = Id : R_{(\Delta)} \circ I = Id \Rightarrow R_{(\Delta)} \circ R_{(\Delta)} \circ I = R_{(\Delta)} \Rightarrow I = R_{(\Delta)}$, ce qui est impossible, car I n'a pas de points invariants.
2. $I' = R_{\Delta_1} \Rightarrow I' = R_{\Delta} \circ I = R_{\Delta_1} \Rightarrow R_{\Delta} \circ R_{\Delta} \circ I = R_{\Delta} \circ R_{\Delta_1} \Rightarrow I = R_{\Delta} \circ R_{\Delta_1}$. On sait que $(R_{\Delta_1}) // (R_{\Delta})$, car, si R_{Δ} et R_{Δ_1} sont sécants $I = r_{O,\alpha}$ et on aurait un point invariant $I = R_{(\Delta)} \circ R_{\Delta_1}$. I est par conséquent une translation.
3. $I' = r_{O,\alpha}$ avec $R_{(\Delta)} \circ I = r_{O,\alpha} \Rightarrow I = R_{\Delta} \circ r_{O,\alpha} = T_{\vec{u}} \circ R_{\Delta_1}$ avec $\vec{u}$ non normal à (Δ_1) .

Théorème. L'unique isométrie différente de l'identité n'ayant pas de point invariant est la translation.

4.3 Déplacement et antidéplacement

Il existe deux sortes d'isométries :

- celles qui conservent les angles orientés. Ce sont les **déplacements** :

	Trois points invariants non alignés	Deux points invariants non alignés	Un point invariant	Aucun point invariant
Réflexion	non	oui	non	non
Rotation	non	non	oui	non
Translation	non	non	non	oui
Identité	oui	non	non	non
$T \circ R$	non	non	non	oui

TABLE 2 – Classification des isométries

N.B. T est une translation. R est une réflexion.

- l'identité ;
- la rotation ;
- la translation.
- celles qui inversent les angles orientés. Ce sont les **antidéplacements** :
 - $T \circ R$ avec T une translation et R une réflexion ;
 - la réflexion.

Propriété 1. La composée d'un déplacement est un déplacement.

Propriété 2. L'ensemble des déplacements est un groupe non commutatif.

Propriété 3. Toute isométrie qui n'est pas un déplacement est un antidéplacement. L'ensemble des déplacements et des antidéplacement forme une **partition**.

Propriété 4. La composée de deux antidéplacements est un déplacement. Plus généralement, si la composée comprend un nombre pair d'antidéplacements, alors sa composée est un déplacement, et si la composée comprend un nombre impair d'antidéplacements, alors sa composée est un antidéplacement.

Propriété 5. La composée d'un déplacement et d'un antidéplacement est un antidéplacement.

Propriété 6. On passe d'un déplacement à un antidéplacement par composition avec une réflexion d'axe $[Ox)$.

5 Les similitudes

Une similitude est une transformation qui multiplie toutes les distances par un même nombre k avec $k \neq 0$ appelé **rapport de la similitude**. Par exemple, on peut citer :

- une homothétie de rapport $|k|$;
- les isométries. Ce sont des similitudes de rapport 1.

5.1 Propriétés

Théorème 1. Une similitude conserve les angles géométriques. Elle conserve les cosinus.

Théorème 2. Soit s une similitude, alors $s_{k_1} \circ s_{k_2} = s_{k_1 k_2}$.

Théorème 3. Une similitude conserve :

- l'alignement ;
- le parallélisme, mais pas les directions ,
- les barycentres ;
- l'orthogonalité.

Théorème 4. Une similitude multiplie les distances par k et les aires par k^2 .

5.2 Décomposition d'une similitude

Les similitudes sont :

- l'identité ;
- la réflexion ;
- la translation ;
- l'homothétie ;
- $T \circ s$ avec T une translation et s une similitude.

Il n'existe que deux types de similitudes possibles.

- La composée entre une rotation r et une homothétie H , $H \circ r$, est appelée **similitude directe**. Elle conserve les angles orientés. Dans ce cas, le centre de la rotation et de l'homothétie sont supposés distincts.
- La composée entre une réflexion R et une homothétie H , $H \circ R$, est appelée **similitude indirecte**. Elle ne conserve pas les angles orientés.

Table des figures

1	Composée de deux réflexions munies de deux axes parallèles . . .	8
2	Composée de deux réflexions munies de deux axes sécants . . .	9
3	L'angle $(\vec{\Omega I}, \vec{\Omega J})$	10
4	Composée de deux rotations de centres différents	13
5	Composée d'une translation et d'une réflexion	14
6	Composée d'une rotation et d'une réflexion	15
7	Composée d'une rotation et d'une réflexion	15

Liste des tableaux

1	Synthèse sur les transformations du plan dans le plan	6
2	Classification des isométries	18

Table des matières

1	Les transformations du plan	1
1.1	Symétrie centrale	1
1.2	Réflexion ou symétrie axiale ou symétrie orthogonale	2
1.3	Translation	2
1.4	Rotation	3
1.5	Propriétés communes à ces quatre transformations	4
1.6	Homothéties	4
1.7	Synthèse	5
2	L'image d'une droite...	5
2.1	... par une symétrie centrale	5
2.2	... par une réflexion	6
2.3	... par une translation	6
2.4	... par une homothétie	6
2.5	Propriété de conservation de la symétrie centrale, la réflexion, la translation et la rotation d'une droite	7
2.6	... par une rotation	7
3	La composition entre deux transformations	7
3.1	La composée de deux symétries centrales de centres distincts . . .	7
3.2	La composée de deux translations	7
3.3	La composée de deux réflexions	7
3.3.1	Composée de deux réflexions munies de deux axes parallèles	8
3.3.2	Composée de deux réflexions munies de deux axes perpendiculaires	8
3.3.3	Composée de deux réflexions munies de deux axes sécants	8
3.4	La composée de deux homothéties	10
3.4.1	La composée de deux homothéties de même centre	10
3.4.2	La composée de deux homothéties de centres différents et de rapports inverses	10
3.4.3	La composée de deux homothéties de centres différents et de rapports quelconque	11
3.4.4	La composée d'une homothétie et d'une translation	11
3.4.5	La méthode pour déterminer le centre d'homothétie de la composée deux homothéties	11
3.5	La composée entre deux rotations	12
3.5.1	Deux rotations de même centre	12
3.5.2	Deux rotations de centres différents	12
3.5.3	Décomposition d'une rotation en deux réflexions	14

3.6	Composée d'une translation et d'une réflexion	14
3.7	Composée d'une rotation et d'une réflexion	14
4	Les isométries	15
4.1	Théorèmes	15
4.2	Classification	16
4.3	Déplacement et antidéplacement	17
5	Les similitudes	18
5.1	Propriétés	19
5.2	Décomposition d'une similitude	19