

связывающее среднее гармоническое, среднее геометрическое, среднее арифметическое и среднее квадратическое чисел a_1, a_2, \dots, a_n .

47. Доказать, что если $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$, $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$, то

$$\frac{a_1+a_2+\dots+a_n}{n} \cdot \frac{b_1+b_2+\dots+b_n}{n} \leq \frac{a_1b_1+a_2b_2+\dots+a_nb_n}{n}.$$

48. Пусть положительные числа a_1, a_2, \dots, a_n являются последовательными членами арифметической прогрессии. Доказать, что

$$\sqrt{a_1 a_n} \leq \sqrt[n]{a_1, a_2, \dots, a_n} \leq \frac{a_1 + a_n}{2}.$$

49. Доказать, что если A - наименьшее из положительных чисел a_1, a_2, \dots, a_n , B - наибольшее, то справедливо неравенство:

$$1) A \leq \sqrt[n]{a_1, a_2, \dots, a_n} \leq B; \quad 2) A \leq \sqrt{\frac{a_1^m + a_2^m + \dots + a_n^m}{n}} \leq B;$$

$$3) A \leq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq B;$$

50. Доказать, что для любых действительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ справедливо неравенство:

$$1) \left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{\frac{1}{2}};$$

$$2) \left| \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} - \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k - b_k|;$$

$$3) \left(\left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^2 + \left(\sum_{k=1}^n b_k \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2)^{\frac{1}{2}}.$$

51. Доказать, что если $a_1 \geq 0, a_2 \geq 0, \dots, a_n \geq 0$ и $p \in N$, то

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right)^p \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k^p.$$

ОТВЕТЫ

$$1) \frac{10^{n+1} - 9n - 10}{81}; \quad 2) 3 - \frac{2n+3}{2^n};$$

$$3) \frac{1 - (n+2)x^{n+1} + (n+1)x^{n+2}}{(x-1)^2} \text{ при } x \neq 1; \quad \frac{(n+1)(n+2)}{2} \text{ при } x = 1;$$

$$4) \frac{x^{n+2} - (n+1)x^2 + nx}{(x-1)^2} \text{ при } x \neq 1; \quad \frac{n(n+1)}{2} \text{ при } x = 1.$$

$$9. \quad 1) n; \quad 2) \frac{n^2(n+1)}{2}; \quad 3) 0; \quad 4) \frac{n(n^2-1)}{3}.$$

$$13. \quad 1) \frac{n}{3n+1}; \quad 2) \frac{n}{4n+1}; \quad 3) \frac{n(n+2)}{3(2n+1)(2n+3)};$$

$$4) \frac{1}{18} - \frac{1}{3(n+1)(n+2)(n+3)}; \quad 5) \frac{n(n+1)}{2(2n+1)}.$$

15. 2) $S|n(3) = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.
18. 1) $\frac{\sin^2 nx}{\sin x}$; 2) $\frac{\sin 2nx \sin x}{2 \sin x}$; 3) $\frac{n}{2} - \frac{\sin nx \cos(n+1)x}{2 \sin x}$;
- 4) $\frac{n}{2} + \frac{\sin nx \cos(n+1)x}{2 \sin x}$;
- 5) $\frac{3 \sin \frac{n+1}{2} x \sin \frac{nx}{2}}{4 \sin \frac{x}{2}} - \frac{\sin \frac{3(n+1)}{2} x \sin \frac{3nx}{2}}{4 \sin \frac{3x}{2}}$;
- 6) $\frac{\cos \frac{3(n+1)x}{2} \sin \frac{3}{2} nx}{4 \sin \frac{3x}{2}} + \frac{3 \cos \frac{n+1}{2} x \sin \frac{nx}{2}}{4 \sin \frac{x}{2}}$.
19. 1) $x_n = \frac{3^n + (-1)^{n-1}}{4} x_1 + \frac{3}{4} (3^{n-1} + (-1)^n x_0)$;
- 2) $x_n = (2^n - 1)x_1 - 2(2^{n-1} - 1)x_0$;
- 3) $x_n = \frac{(a-1)^{n-1}}{a-2} x_1 - \frac{a-1}{a-2} ((a-1)^{n-1} - 1)x_0$ при $a \neq 2$; $x_n = nx_1 - (n-1)x_0$ при $a = 2$.
20. 1) $(1+x)^5 = 1 + 5x + 10x^2 + 10x^3 + 5x^4 + x^5$;
- 2) $(a+b)^6 = a^6 + 6a^5b + 15a^4b^2 + 20a^3b^3 + 15a^2b^4 + 6ab^5 + b^6$;
- 3) $(x+y)^7 = x^7 + 7x^6y + 21x^5y^2 + 35x^4y^3 + 21x^2y^5 + 7xy^6 + y^7$;
- 4) $(a-b)^8 = a^8 - 8a^7b + 28a^6b^2 - 56a^5b^3 + 70a^4b^4 - 56a^3b^5 + 28a^2b^6 - 8ab^7 + b^8$.
21. $C_{16}^6 x^3$.
22. 1) -7; 2) -40, -74; 3) $36C_9^3 + C_9^4 = 378$; 4) 245; 5) C_{16}^4 .
23. 1) $(n+2)2^{n-1}$; 2) $(n-2)2^{n-1} + 1$; 3) 2^{2n-1} ; 4) 2^{2n-1} ;
- 5) $(-1)^m C_{n-1}^m$; 6) $(-1)^m C_{2m}^m$ при $n = 2m$; 0 при $n = 2m + 1$.
26. 1) $\frac{27}{64}$; 2) $C_{10}^3 \frac{2^7}{3^{10}}$. 27. $C_{30}^{12} 2^9$.

§ 5. Комплексные числа

1. Определение комплексного числа.

1) *Комплексные числа* - выражения вида $a + b_i$ (a, b - действительные числа, i - некоторый символ). Равенство $z = a + b_i$ означает, что комплексное число $a + b_i$ обозначено буквой z , а запись комплексного числа z в виде $a + b_i$ называют *алгебраической формой комплексного числа*.

2) Два комплексных числа $z_1 = a_1 + b_1i$ и $z_2 = a_2 + b_2i$ называют *равными* и пишут $z_1 = z_2$, если $a_1 = a_2$, $b_1 = b_2$.

3) *Сложение* и *умножение* комплексных чисел $z_1 = a_1 + b_1i$ и $z_2 = a_2 + b_2i$ производится согласно формулам

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= a_1 + a_2 + (b_1 + b_2)i, \\ z_1 z_2 &= a_1 a_2 - b_1 b_2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i. \end{aligned}$$

4) Комплексное число вида $a + 0 * i$ отождествляют с действительным числом $a(a + 0 * i = a)$, число вида $0 + bi (b \neq 0)$ называют *чисто мнимым* и обозначают b_i ; i называют *мнимой единицей*. Действительное число a называют *действительной частью*, а действительное число b - *мнимой частью* комплексного числа $a + bi$.

5) Справедливо равенство

$$i^2 = -1,$$

(3)

а формулы (1) и (2) получаются по правилам сложения и умножения двучленов $a_1 + b_1i$ и $a_2 + b_2i$ с учетом равенства (3).

6) Операции вычитания и деления определяются как обратные для сложения и умножения, а для разности $z_1 - z_2$ и частного $\frac{z_1}{z_2}$ (при $z_2 \neq 0$) комплексных чисел $z_1 = a_1 + b_1i$ и $z_2 = a_2 + b_2i$ имеют место формулы

$$\begin{aligned} z_1 - z_2 &= a_1 - a_2 + (b_1 - b_2)i, \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} i. \end{aligned}$$

7) Сложение и умножение комплексных чисел обладают свойствами коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= z_2 + z_1, \quad z_1 z_2 = z_2 z_1; \\ (z_1 + z_2) + z_3 &= z_1 + (z_2 + z_3), \quad (z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3); \\ z_1 (z_2 + z_3) &= z_1 z_2 + z_1 z_3. \end{aligned}$$

2. Модуль комплексного числа. Комплексно сопряженные числа.

1) *Модулем комплексного числа* $z = a + bi$ (обозначается $|z|$) называется число $\sqrt{a^2 + b^2}$, т.е.

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

2) Для любых комплексных чисел z_1, z_2

$$\begin{aligned} |z_1 z_2| &= |z_1| * |z_2|; \\ \text{если } z_2 &\neq 0, \text{ то } \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \end{aligned}$$

3) Число $a - bi$ называется *комплексно сопряженным* с числом $z = a + bi$ и обозначается \bar{z} , т.е.

$$\bar{z} = a - bi = a + (-b)i.$$

Справедливы равенства

$$z * \vec{z} = |z^2|, \vec{\vec{z}}.$$

4) Для любых комплексных чисел z_1, z_2 верны равенства:

$$z_1 \pm z_2 = \vec{z_1} \pm z_2, z_1 \vec{z_2} = z_1 * \vec{z_2};$$

если $z_2 \neq 0$, то $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\vec{z_1}}{\vec{z_2}}.$

5) Частное от деления комплексных чисел можно записать в виде

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \vec{z_2} z_2 \vec{z_2}}{= z_1 \vec{z_2} |z_2|^2}, z_2 \neq 0.$$