

Pluimstruisriet	(<i>Calamagrostis canescens</i>)
Gele lis	(<i>Iris pseudacorus</i>)
Kale jonker	(<i>Cirsium palustre</i>)
Engelwortel	(<i>Angelica sylvestris</i>)
Koekoeksbloem	(<i>Lychnis flos-cuculi</i>)

Watermunt	(<i>Mentha aquatica</i>)
Moerasspiraea	(<i>Filipendula ulmaria</i>)
Moerasviooltje	(<i>Viola palustris</i>)
Veldzuring	(<i>Rumex acetosa</i>)
Valeriaan	(<i>Valeriana officinalis</i>)
Kruipende boterbloem	(<i>Ranunculus repens</i>)
Moeraswalstro	(<i>Galium palustre</i>)
Moeraszegge	(<i>Carex acutiformis</i>)
Moerasvaren	(<i>Dryopteris thelypteris</i>)
Kleine valeriaan	(<i>Valeriana dioica</i>)
Dotterbloem	(<i>Caltha palustris</i>)
Snavelzegge	(<i>Carex rostrata</i>)
Bittere veldkers	(<i>Cardamine amara</i>)

In aangrenzende sloot werd Naaldwaterbies (*Eleocharis acicularis*) aangetroffen.

3. Vochtig hooiland perceel.

Waterdrieblad	(<i>Menyanthes trifoliata</i>)
Biezeknoppen	(<i>Juncus conglomeratus</i>)
Moerasrolklaver	(<i>Lotus uliginosus</i>)
Witbol	(<i>Holcus lanatus</i>)
Egelboterbloem	(<i>Ranunculus flammula</i>)
Schildvrucht-ereprijs	(<i>Veronica scutellata</i>)
Gewone zegge	(<i>Carex nigra</i>)
Zeegroene muur	(<i>Stellaria palustris</i>)
Watermunt	(<i>Mentha aquatica</i>)
Wateraardbei	(<i>Comarum palustre</i>)
Moeraswalstro	(<i>Galium palustre</i>)
Reukgras	(<i>Anthoxanthum odoratum</i>)
Kattestaart	(<i>Lythrum salicaria</i>)
Kleverig walstro	(<i>Galium uliginosum</i>)
Koekoeksbloem	(<i>Lychnis flos-cuculi</i>)
Grote ratelaar	(<i>Rhinanthus glaber</i>)
Holpijp	(<i>Equisetum fluviatile</i>)
Moerasbasterdwederik	(<i>Epilobium palustre</i>)
Bittere veldkers	(<i>Cardamine amara</i>)
Waterrus	(<i>Juncus articulatus</i>)
Kale jonker	(<i>Cirsium palustre</i>)
Lidrus	(<i>Equisetum palustre</i>)
Brunel	(<i>Prunella vulgaris</i>)
Moeras vergeet-mij-nietje	(<i>Myosotis palustris</i>)
Witte klaver	(<i>Trifolium repens</i>)
Snavelzegge	(<i>Carex rostrata</i>)
Blauwe zegge	(<i>Carex panicea</i>)
Wilde bertram	(<i>Achillea ptarmica</i>)
Liesgras	(<i>Glyceria maxima</i>)
Penningkruid	(<i>Lysimachia nummularia</i>)
Gevleugeld hertshooi	(<i>Hypericum tetrapterum</i>)
Scherpe boterbloem	(<i>Ranunculus acris</i>)
Veldzuring	(<i>Rumex acetosa</i>)
Sterzegge	(<i>Carex echinata</i>)
Puntmos	(<i>Calliergonella cuspidata</i>)
Boompjesmos	(<i>Climacium dendroides</i>)
Haakmos	(<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>)
Rondbladsterremos	(<i>Mnium affine</i>)

4. Idem als no. 3.

Kale jonker	(Cirsium palustre)
Witbol	(Holcus lanatus)
Waterdrieblad	(Menyanthes trifoliata)
Moeraszoutgras	(Triglochin palustris)
Gevleugeld hertshooi	(Hypericum tetrapterum)
Moerasrolklaver	(Lotus uliginosus)
Schildvrucht-ereprijs	(Veronica scutellata)
Kleverig walstro	(Galium uliginosum)
Wateraardbei	(Comarum palustre)
Snavelzegge	(Carex rostrata)
Holpijp	(Equisetum fluviatile)
Moerasspiraea	(Filipendula ulmaria)
Smalle weegbree	(Plantago lanceolata)
Koekoeksbloem	(Lychnis flos-cuculi)
Grote ratelaar	(Rhinanthus glaber)
Reukgras	(Anthoxanthum odoratum)
Gewone zegge	(Carex nigra)
Scherpe boterbloem	(Ranunculus acris)
Kruipende boterbloem	(Ranunculus repens)
Veldzuring	(Rumex acetosa)
Dotterbloem	(Caltha palustris)
Penningkruid	(Lysimachia nummularia)
Pitrus	(Juncus effusus)
Ogentroost	(Euphrasia spec.)
Lidrus	(Equisetum palustre)
Kleine valeriaan	(Valeriana dioica)
Zeegroene muur	(Stellaria palustris)
Zwarte els (Kiemplant)	(Alnus glutinosa)
Pluimstruisriet	(Calamagrostis canescens)
Moeraskartelblad	(Pedicularis palustris)
Biezeknoppen	(Juncus conglomeratus)
Moeras vergeet-mij-nietje	(Myosotis palustris)
Engelwortel	(Angelica sylvestris)
Moerasvaren	(Dryopteris thelypteris)
Grote boterbloem (greppel)	(Ranunculus lingua)
Grote egelskop (greppel)	(Sparganium erectum)
Watermunt	(Mentha aquatica)
Wilde bertram	(Achillea ptarmica)
Moerasandoorn	(Stachys palustris)
Gele lis	(Iris pseudacorus)
Stijve zegge	(Carex c.f. hudsonii)
Boompjesmos	(Climacium dendroides)
Rondbladsterremos	(Mnium affine)

5. Moerasbosje.

Zwarte els	(Alnus glutinosa)
Grauwe wilg	(Salix cinerea)
Lijsterbes	(Sorbus aucuparia)
Meidoorn (Eenstijlig)	(Crataegus monogyna)
Zachte berk	(Betula pubescens)
Gelderse roos	(Viburnum opulus)
Zwarte bes	(Ribes nigrum)
Braam	(Rubus spec.)
Framboos	(Rubus idaeus)
Leverkruid	(Eupatorium cannabinum)

Moerasspiraea	(Filipendula ulmaria)
Harig wilgeroosje	(Epilobium hirsutum)
Grote brandnetel	(Urtica dioica)
Kleefkruid	(Galium aparine)
Pluimstruisriet	(Calamagrostis canescens)
Wederik	(Lysimachia vulgaris)
Koekoeksbloem	(Lychnis flos-cuculi)
Moerasvaren	(Dryopteris thelypteris)
Kattestaart	(Lythrum salicaria)
Watermunt	(Mentha aquatica)
Bitterzoet	(Solanum dulcamara)
Riet	(Phragmites communis)
Gele lis	(Iris pseudacorus)
Moerasviooltje	(Viola palustris)
Bittere veldkers	(Cardamine amara)
Moerasandoorn	(Stachys palustris)

6. Moerasbosjes met tussenliggende graslandjes.

Het betreffen hier Elzenbroekbosjes met plaatselijk open water. Naast Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Grauwe wilg (*Salix cinerea*) komen hier de volgende plantensoorten voor:

Pluimzegge	(<i>Carex paniculata</i>)
Beekpunge	(<i>Veronica beccabunga</i>)
Moeras vergeet-mij-nietje	(<i>Myosotis palustris</i>)
Dagkoekoeksbloem	(<i>Melandrium rubrum</i>)
Krabbescheer	(<i>Stratiotes aloides</i>)
Kamperfoelie	(<i>Lonicera periclymenum</i>)
Grote boterbloem	(<i>Ranunculus lingua</i>)
Nagelkruid	(<i>Geum urbanum</i>)
Hop	(<i>Humulus lupulus</i>)
Melkeppe	(<i>Peucedanum palustre</i>)
Engelwortel	(<i>Angelica sylvestris</i>)
Grasmuur	(<i>Stellaria graminea</i>)
Grote lisdodde	(<i>Typha latifolia</i>)
Smele	(<i>Deschampsia cespitosa</i>)

De volgende vogelsoorten werden hier waargenomen:

kleine karekiet	(<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)
ruinfluiter	(<i>Sylvia borin</i>)
Tjiftjaf	(<i>Phylloscopus collybita</i>)
Grasmus	(<i>Sylvia communis</i>)
Merel	(<i>Turdus merula</i>)
Winterkoning	(<i>Troglodytes troglodytes</i>)
Houtduif	(<i>Columba palumbus</i>)

7. Hooiland.


Zie hiervoor excursierapport: S. Cats, W.Ph. ten Klooster, E.E. v.d. Voo en R.J. Zandstra d.d. 15-6-1967, object Broekstukken.

8. Idem als 7.

Terrein draagt zelfde karakter als in onder 7 genoemd excursie-rapport is beschreven, doch vertoont reeds sterke ontwikkeling naar het Elzenbroekbos.

Het perceeltje op de kaart met een kruisje aangeduid, is mogelijk van archeologische waarde.

Prof. van Giffen deed hier vondsten (scherven van aardewerk), die duiden op overblijfselen van vroegere bewoning (1200-1400).



x vondsten vroegere bewoningskern.