

$S \rightarrow S(S)S \mid \epsilon$ with string $(())$

a) $S \rightarrow S(S)S \rightarrow (S)S \rightarrow (S(S))S \rightarrow ((S)S)S \rightarrow (()S)S \rightarrow (()S(S))S \rightarrow (()S(S))S \rightarrow (()()S)S \rightarrow (()())S \rightarrow (()())$

b) $S \rightarrow S(S)S \rightarrow S(S) \rightarrow S(S(S)S) \rightarrow S(S(S)) \rightarrow S(S()) \rightarrow S(S(S)S()) \rightarrow S(S(S)()) \rightarrow S(S())() \rightarrow S(()()) \rightarrow (()())$

d) Ambiguous, because you can have multiple parses

Problem 4.2.3.a page 207

$$S \rightarrow (0?1)^*$$
$$S \rightarrow S(S)S \mid \epsilon$$
$$S \rightarrow T$$
$$T \rightarrow (S) S T \mid \epsilon$$

Nonterminals	()	\$
--------------	---	---	----

S	$S \rightarrow T$	$S \rightarrow T$	$S \rightarrow T$
T	$T \rightarrow (S) S T$ $T \rightarrow \epsilon$	$T \rightarrow \epsilon$	$T \rightarrow \epsilon$