

22 - 23

THE GATEWAY

GUIDE DE REVISION

*Une compile des anciennes épreuves , TDs
et des ressources de révision pour assurerer
une révision rapide pour les evaluations
(DS, examens de fin de semestre).*

MODULE : **PROGRAMMATION
PROCEDURALE**

NIVEAU :

1



THE **GATEWAY**

LES ÉNONCÉS



ENA EDUCATION

together we learn

(Documents et calculatrices non autorisés)

Classes : 1A

Nombre de pages : 2

Date : 03/01/2017

Heure : 11h15

Durée : 1h30

Exercice (1): (9pts)

I. Soit $A \in \mathbb{R}_+^*$ et f une fonction définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$f(x) = 3 - \frac{A}{x+1}$$

- Dresser le tableau de variation de f . (1pt)
- Selon la valeur de A , discuter la stabilité de l'intervalle $[0, +\infty[$ par f . (1pt)

On suppose $0 < A < 3$.

- Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une seule solution, notée α , dans l'intervalle $[0, +\infty[$. (1pt)

Discuter le signe de la fonction $x \mapsto f(x) - x$.

- Montrer que si $x \in [0, \alpha]$, alors $f(x) \in [0, \alpha]$. (0.5pt)
- Montrer que si $x \in [\alpha, +\infty[$, alors $f(x) \in [\alpha, +\infty[$. (0.5pt)

II. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \geq 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

- Pour $u_0 = 0$,
 - Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq \alpha$. (1pt)
 - Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante. (0.5pt)
 - En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et donner sa limite. (1pt)
- Pour $u_0 = \alpha + 1$,
 - Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha \leq u_n$. (1pt)
 - Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante. (0.5pt)
 - En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et donner sa limite. (1pt)

Exercice (2): (5pts)

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Écrire les propositions ci-dessous ainsi que leur négation en utilisant des quantificateurs et (ou) des connecteurs logiques :

- f est croissante.
- f est paire.
- f est T -périodique.

4. f est constante.
5. f est majorée.

Exercice (3): (6pts)

1. Trouver une solution particulière $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z}^2$ de l'équation $13x + 5y = 3$.
2. Trouver l'ensemble des solutions de l'équation $13x + 5y = 3$ dans \mathbb{Z}^2 .
3. Déterminer le reste de la division euclidienne de 2^{2017} par 5 et de 2^{2017} par 13.
4. Dédire le reste de la division euclidienne de 2^{2017} par 65.



ENA EDUCATION

together we learn

Semestre : 1 ☒ 2 ☐

Session : Principale ☐ Rattrapage ☒

Module : Mathématiques de base I

Enseignants : UP-Maths

Classe(s) : 1A

Documents autorisés : OUI ☐ NON ☒ Nombre de pages : 2

Calculatrice autorisée : OUI ☐ NON ☒ Internet autorisé : OUI ☐ NON ☒

Date : 12/06/2017

Heure : 10h30

Durée : 1h30

Exercice 1: Suites réelles 6 points

I. On considère l'application f , définie sur \mathbb{R} par :

$$f(x) = e^x - 1.$$

- (a) (0.5 points) Étudier le sens de variation de f .
- (b) (1 point) Étudier le signe de la fonction g définie par $g(x) = f(x) - x, \forall x \in \mathbb{R}$.
- (c) (0.5 points) En déduire que $x = 0$ est l'unique solution de l'équation $f(x) = x$.

II. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}, \\ u_{n+1} = f(u_n), \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

- (a) (1 point) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et que $\forall n \geq 1, u_n > -1$.
- (b) (1 point) Étudier la monotonie de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- (c) (1 point) Étudier la convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si :
 1. $u_0 = 0$,
 2. $u_0 < 0$,
 3. $u_0 > 0$.

Exercice 2: Arithmétique dans \mathbb{Z} 4 points

On dispose d'un nombre N d'objets, tel que $100 < N < 200$. Calculer N sachant que si on range ces objets par 3 il en reste 2, si on les range par 5, il en reste 3 et si on les range par 7, il en reste 2.

Exercice 3: Logique et modes de raisonnement 4 points

On considère les deux propositions suivantes :

P . Pour toute porte ouverte du bâtiment B, il existe une clé qui l'ouvre.

Q . Il existe une clé qui ouvre toutes les portes du bâtiment B.

- (a) (1 point) Donner la valeur de vérité de la proposition : $P \Rightarrow Q$.

(b) (3 points) En déduire à l'aide d'une table de vérité les valeurs de vérité des propositions suivantes :

1. $Q \Rightarrow P$.
2. $P \Leftrightarrow Q$.
3. $\overline{P} \Rightarrow \overline{Q}$.
4. $\overline{Q} \Rightarrow P$.

Exercice 4: Analyse combinatoire 6 points

(a) (3 points) Un cadenas possède un code à 3 chiffres, sachant que chacun de ces chiffres peut varier de 1 à 9 :

- Combien y a-t-il de codes possibles?
- Combien y a-t-il de codes se terminant par un chiffre pair?
- Combien y a-t-il de codes contenant au moins un chiffre 4?
- Combien y a-t-il de codes contenant exactement un chiffre 4?

(b) (3 points) Dans cette question on souhaite que le code comporte obligatoirement trois chiffres distincts.

- Combien y a-t-il de codes possibles?
- Combien y a-t-il de codes se terminant par un chiffre impair?
- Combien y a-t-il de codes comprenant le chiffre 6?

ENA EDUCATION
together we learn

Semestre : 1 ☒ 2 ☐

Session : Principale ☒ Rattrapage ☐

Module : Mathématiques de base I

Enseignants : UP-Maths

Classe(s) : 1A

Documents autorisés : OUI ☐ NON ☒

Nombre de pages : 2

Calculatrice autorisée : OUI ☐ NON ☒

Internet autorisé : OUI ☐ NON ☒

Date : 04/01/2018

Heure : 15h30

Durée : 1h30

Exercice 1: 11 points

Partie I :

On considère la fonction f , définie, sur son domaine de définition \mathcal{D}_f , par :

$$f(x) = \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right).$$

- (a) (1 point) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \frac{1-x^2}{1+x^2} \in [-1, 1]$ et en déduire \mathcal{D}_f .
- (b) (1 point) Déterminer \mathcal{D}_f^d , le domaine de dérivabilité de f .
- (c) (1 point) Montrer que

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-2}{1+x^2}, & \text{si } x < 0; \\ \frac{2}{1+x^2}, & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

- (d) (1 point) Tracer le tableau de variation de f .

Partie II :

On considère maintenant la fonction g , définie, sur son domaine de définition \mathcal{D}_g , par :

$$g(x) = f(x) - x.$$

- (a) (0.5 points) Déterminer \mathcal{D}_g .
- (b) (1.5 points) Déterminer \mathcal{D}_g^d , le domaine de dérivabilité de g et déterminer l'expression de $g'(x)$, $\forall x \in \mathcal{D}_g^d$.
- (c) (1 point) Tracer le tableau de variation de g .
- (d) (1 point) Déduire de la question (c) :
 - i) L'équation $g(x) = 0$ admet deux solutions : 0 et $\alpha > 1$. Justifier vos réponses.
 - ii) Le signe de $g(x)$, $\forall x \in \mathcal{D}_g$.

Partie III :

On considère la suite $(U_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$\begin{cases} U_0 \geq 0 \\ U_{n+1} = \arccos\left(\frac{1-U_n^2}{1+U_n^2}\right) \end{cases}$$

- (a) (2 points) Étudier, selon la valeur de U_0 , la monotonie de la suite $(U_n)_{n \geq 0}$.

(b) (1 point) Prouver que pour tout $U_0 > 0$ la suite $(U_n)_{n \geq 0}$ converge vers α .

Exercice 2: 5 points

Dans un manuel d'utilisation d'un ordinateur on trouve les trois propositions suivantes :

(P_1) : Si l'utilisateur appuie sur la touche OK, alors le programme ne se plante pas.

(P_2) : Le fichier est effacé si le programme se plante ou l'utilisateur appuie sur la touche Cancel.

(P_3) : Si l'utilisateur n'appuie pas sur les deux touches OK et Cancel en même temps alors le fichier n'est pas effacé si l'utilisateur appuie sur la touche OK.

En considérant les propositions suivantes :

p : l'utilisateur appuie sur la touche Cancel.

q : l'utilisateur appuie sur la touche OK.

r : le programme se plante.

s : le fichier est effacé.

(a) (1.5 points) Exprimer les propositions P_1 , P_2 et P_3 en fonctions des propositions p, q, r et s et des connecteurs logiques.

(b) (1 point) Donner la contraposée de P_1 .

(c) (1 point) Donner la réciproque de P_2 .

(d) (1 point) Donner la négation de P_3 .

(e) (0.5 points) Supposons maintenant que P_1 , P_2 et P_3 sont vraies. Que se passe-t-il si l'utilisateur appuie sur les touches Cancel et OK en même temps ?

Exercice 3: 4 points

Une vieille femme se rend à un marché pour y vendre ses œufs. Un cheval piétine sa corbeille et casse tous ses œufs. Le propriétaire du cheval lui offre de payer un dinar par œuf et lui demande combien d'œufs elle avait apportés. Elle ne se souvient pas du nombre exact, mais si elle les avait groupés par paquets de 3, 4, et 5, il en serait resté, respectivement, 0, 1 et 2. Quel est la somme minimale, en dinars, que la vieille peut en bénéficier ?

together we learn

Bon travail.

Exercice 1 (6.5 points)

Soit f une fonction définie par

$$f(x) = \arcsin(x) + \arcsin\left(\frac{x}{2}\right)$$

1. (0.5 pt) Déterminer D_f le domaine de définition de f .
2. (0.5pt) Etudier la parité de f .
3. (1pt) Déterminer D_f^d le domaine de dérivabilité de f et calculer sa dérivée.
4. (1pt) Tracer le tableau de variation de f .
5. (1pt) Montrer que l'équation $f(x) = \frac{\pi}{2}$ admet une seule solution x_0 dans $[0, 1]$.
6. a (0.5 pt) Montrer que

$$\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}, \quad \forall x \in [-1, 1]$$

b (1pt) Calculer $\cos(f(x))$, pour tout $x \in D_f$.

c (1pt) Dédurre que $x_0 = \sqrt{\frac{4}{5}}$.

Rappel: $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$ — together we learn

Exercice 2 (8 points)

Soit G un graphe non orienté de sommets A, B, C et D défini par sa matrice d'adjacence

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. a (0.5pt) Représenter le graphe G .
b (1pt) Ce graphe est-il planaire? (Justifier la réponse)
c (1pt) Donner deux autres propriétés de ce graphe.
2. a (1pt) Calculer M^2 .

b (1pt) En déduire le nombre de chaînes de longueur 2 entre les sommets A et B et entre le sommet A et lui même.

3. **a (1pt)** Trouver deux réels α et β tels que

$$M^2 = \alpha M + \beta I_4$$

avec I_4 la matrice identité dans $M_4(\mathbb{R})$.

b (1pt) En déduire que M est inversible et donner M^{-1} .

4. Soit (S) le système suivant

$$(S) : \begin{cases} y + z + t = -1, \\ x + z + t = 2, \\ x + y + t = 3, \\ x + y + z = -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

Résoudre (S) dans \mathbb{R}^4 . **(1.5pts)**

Exercice 3 (5.5 points)

Soit n un nombre entier non nul. On pose $a = 4n + 3$ et $b = 5n + 2$ et $d = \text{pgcd}(a, b)$.

1. **(1.5pts)** Donner la valeur de d dans les cas suivants: $n = 1$, $n = 15$ et $n = -11$.

2. **(1pt)** Calculer $5a - 4b$ et en déduire que $d = 1$ ou $d = 7$.

3. Supposons maintenant que $d = 7$.

(a) **(0.5pt)** Vérifier que $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $4n + 3 = 7k$ et $\exists k' \in \mathbb{Z}$ tel que $5n + 2 = 7k'$.

(b) **(1pt)** Déterminer l'ensemble des couples d'entiers (m, k) tels que $4m + 3 = 7k$.

(c) **(1pt)** Déterminer l'ensemble des couples d'entiers (m, k') tels que $5m + 2 = 7k'$.

(d) **(0.5pt)** En déduire la valeur de r où r est le reste de la division euclidienne de n par 7.

— together we learn

b (1pt) En déduire le nombre de chaînes de longueur 2 entre les sommets A et B et entre le sommet A et lui même.

3. **a (1pt)** Trouver deux réels α et β tels que

$$M^2 = \alpha M + \beta I_4$$

avec I_4 la matrice identité dans $M_4(\mathbb{R})$.

b (1pt) En déduire que M est inversible et donner M^{-1} .

4. Soit (S) le système suivant

$$(S) : \begin{cases} y + z + t = -1, \\ x + z + t = 2, \\ x + y + t = 3, \\ x + y + z = -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

Résoudre (S) dans \mathbb{R}^4 . **(1.5pts)**

Exercice 3 (5.5 points)

Soit n un nombre entier non nul. On pose $a = 4n + 3$ et $b = 5n + 2$ et $d = \text{pgcd}(a, b)$.

1. **(1.5pts)** Donner la valeur de d dans les cas suivants: $n = 1$, $n = 15$ et $n = -11$.

2. **(1pt)** Calculer $5a - 4b$ et en déduire que $d = 1$ ou $d = 7$.

3. Supposons maintenant que $d = 7$.

(a) **(0.5pt)** Vérifier que $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $4n + 3 = 7k$ et $\exists k' \in \mathbb{Z}$ tel que $5n + 2 = 7k'$.

(b) **(1pt)** Déterminer l'ensemble des couples d'entiers (m, k) tels que $4m + 3 = 7k$.

(c) **(1pt)** Déterminer l'ensemble des couples d'entiers (m, k') tels que $5m + 2 = 7k'$.

(d) **(0.5pt)** En déduire la valeur de r où r est le reste de la division euclidienne de n par 7.

— together we learn