


Každý člen mnohočleny si představ jako obsah obdélníku (nebo objem kvádrů). Vzorec pak jen říká, že velký obrazec složený z dílů má stejný obsah jako součet dílů.

Zapamatuj si

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ – dva obdélníky ab ;
 $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$.
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.


- $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$; součet $a^2 + b^2$ rozložit nejde.
- Vytýkání $ab + ac = a(b+c)$: nejdřív vytkni vše, co jde.
- $x^2 + 5x + 6 = (x+2)(x+3)$: součet 5, součin 6.
- Kontrola: roznásob zpět, nebo dosad' číslo (např. $x = 2$).

Druhá mocnina součtu




Čtverec o straně $a+b$ se skládá z a^2 , dvou obdélníků ab a b^2 .

Rozdíl čtverců přeskládáním




Z a^2 vystříhni roh b^2 ; zbytek přeskládej na obdélník $(a+b) \times (a-b)$.

Vytýkání = společná strana




Obdélníky se společnou stranou a slepíme v jeden; u čtyř členů vytýkáme postupně.

Druhá mocnina rozdílu




Modrý čtverec $(a-b)^2$ zbude, když z a^2 odebereš oranžové pruhy a vrátíš roh b^2 .

Třetí mocnina součtu jako krychle



Krychli o hraně $a+b$ rozřežeme na 8 kvádrů; horní vrstvu jsme nadzvedli, aby byly vidět všechny.

Kvadratický trojčlen jako obdélník



Dílký $x^2 + 5x + 6$ jdou složit do obdélníku se stranami $x+2$ a $x+3$.