


Síločáry ukazují, kam pole tlačí kladný náboj. Čárkované ekvipotenciály (stejný potenciál) je protínají kolmo.

Zapamatuj si

- Souhlasné náboje se odpuzují, nesouhlasné přitahují.
- $F_e = k \frac{|Q_1 Q_2|}{r^2}$: dvakrát dál → čtyřikrát menší síla.
- Síločáry vedou z + do -; hustší čáry = silnější pole.

Pole osamocené bodové náboje




kladný: síločáry ven

záporný: síločáry dovnitř


Síločáry jsou paprsky z náboje. Se vzdáleností řídnu, protože $E = k \frac{|Q|}{r^2}$ klesá.

Dipól: nesouhlasné náboje +Q a -Q



Všechny síločáry z +Q končí v -Q. Ekvipotenciály (čárkovaně) je protínají kolmo.

Homogenní pole mezi nabitými deskami




Rovnoběžné síločáry stejně husté: E je všude stejná. Napětí rovnoměrně klesá od + k -.

- Intenzity se sčítají vektorově; mezi stejnými náboji je uprostřed $E = 0$.

- Homogenní pole mezi deskami: $E = \frac{U}{d}$ (V/m = N/C).


- Kladný náboj je tlačěn ve směru $\vec{E}$, elektron proti.

Coulombův zákon – síly mezi náboji




Obě tělesa působí stejně velkými silami opačného směru (3. Newtonův zákon).

Dva souhlasné náboje +Q a +Q



Síločáry se „odpuzují“, mezi náboji je místo bez pole ($E = 0$) – intenzity se tam vruší.

Skládání intenzit (superpozice)



V bodě P sečteme $\vec{E}_1$ (od +Q) a $\vec{E}_2$ (k -Q). Výslednice je tečnou k síločáře (šedě), která bodem P prochází.