

t (min)	bez víčka T (°C)	t (min)	s víčkem T (°C)	T_o (°C)

Vyhodnocení

1. Jak vypadá graf $T(t)$? K jaké hodnotě se teplota blíží a proč?

2. Vychází graf $\ln(T - T_o)$ v závislosti na t jako přímka? Kde se od ní body odchylují a čím to může být?

3. Jaké jsou konstanty k a poločasy chladnutí obou hrnků? O kolik procent víčko chladnutí zpomalí?

4. Kdy bude voda v každém hrnku pitelná (60 °C)? Souhlasí předpověď s měřením?

5. Jak se liší simulace s krokem 1 min a 10 min od měření? Proč je menší krok přesnější?

6. Co všechno kromě víčka ovlivňuje rychlost chladnutí? Navrhni další pokus.

Odevzdej

- fotka uspořádání (oba hrnky, víčko, teploměr)
- tabulka měření a soubor CSV
- graf $T(t)$ obou hrnků s modelem a graf $\ln(T - T_o)$ s regresními přímkami
- výpočet k , poločasu a času do 60 °C a 40 °C pro oba hrnky
- simulace po krocích (tabulka nebo program) s porovnáním kroku 1 min a 10 min a schéma systému
- závěr 5–8 vět: vliv víčka, platnost modelu, doporučení

Data zapiš do souboru `sablona_dat.csv` (desetinná tečka) a zpracuj programem `zpracovani.py` nebo v tabulce.