

ĐÁY CHẬU

1. Đại cương:

- Đáy chậu (peritonium) là thành dưới của ổ bụng, là toàn bộ phần mềm (cân, mạc, cơ, dây chằng...) bịt chậu hông bé ở eo dưới và nằm phía dưới hoành chậu.
- Eo dưới (lỗ chậu dưới) là một tứ giác gành với 4 góc mà phía trước là bờ dưới khớp mu, ngành dưới xương mu; Phía sau là đỉnh xương cụt; Hai bên là hai ụ ngồi và các dây chằng cùng - ụ ngồi.
- Phân chia đáy chậu: Một đường thẳng đi qua phía trước hai ụ ngồi, chia đáy chậu thành hai tam giác (trước và sau): Tam giác trước (đáy chậu trước) có niệu đạo đi qua, ở nữ còn có thêm âm đạo đi qua, nên gọi là tam giác niệu- sinh dục. Tam giác sau (đáy chậu sau) hay vùng hậu môn, ở giữa có hậu môn, hai bên là hai hố ngồi - trực tràng (hậu môn).

Trong sản khoa, người ta quan niệm đáy chậu chủ yếu là đáy chậu trước và đáy chậu trước còn được gọi là tầng sinh môn. Trong Danh từ giải phẫu Quốc tế (N.A 1985), đáy chậu cũng được mô tả chủ yếu là đáy chậu trước; Còn hố ngồi - trực tràng được mô tả riêng, như một khoang ở dưới phần sau của hoành chậu.

2. Đáy chậu sau hay vùng hậu môn

Đáy chậu sau được phủ bởi lớp da xung quanh ống hậu môn. Da ở quanh lỗ hậu môn có nhiều tuyến bã, thường sẫm màu vì có nhiều sắc tố và tạo thành những nếp toả hình tia, do các vách sợi đàn hồi nằm ngay dưới da co kéo tạo nên. Dưới da không có mạc nông. Đáy chậu sau gồm có: Ở giữa là hậu môn, xung quanh hậu môn có cơ thắt ngoài hậu môn và hai bên có 2 hố ngồi - trực tràng.

2.1 Cơ thắt ngoài hậu môn (m. sphincter ani externus), là một cơ vân vòng xung quanh ống hậu môn.

- Cấu tạo: Gồm có 3 phần, từ nông vào sâu là:

+ Phần dưới da (pars subcutanea) là một dải cơ cao khoảng 15 mm bao quanh phần thấp nhất của ống hậu môn, dưới bờ dưới của cơ thắt trong hậu môn.

+ Phần nông (Pars superficialis) nằm trên phần dưới da.

+ Phần sâu (pars profunda) là một dải dày bao quanh phần trên cơ thắt trong hậu môn. Một số sợi hòa cùng với các thớ sợi của cơ mu - trực tràng của cơ nâng hậu môn.

Ba phần này có các sợi cơ chạy vòng xung quanh ống hậu môn, đan vào nhau, phía trước bám vào gân trung tâm đáy chậu và phía sau bám vào xương cụt và dây chằng hậu môn - cụt.

- Dưới là mạc đáy chậu nông

- Tác dụng: Cơ thắt ống hậu môn, giúp cho việc đại tiện một cách chủ động. Trong khi phân thoát ra ngoài, cơ dẫn ra, phần dưới ống hậu môn mở ra. Do vậy niêm mạc của phần dưới ống hậu môn lộ ra ở lỗ hậu môn.

2.2. Hố ngồi- trực tràng (hậu môn): Có hai hố nằm hai bên ống hậu môn.

- Giới hạn: Trên một thiết đồ đứng ngang qua hố ngồi - trực tràng, hố có hình tam giác với 3 thành:

+ Thành ngoài: Là cơ và mạc cơ bịt trong, phía trong dưới cơ và mạc cơ bịt trong có ống thận. Ống này do mạc cơ bịt tách ra tạo thành. Trong ống có mạch và thần kinh thận trong.

+ Thành trên trong là hoành chậu hông và cơ thắt hậu môn.

+ Thành dưới là da vùng hậu môn mà phía trước là bờ sau hoành niệu dục, phía sau là dây chằng cùng - ụ ngồi.

- Đặc điểm:

+ Trong hố có chứa đầy mỡ nhão, hố này dễ nhiễm trùng và có thể gây dò qua hậu môn.

+ Hai hố thông với nhau qua phía sau hậu môn. Vì vậy, áp xe hố này có thể lan sang hố kia.

3. Đáy chậu trước:

Đáy chậu trước hay vùng niệu sinh dục, có niệu đạo đi qua, ở nữ có thêm âm đạo đi qua, nên có khe hở niệu dục. Đáy chậu trước của nam và nữ khác nhau, song về cấu tạo từ nông vào sâu, ở cả hai giới đều bao gồm các lớp sau:

- Da, mô dưới da

- Mạc đáy chậu nông

- Khoang đáy chậu nông với các cơ: Cơ ngang đáy chậu nông, cơ ngồi hang và cơ hành xếp.

- Khoang đáy chậu sâu, trong khoang có hai cơ: Cơ ngang đáy chậu sâu và cơ thắt niệu đạo.

3.1 Đáy chậu trước của nam: Chỉ có niệu đạo chọc qua

3.1.1. Da: Da phủ đáy chậu khá nhạy cảm, dọc theo đường giữa có đường đan đáy chậu (raphe perinealis)

3.1.2. Mạc đáy chậu nông (fascia perinei superficialis): Mạc gồm 2 lớp

- Lớp mỡ ở nông, trong lớp này có các sợi cơ trơn mà liên tiếp phía sau với đáy chậu sau và phía trước với cơ trơn Dantos của bìu.

- Lớp mạc ở sâu: Bám vào bờ dưới ngành ngồi mu, phía trước liên tiếp với mạc bìu nông, phía sau vòng lên trên các tạng cương để bám vào bờ sau hoành niệu dục và bám vào gân trung tâm đáy chậu.

3.1.3. Khoang đáy chậu nông (spatium perinei superficialis): Khoang này được giới hạn:

- Dưới là mạc đáy chậu nông

- Trên là màng đáy chậu (mạc dưới hoành niệu dục)
Trong khoang có chứa các tạng cương (hai vật hang và vật xóp) và mỗi bên có 3 cơ đáy chậu nông:

- Cơ ngang đáy chậu nông
- + Nguyên uỷ: Từ ụ ngồi, mặt trong ngành ngồi.
- + Bám tận: Gân trung tâm đáy chậu.
- Cơ ngồi hang:
- + Nguyên uỷ: Từ mặt trong ngành xương ngồi
- + Bám tận: Các sợi cơ ôm xung quanh 3 mặt của vật hang, để bám tận vào mặt dưới vật hang. Vì vậy, khi cơ co sẽ ép vào vật hang.

- Cơ hành xóp
- + Nguyên uỷ: từ gân trung tâm đáy chậu và đường giữa.
- + Đường đi và bám tận: Từ đường giữa, hai bên các sợi cơ đan chéo nhau, chạy vòng lên trên như một cái võng để cho phần đầu vật xóp nằm ở trên. Các sợi đi lên bám tận vào mạc dưới hoành niệu dục. Một số sợi vòng lên trên ôm lấy gốc dương vật và hoà lẫn với các sợi bên đối diện.

- Tóm lại: Các cơ trong khoang đáy chậu nông khi co sẽ ép vào gốc hai vật hang và vật xóp làm cho máu dồn ra trước, đồng thời làm cho máu tĩnh mạch của các tạng này không trở về được, trong khi đó máu động mạch vẫn được đưa tới. Kết quả làm cho hai vật hang và vật xóp cương to lên. Vì vậy, đây là các cơ làm cương và duy trì sự cương dương vật. Thần kinh chi phối cho các cơ này là nhánh của thần kinh thẹn và động mạch nuôi dưỡng là nhánh của động mạch thẹn trong.

3.1.4 *Khoang đáy chậu sâu* (spatium perinei profundum)

Khoang này được giới hạn:

- Trên là mạc trên hoành niệu dục
 - Dưới là mạc dưới hoành niệu dục (màng đáy chậu)
- Trong khoang, ở mỗi bên có 2 cơ là: Cơ ngang đáy chậu sâu và cơ thắt ngoài niệu đạo.

3.1.4.1 *Cơ ngang đáy chậu sâu* (m. transversus perinei profundus):

- Nguyên uỷ: Bám vào mặt trong xương ngồi, phía trên chỗ bám của cơ ngang đáy chậu nông.
- Đường đi và bám tận: Đường giữa và trung tâm gân đáy chậu.

Nằm trong bề dày của cơ này, có tuyến hành niệu đạo.

3.1.2.2 *Cơ thắt vân niệu đạo* (m. sphincter urethrae)

- Nguyên uỷ: Bám vào mặt trong ngành dưới xương mu.
- Đường đi và bám tận: Các sợi chạy từ ngoài vào trong ôm xung quanh niệu đạo, và đan với các sợi cơ bên đối diện tạo nên một cơ thắt quanh niệu đạo.

- Tác dụng: Đảm bảo cho việc đi tiểu một cách chủ động, đồng thời tổng những giọt nước tiểu hay tinh dịch cuối cùng ra khỏi niệu đạo màng.

Che phủ phía trên hai cơ này là mạc trên hoành niệu dục, mạc này mỏng. Còn che phủ mặt dưới hai cơ này là mạc dưới hoành niệu dục, mạc này dày và chắc, có các tạng cương dính vào nên còn gọi là mảnh treo các tạng cương. Phía sau của hai mạc này dính vào nhau và cùng dính vào mạc đáy chậu nông và trung tâm gân đáy chậu. Phía trước hai mạc này hòa lẫn vào nhau và tạo thành dây chằng ngang. Giữa dây chằng ngang đáy chậu và dây chằng cung có tĩnh mạch mu sâu dương vật (hay âm vật ở nữ) đi vào trong chậu hông và thần kinh mu dương vật chạy tới mu dương vật.

3.2 Đáy chậu trước của nữ

Vì ở nữ có âm đạo đi qua, nên đáy chậu trước của nữ và nam có một số khác biệt. Nổi bật là cơ hành xóp và hành xóp bị tách làm đôi, nằm hai bên âm đạo, các tạng cương ở nữ đều nhỏ hơn ở nam.

- Cơ hành xóp: Hai cơ phải và trái tách nhau ra, hai cơ này đều đi từ trung tâm gân đáy chậu chạy ra trước, vòng quanh phần dưới âm đạo và bao quanh hành tiền đình, tuyến hành tiền đình lớn (Bartholin) để bám tận vào xương mu và lưng âm vật. Vì vậy, khi cơ này co sẽ ép vào âm đạo làm khít âm đạo (gọi là cơ khít âm đạo), và ép vào tuyến Bartholin làm tiết dịch nhờn vào tiền đình âm hộ.

- Cơ ngang đáy chậu sâu: Ngoài các sợi bám vào gân trung tâm đáy chậu, các sợi phía trước còn bám vào thành bên âm đạo.

- Cơ thắt niệu đạo: Đa số các sợi bám vào thành trước âm đạo, chỉ một số ít sợi đi ra trước bám vào niệu đạo và giữa niệu đạo và âm đạo. Vì vậy, cơ này không có chức năng như một cơ thắt thực sự, khả năng thắt yếu hơn nam giới (thể hiện ở nam giới, khi đi tiểu dòng nước tiểu vọt ra được xa và mạnh, điều này cũng tương tự như khi phóng tinh).

4. **Hoành chậu** (diaphragma pelvis), hoành chậu hông gồm có 2 cơ, là cơ cụt và cơ nâng hậu môn và hai lá mạc là: mạc trên và mạc dưới hoành chậu (cân đáy chậu sâu). Hai lá mạc trên và dưới hoành chậu che phủ 2 mặt trên và dưới 2 cơ: Cơ nâng hậu môn và cơ cụt. Hoành chậu là giới hạn trên của vùng đáy chậu (cả đáy chậu trước và đáy chậu sau). Phía trên mạc trên hoành chậu là khoang chậu hông dưới phúc mạc, rồi đến phúc mạc.

4.1 Cơ nâng hậu môn (m. levator ani)

Gồm có 3 phần, căn cứ vào chỗ bám và hướng đi.

- Phần mu - trực tràng:

+ Nguyên uỷ: Từ mặt sau xương mu

+ Đường đi, bám tận: Các thớ cơ chạy từ trước ra sau, chệch xuống dưới, bó chặt và dính vào hai bên âm đạo (tạo thành cơ mu – âm đạo, ở nữ), hay dính vào hai bên tuyến tiền liệt gọi là cơ mu- tiền liệt (ở nam), các thớ cơ

tiếp tục chạy ra sau và dính vào gân trung tâm gân đáy chậu, vào ống hậu môn. Các thớ cơ ngoài chạy ra sau chỗ gấp khúc giữa ống hậu môn và bóng trực tràng rồi đan xen vào nhau, hoà lẫn với các thớ cơ dọc trực tràng và cơ thắt ngoài hậu môn.

- Phần mu- cụt:

+ Nguyên uỷ: Mặt sau xương mu, phía ngoài chỗ bám cơ mu- trực tràng.

+ Đường đi và bám tận: Các thớ cơ cũng chạy ra sau để bám vào xương cụt, dây chằng hậu môn- cụt.

- Phần chậu -cụt: Thần này ít phát triển đôi khi chỉ là phần lớn là cân.

+ Nguyên uỷ: Bám vào gai ngồi và cung gân cơ nâng hậu môn.

+ Đường đi và bám tận: Chạy ra sau và vào trong để bám vào xương cụt và dây chằng hậu môn- cụt.

Cơ nâng hậu môn được chi phối bởi thần kinh cùng III và IV.

4.2 Cơ cụt: Nằm sau cơ nâng hậu môn

+ Nguyên uỷ từ gai ngồi

+ Bám tận vào bờ ngoài phần dưới mặt trước xương cùng, xương cụt.

+ Thần kinh chi phối cũng bởi các nhánh của thần kinh cùng III và IV.

4.3 Chức năng hoành chậu:

- Nâng đỡ các tạng bụng và các tạng trong chậu hông.

- Kiểm soát đi tiểu tiện (cơ nâng tuyến tiền liệt, hay cơ mu – âm đạo).

- Kiểm soát đại tiện (cơ mu- trực tràng), khi cơ này dẫn ra làm thẳng chỗ gấp khúc giữa bóng trực tràng và ống hậu môn, giúp cho phân thoát ra ngoài dễ dàng. Ở nữ, cơ này có tác dụng hướng đầu thai nhi đi thẳng ra ngoài lúc sinh đẻ.

- Cùng với các cơ thành bụng tạo nên áp lực ổ bụng.

5. Trung tâm gân đáy chậu (centrum tendineum perinei).

- Là một nút cơ sợi nằm ở trung tâm gân đáy chậu (nằm ở giữa ống hậu môn và hoành niệu dục trên đường giữa).

- Cấu tạo: Nút này gồm nhiều cơ, mạc đáy chậu nông, mạc trên và dưới hoành niệu dục bám vào. Nên là chỗ tựa vững chắc của đáy chậu.

- Áp dụng: Trong đẻ khó, để tránh làm tổn thương gân trung tâm đáy chậu, cần phải chủ động cắt tầng sinh môn (ở vị trí 5 hay 7 giờ). Trong một số phẫu thuật vào vùng hậu môn, sinh dục, thì để vào các cơ quan đó phải cắt trung tâm gân đáy chậu. Nên gân này được coi như chìa khóa để mở vào vùng đáy chậu.