

ÔN TẬP SPSS

GV. PHẠM NGỌC THẠCH

Email: phamngocthach@hmu.edu.vn


NỘI DUNG ÔN TẬP

- Các lệnh – ý nghĩa các lệnh đã học
- Các bước để phân tích số liệu nghiên cứu
- Cấu trúc đề thi
- Một số ví dụ về câu hỏi thi

I. CÁC LỆNH – Ý NGHĨA CÁC LỆNH

1. Data \ Sort Cases


- ✓ Ý nghĩa: Sắp xếp dữ liệu theo các trường được chọn.
- ✓ Không làm thay đổi kết quả phân tích số liệu.
- ✓ Ưu tiên sắp xếp trường đưa vào sắp xếp trước.



I. CÁC LỆNH – Ý NGHĨA CÁC LỆNH

2. Data \ Select Cases


- Ý nghĩa: Lọc, chọn ra những bản ghi thỏa mãn điều kiện.
- Các tiêu chí lọc:
 - Điều kiện
 - Ngẫu nhiên
 - Chọn một đoạn bản ghi.
- Kết quả lọc trong Output:
 - Lọc tại chỗ
 - Lưu sang file mới
 - Xóa các bản ghi không thỏa mãn



I. CÁC LỆNH – Ý NGHĨA CÁC LỆNH

3. Transform \ Compute Variable



- Ý nghĩa: Tạo biến mới bằng công thức.
- Lưu ý:
 - Đơn vị tính theo thời gian mặc định: giây.
 - Tính BMI chiều cao tính theo mét.
 - Có thể sử dụng hàm ở mục *Function group*



I. CÁC LỆNH – Ý NGHĨA CÁC LỆNH

4. Transform \ Recode Into Different Variable



- Ý nghĩa: Tạo biến mới bằng cách mã hóa biến cũ.
- Lưu ý:
 - Quy tắc giá trị tuân theo quy tắc chuyển trước.
 - Không chọn mục All other values



I. CÁC LỆNH – Ý NGHĨA CÁC LỆNH

5. Analyze \ Descriptive \ Frequency



- Ý nghĩa: Thống kê tần số, các chỉ số thống kê.
- Biến định tính, định lượng



I. CÁC LỆNH – Ý NGHĨA CÁC LỆNH

6. Analyze \ Descriptive \ Descriptive



- Ý nghĩa: Thống kê các chỉ số thống kê.
- Biến định lượng



I. CÁC LỆNH – Ý NGHĨA CÁC LỆNH

7. Analyze \ Descriptive \ Explore



- Ý nghĩa: Thống kê các chỉ số thống kê.
- Biến định lượng
- Có thể thống kê trên nhiều nhóm



I. CÁC LỆNH – Ý NGHĨA CÁC LỆNH

8. Analyze \ Descriptive \ Crosstab


- Ý nghĩa: So sánh tỷ lệ theo bảng.
- 2 biến định tính



I. CÁC LỆNH – Ý NGHĨA CÁC LỆNH

9. Analyze \ Compare Means \ One Sample T-test



- Ý nghĩa: So sánh trung bình 1 biến định lượng và 1 giá trị.



I. CÁC LỆNH – Ý NGHĨA CÁC LỆNH

10. Analyze \ Compare Means \ Independent Samples T-test


- Ý nghĩa:
 - So sánh trung bình một biến định lượng trên hai nhóm nghiên cứu.
 - Biến định tính / 2 nhóm của 1 biến



I. CÁC LỆNH – Ý NGHĨA CÁC LỆNH

11. Analyze \ Compare Means \ Paired Samples T-test

- Ý nghĩa: So sánh trung bình ghép cặp của 2 biến định lượng.



II. CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

1. Sử dụng lệnh (các lệnh) phù hợp, các tùy chọn đúng.
2. Đọc kết quả đúng vị trí
3. Phiên giải kết quả đúng ý nghĩa bài toán (*khác biệt/ không khác biệt*).
4. Rút ra ý nghĩa thực tế (*phương pháp nào tốt hơn*).

III. CẤU TRÚC ĐỀ THI

1. Câu hỏi trắc nghiệm

- 8 câu
- Mỗi câu 0.5 điểm
- Mỗi câu có 4 đáp án.

2. Câu hỏi đọc kết quả

- 3 câu, mỗi câu 4 ý
- Mỗi câu đọc output và điền kết quả vào 4 ô trống.
- Mỗi ý đúng 0.5 điểm

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Để sắp xếp dữ liệu ta dùng lệnh:

- A. Data \ Select Cases
- B. Data \ Sort Cases
- C. Data \ Merge file \ Add Case.
- D. Data \ Sort Variable

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

2. Để lọc chọn ra 30 bản ghi ngẫu nhiên trong file số liệu ta chọn mục nào trong hộp thoại Select Cases:

- A. All Cases
- B. If condition is satisfied
- C. Random sample of cases.
- D. Bases on time or case range

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

3. Để lưu kết quả lọc được sang một file mới ta chọn lựa chọn nào trong mục Output của hộp thoại Select Cases :

- A. Filter out unselected cases
- B. Copy to selected cases to a new dataset
- C. Delete unselected cases.
- D. Không chọn mục nào trong các mục trên

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

4. Để tạo biến mới bằng công thức ta dùng lệnh:

- A. Data \ Select Cases
- B. Transform \ Recode into SameVariables
- C. Transform \ Compute Variable
- D. Transform \ Recode into Diffirent Variables

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

5. Để hiển thị các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn tuổi của nhóm bệnh nhân nghiên cứu, các lệnh sau đều đúng NGOẠI TRỪ:

- A. Analyze \ Descriptive Statistic \ Frequency
- B. Analyze \ Descriptive Statistic \ Descriptive
- C. Analyze \ Descriptive Statistic \ Explore
- D. Analyze \ Descriptive Statistic \ Crosstab

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

6. Để hiển thị các giá trị điểm cắt tứ phân vị tuổi trong nhóm nghiên cứu ta dùng lệnh:

- A. Analyze \ Descriptive Statistic \ Frequency
- B. Analyze \ Descriptive Statistic \ Descriptive
- C. Analyze \ Descriptive Statistic \ Explore
- D. Analyze \ Descriptive Statistic \ Crosstab

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

7. Để so sánh tỷ lệ tăng Glucose máu của hai nhóm đối tượng (chứng và bệnh) ta dùng lệnh:

- A. Analyze \ Descriptive Statistic \ Frequency
- B. Analyze \ Descriptive Statistic \ Descriptive
- C. Analyze \ Descriptive Statistic \ Explore
- D. Analyze \ Descriptive Statistic \ Crosstab

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

8. Để so sánh trung bình Triglycerid tại thời điểm trước điều trị và sau 30 ngày ta dùng lệnh:

- A. Analyze \ Compare Means \ One Sample T-test
- B. Analyze \ Compare Means \ Independent Samples T-test
- C. Analyze \ Compare Means \ Pared Samples T-test
- D. Analyze \ Compare Means \ Means

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

9. Để tạo biến nhiệt độ để đo thân nhiệt cho bệnh nhân ta chọn Type, Width, Decimals nào là phù hợp nhất:

- A. Numeric (4,1)
- B. Numeric (2,1)
- C. Numeric (3,1)
- D. Numeric (5,1)

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

10. Để tạo một biến kiểu số thì ta phải chọn phần Width và Decimals nào là đúng?

- A. 1 và 2
- B. 2 và 2
- C. 0 và 2
- D. 3 và 2

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

11. Để lọc các bệnh nhân nam > 6 tuổi và nữ > 4 tuổi, hãy chọn đáp án đúng?

1. $\text{Gioi}=1$ and $\text{Tuoi}>6$ or $\text{Gioi}=2$ and $\text{Tuoi}>4$
2. $(\text{Gioi}=1 \text{ and } \text{Tuoi}>6)$ or $(\text{Gioi}=2 \text{ and } \text{Tuoi}>4)$
3. $\text{Gioi}=1 \ \& \ \text{Tuoi}>6 \mid \text{Gioi}=2 \ \& \ \text{Tuoi}>4$
 - A. Chỉ 1 đúng
 - B. Chỉ 2 đúng
 - C. Chỉ 3 đúng
 - D. Tất cả các phương án đều đúng

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

12. Để mã hóa trường Tuổi thành các nhóm tuổi theo tiêu chí:

N1: < 20

N2: 20 – 39

N3: 40 – 60

N4: > 60

Các thao tác chuyển như sau:

1. Lowest thru 20 → 1

2. 20 thru 39 → 2

3. 40 thru 60 → 3

4. 60 thru Highest → 4

Hãy sắp xếp các thao tác theo thứ tự để mã hóa đúng

A. 1 → 2 → 3 → 4

B. 3 → 4 → 2 → 1

C. 2 → 4 → 3 → 1

D. 3 → 1 → 2 → 4

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

13. Cho biết giá trị trung bình và độ lệch chuẩn bậc cầu (BC) của nhóm nghiên cứu dựa vào kết quả bên:

- A. 16.1839 và 1.1237
- B. 16.1839 và 10.4814
- C. 16.1839 và 10.4815
- D. 13.2000 và 10.4815

Statistics

BC		
N	Valid	87
	Missing	18
Mean		16.1839
Std. Error of Mean		1.12373
Median		13.2000
Mode		12.70 ^a
Std. Deviation		10.48146
Variance		109.861
Range		45.70
Minimum		.00
Maximum		45.70

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

14. Cho biết 12.70 là:

- A. Trung bình của biến BC
- B. Trung vị của biến BC
- C. Giá trị hay gặp của biến BC và là duy nhất
- D. Giá trị hay gặp nhỏ nhất của biến BC

BC		
N	Valid	87
	Missing	18
Mean		16.1839
Std. Error of Mean		1.12373
Median		13.2000
Mode		12.70 ^a
Std. Deviation		10.48146
Variance		109.861
Skewness		1.171
Std. Error of Skewness		.258
Kurtosis		.911
Std. Error of Kurtosis		.511
Range		45.70
Minimum		.00
Maximum		45.70

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

15. Cho biết xu hướng biểu đồ của biến BC trong nghiên cứu:

- A. Bẹt và lệch phải
- B. Bẹt và lệch trái
- C. Nhọn và lệch phải
- D. Nhọn và lệch trái

BC		
N	Valid	87
	Missing	18
Mean		16.1839
Std. Error of Mean		1.12373
Median		13.2000
Mode		12.70 ^a
Std. Deviation		10.48146
Variance		109.861
Skewness		1.171
Std. Error of Skewness		.258
Kurtosis		.911
Std. Error of Kurtosis		.511
Range		45.70
Minimum		.00
Maximum		45.70

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

16. Cho biết xu hướng biểu đồ của biến BC trong nghiên cứu:

- A. Bẹt và lệch phải
- B. Bẹt và lệch trái
- C. Nhọn và lệch phải
- D. Nhọn và lệch trái

Ure		
N	Valid	96
	Missing	0
Mean		4.5771
Median		4.3000
Mode		3.50
Std. Deviation		1.20556
Variance		1.453
Skewness		.740
Std. Error of Skewness		.246
Kurtosis		-.158
Std. Error of Kurtosis		.488
Minimum		2.40
Maximum		8.00

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

**17. Trung bình –
Phương sai BMI của
nhóm nghiên cứu là:**

- A. 21.6427 – 3.7938
- B. 22.2351 – 14.393
- C. 22.8274 – 14.393
- D. 22.0668 – 3.7938

Descriptives				
		Statistic	Std. Error	
BMI	Mean	22.2351	.29993	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	21.6427	
		Upper Bound	22.8274	
	5% Trimmed Mean	22.0668		
	Median	21.7666		
	Variance	14.393		
	Std. Deviation	3.79383		
	Minimum	14.28		
	Maximum	34.17		
	Range	19.89		
	Interquartile Range	5.05		
	Skewness	.643	.192	
	Kurtosis	.293	.381	

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

18. Biến BMI của nghiên cứu có xu hướng chuẩn vì:

A. Chỉ cần Skewness = 0.643

B. Chỉ cần Kurtosis = 0.293

C. $P_{\text{Kolmogorov-Smirnov}} = 0.095$

D. $P_{\text{Shapiro-Wilk}} = 0.001$

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
BMI	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error
BMI	Mean	22.2351	.29993
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	21.6427
		Upper Bound	22.8274
	5% Trimmed Mean	22.0668	
	Median	21.7666	
	Variance	14.393	
	Std. Deviation	3.79383	
	Minimum	14.28	
	Maximum	34.17	
	Range	19.89	
	Interquartile Range	5.05	
	Skewness	.643	.192
	Kurtosis	.293	.381

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
BMI	.065	160	.095	.970	160	.001

a. Lilliefors Significance Correction

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

19. Trong nhóm nghiên cứu có bao nhiêu bệnh nhân có Ure = 6.0:

- A. 0
- B. 6
- C. 15
- D. 3

Ure mau Stem-and-Leaf Plot

Frequency	Stem &	Leaf
1.00	1 .	9
24.00	2 .	001123445555666666888999
32.00	3 .	00011112233334444555667778888999
36.00	4 .	000000111112222333334556666778888999
15.00	5 .	112345566666778
15.00	6 .	111233556677889
6.00	7 .	056799
3.00	8 .	008
7.00	9 .	2257799
4.00	10 .	0346
2.00	11 .	57
15.00	Extremes	(>=11.9)

Stem width: 1.00

Each leaf: 1 case(s)

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

20. Có bao nhiêu % số bệnh nhân có BMI < 18:

- A. 0.6
- B. 11.3
- C. 11.9
- D. 10.6

BMI					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14.28	1	.6	.6	.6
	15.31	1	.6	.6	1.3
	15.56	1	.6	.6	1.9
	15.63	1	.6	.6	2.5
	16.02	1	.6	.6	3.1
	16.53	2	1.3	1.3	4.4
	16.94	1	.6	.6	5.0
	17.31	1	.6	.6	5.6
	17.58	2	1.3	1.3	6.9
	17.75	1	.6	.6	7.5
	17.78	1	.6	.6	8.1
	17.80	1	.6	.6	8.8
	17.83	1	.6	.6	9.4
	17.97	1	.6	.6	10.0
	17.98	1	.6	.6	10.6
	18.00	1	.6	.6	11.3
	18.02	1	.6	.6	11.9
	18.07	1	.6	.6	12.5
	18.20	1	.6	.6	13.1
	18.29	1	.6	.6	13.8
	18.37	2	1.3	1.3	15.0
	18.37	1	.6	.6	15.6
	18.40	1	.6	.6	16.2

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

21. Có bao nhiêu % số bệnh nhân có tuổi từ 60 trở lên:

- A. 3.8
- B. 73.7
- C. 70.0
- D. 30.0

TUOI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	34	1	.6	.6	.6
	41	1	.6	.6	1.3
	43	1	.6	.6	1.9
	45	2	1.3	1.3	3.1
	46	2	1.3	1.3	4.4
	47	1	.6	.6	5.0
	49	4	2.5	2.5	7.5
	50	2	1.3	1.3	8.8
	51	1	.6	.6	9.4
	53	3	1.9	1.9	11.3
	54	4	2.5	2.5	13.8
	55	4	2.5	2.5	16.3
	56	5	3.1	3.1	19.4
	57	2	1.3	1.3	20.6
	58	6	3.8	3.8	24.4
	59	3	1.9	1.9	26.3
	60	6	3.8	3.8	30.0
	61	5	3.1	3.1	33.1
	62	3	1.9	1.9	35.0
	63	2	1.3	1.3	36.3
	..	-	..	..	..

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

22. Tỷ lệ % số bệnh nhân nữ trong nhóm Bệnh là:

- A. 77.0
- B. 81.9
- C. 61.1
- D. 48.1

DOITUONG * Gioi Tinh Crosstabulation

			Gioi Tinh		Total
			nam	nu	
DOITUONG	CHUNG	Count	17	49	66
		% within DOITUONG	25.8%	74.2%	100.0%
		% within Gioi Tinh	50.0%	38.9%	41.2%
		% of Total	10.6%	30.6%	41.2%
	BENH	Count	17	77	94
		% within DOITUONG	18.1%	81.9%	100.0%
		% within Gioi Tinh	50.0%	61.1%	58.8%
		% of Total	10.6%	48.1%	58.8%
Total	Count		34	126	160
	% within DOITUONG		21.2%	78.8%	100.0%
	% within Gioi Tinh		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		21.2%	78.8%	100.0%

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

**23. Tỷ lệ % số bệnh nhân
Bệnh trong nhóm Nam là:**

- A. 17.0
- B. 18.1
- C. 50.0
- D. 10.6

DOITUONG * Gioi Tinh Crosstabulation

			Gioi Tinh		Total
			nam	nu	
DOITUONG	CHUNG	Count	17	49	66
		% within DOITUONG	25.8%	74.2%	100.0%
		% within Gioi Tinh	50.0%	38.9%	41.2%
		% of Total	10.6%	30.6%	41.2%
	BENH	Count	17	77	94
		% within DOITUONG	18.1%	81.9%	100.0%
		% within Gioi Tinh	50.0%	61.1%	58.8%
		% of Total	10.6%	48.1%	58.8%
Total	Count		34	126	160
	% within DOITUONG		21.2%	78.8%	100.0%
	% within Gioi Tinh		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		21.2%	78.8%	100.0%

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

24. Tỷ lệ % số bệnh nhân thuộc nhóm Bệnh là:

- A. 58.8
- B. 41.2
- C. 78.8
- D. 21.2

DOITUONG * Gioi Tinh Crosstabulation

			Gioi Tinh		Total
			nam	nu	
DOITUONG	CHUNG	Count	17	49	66
		% within DOITUONG	25.8%	74.2%	100.0%
		% within Gioi Tinh	50.0%	38.9%	41.2%
		% of Total	10.6%	30.6%	41.2%
	BENH	Count	17	77	94
		% within DOITUONG	18.1%	81.9%	100.0%
		% within Gioi Tinh	50.0%	61.1%	58.8%
		% of Total	10.6%	48.1%	58.8%
Total	Count	34	126	160	
	% within DOITUONG	21.2%	78.8%	100.0%	
	% within Gioi Tinh	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	21.2%	78.8%	100.0%	

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

25. Trung bình – sai số chuẩn cho trung bình là:

- A. $22.2351 - 3.7928$
- B. $22.2351 - 0.2999$
- C. $22.2351 - 0.2351$
- D. $0.2351 - 0.2999$

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
BMI	160	22.2351	3.79383	.29993

One-Sample Test

	Test Value = 22					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
BMI	.784	159	.434	.23508	-.3573	.8274

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

26. Trung bình của chênh lệch glucose giữa hai nhóm bệnh và chứng là:

- A. 5.1727
- B. 10.6968
- C. -5.5241
- D. 0.5968

Group Statistics

	DOITUONG	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Glucose mau	CHUNG	66	5.1727	1.10252	.13571
	BENH	94	10.6968	5.63408	.58111

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Glucose mau	Equal variances assumed	81.194	.000	-7.854	158	.000	-5.52408	.70339	-6.91334	-4.13482
	Equal variances not assumed			-9.257	102.983	.000	-5.52408	.59675	-6.70759	-4.34057

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

27. Cho biết giá trị p và kết luận đúng khi so sánh BMI của nhóm nghiên cứu với giá trị 22:

- A. $p=0.784$. Không có sự khác biệt về trung bình BMI với 22.
- B. $p=0.784$. Có sự khác biệt về trung bình BMI với 22.
- C. $p=0.434$. Không có sự khác biệt về trung bình BMI với 22.
- D. $p=0.344$. Có sự khác biệt về trung bình BMI với 22.

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
BMI	160	22.2351	3.79383	.29993

One-Sample Test

	Test Value = 22					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
BMI	.784	159	.434	.23508	-.3573	.8274

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

28. Khi so sánh Glucose với 6.4 thu được kết quả dưới, hãy cho biết kết luận đúng nhất:

- A. Không có sự khác biệt về trung bình Glucose của nhóm với giá trị 6.4 với độ tin cậy 99%.
- B. Không có sự khác biệt về trung bình Glucose của nhóm với giá trị 6.4 với độ tin cậy 95%.
- C. Có sự khác biệt về trung bình Glucose của nhóm với giá trị 6.4 với độ tin cậy 99%.
- D. Có sự khác biệt về trung bình Glucose của nhóm với giá trị 6.4 với độ tin cậy 95%.

Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
	Lower	Upper
2.01813	1.2143	2.8220

IV. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

29. Khi so sánh trung bình TG của nhóm CHUNG và nhóm BENH thu được kết quả dưới, cho biết p và kết luận:

- A. $p=0.000$. Có sự khác biệt về trung bình TG giữa hai nhóm với độ tin cậy 99%.
- B. $p=0.007$. Có sự khác biệt về trung bình TG giữa hai nhóm với độ tin cậy 99%.
- C. $p=0.007$. Có sự khác biệt về trung bình TG giữa hai nhóm với độ tin cậy 95%.
- D. $p=0.003$. Có sự khác biệt về trung bình TG giữa hai nhóm với độ tin cậy 99%.

Group Statistics

	DOITUONG	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Triiglycerid	CHUNG	66	1.6658	.79390	.09772
	BENH	94	2.2863	1.72939	.17837

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Triiglycerid	Equal variances assumed	16.862	.000	-2.719	158	.007	-.62052	.22823	-1.07129	-.16975
	Equal variances not assumed			-3.051	139.256	.003	-.62052	.20339	-1.02265	-.21839

V. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI ĐỌC KẾT QUẢ

TUOI

N	Valid	160
	Missing	0
Mean		67.91
Median		69.00
Mode		65 ^a
Std. Deviation		12.259
Variance		150.287
Minimum		34
Maximum		101
Percentiles	25	59.00
	50	69.00
	75	76.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

30. Cho biết:

Ý 1: Trung bình tuổi:

Ý 2: Trung vị tuổi:

Ý 3: Tuổi hay gặp:

Ý 4: Phương sai tuổi:

V. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI ĐỌC KẾT QUẢ

			Statistic	Std. Error
Ure mau	Mean		6.2363	.47734
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	5.2935	
		Upper Bound	7.1790	
	5% Trimmed Mean		5.4188	
	Median		4.5500	
	Variance		36.456	
	Std. Deviation		6.03788	
	Minimum		1.90	
	Maximum		59.00	
	Range		57.10	
	Interquartile Range		3.38	
	Skewness		5.401	.192
	Kurtosis		39.939	.381

31. Cho biết:

Ý 1: Trung bình Ure sau khi bỏ
5% số liệu xa :

Ý 2: Độ lệch Ure:

Ý 3: Khoảng tứ phân vị:

Ý 4: Phương sai Ure:

V. MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI ĐỌC KẾT QUẢ

Group Statistics

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Triiglycerid	DOITUONG CHUNG	66	1.6658	.79390	.09772
	BENH	94	2.2863	1.72939	.17837

32. Cho biết:

Ý 1: Trung bình Triglycerid của nhóm chứng:

Ý 2: Độ lệch Triglycerid của nhóm chứng :

Ý 3: Trung bình Triglycerid của nhóm bệnh:

Ý 4: Độ lệch Triglycerid của nhóm bệnh: