


BỘ Y TẾ
TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC HẢI PHÒNG

Bệnh án số

Họ và tên người làm bệnh án: Nguyễn Trung Hiếu
 Lớp: Y6 K59B
 Ngày làm bệnh án: 21/10/2022



Sở Y tế: TP Hải Phòng
 Bệnh viện: Hữu nghị Việt-Thiệp
 Khoa: Nội 3

BỆNH ÁN NỘI KHOA

I. HỒI BỆNH

1. Hành chính:

Họ và tên: PHẠM VĂN BẢO Tuổi: 59 Giới: Nam
 Nghề nghiệp: thợ xây
 Địa chỉ: Bạch Đằng - Tân Lãng - Hải Phòng
 Khi cần báo tin cho: vợ Phạm Thị Quy
 địa chỉ: cùng địa chỉ điện thoại: 095.884.596

2. Lý do vào viện:

vết vỡ + hoa mắt chóng mặt ngày thứ 2

3. Bệnh sử:

Khởi đầu 2 ngày trước khi đi làm BN cảm thấy mệt mỏi, đau đầu khi bắt đầu công việc. Sau đó cả khi nghỉ ngơi cũng hoa mắt chóng mặt. Khi BN nghỉ ngơi thì đỡ, sáng sớm khi thay đổi tư thế. Ngồi ra BN buồn nôn, không nôn, chóng đầu đau, chóng mặt, không khó thở, không nặng nề ở chân, không sưng mắt, mũi, mắt không nhìn mờ, không xuất huyết hay tiểu râm. BN đau tiểu tiện bình thường, tiểu 1-2 lần, nước tiểu vàng trong, không tiểu buốt, tiểu rát, tiểu máu, không đau tức thắt lưng. BN ăn uống tốt, không uống thuốc gì, thuốc nào thuốc lá.

BN vẫn tiếp tục làm việc. BN đi khám: BTH giải phẫu 5 lít máu chưa kỹ - Tổng huyết áp - 170/100. BN được 2 lít máu chưa kỹ cũng thuốc hạ áp - lợi tiểu, kích tạo hồng cầu.

Hiện tại:

Sau 7 ngày điều trị BN đỡ mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt chóng mặt, đau đầu giảm bớt. Tiểu 1-2 lần, nước tiểu vàng trong.

2. Chẩn đoán

2.1. Chẩn đoán xác định/sơ bộ (thể, mức độ/giai đoạn, nguyên nhân, biến chứng)

Đánh thủng màng ối, thai chết, 5-6 tuần, chưa rõ nguyên nhân, biến chứng nguy hiểm

2.2. Chẩn đoán phân biệt (nếu có)

2.3. Chẩn đoán bệnh kèm theo (nếu có)

3. Xét nghiệm cần làm thêm

Tổng phân tích nước tiểu

Siêu âm, creatinin sau mổ, ngày 1-2 tuần

Số lượng tiểu, bilirubin

4. Phương pháp điều trị

Không dùng thuốc, Nghỉ ngơi, tránh hoạt động nặng

Đi lại 2-4 giờ mỗi ngày

Ăn giảm chất béo, rau xanh, khoai củ, sữa chua

Không dùng các chất độc hại: rượu, thuốc lá, cà phê

Không dùng các chất độc hại: rượu, thuốc lá, cà phê

Dùng thuốc: Amoxicillin 500mg x 1 viên/ngày uống sáng

Furosemid 40mg

Nasol 2000U x 1 giọt/ngày điều trị dị ứng mũi, 3-5 ngày

Furosemid 40mg x 1 viên/ngày uống sáng

Levofloxacin 500mg x 1 viên/ngày uống sáng

5. Tiên lượng và phòng bệnh

Giảm

Xa