## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ THIẾU MÁU TAN MÁU THIẾU MÁU THIẾU SẮT

| 1.  | Các biểu | hiện lâm | sàng của | ı thiếu | máu | tan | máu | gồm | các | triệu | chứng | sau | đây |
|-----|----------|----------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
| trù | r:       |          |          |         |     |     |     |     |     |       |       |     |     |
| a-  | Thiếu má | iu       |          |         |     |     |     |     |     |       |       |     |     |

- a- Imeuma
- b- Vàng da
- c- Lách to
- d- Xuất huyết
- e- Nước tiểu sẫm màu
- 2. Hãy khoanh tròn vào các xét nghiệm chứng tỏ có tan máu:
- a- Bilirubin tự do tăng
- b- Hemoglobulin niệu
- c- Transaminase tăng
- d- Hồng cầu lưới tăng
- e- Ure máu tăng
- 3. Xử trí ban đầu thiếu máu tan máu khi chưa rõ nguyên nhân gồm các biện pháp sau đây, trừ:
- a- Loại bỏ nguyên nhân gây tan máu nghi ngờ
- b- Truyền máu khi thiếu máu nặng
- c- Kháng sinh
- d- Lơi tiểu khi đái ít hoặc vô niêu
- 4. Hãy chọn 2 biện pháp quan trọng nhất trong các biện pháp điều trị Thalsemia thể nặng, mạn tính. Khoanh tròn vào 2 biện pháp ấy.
- a- Thải sắt
- b- Cắt lách
- c- Axit folic
- d- Chống thiếu máu
- 5. Đặc điểm của bệnh thiếu máu thiếu sắt. Hãy khoanh tròn vào câu đúng:

| Mệnh đề                                    | Đỳng | Sai |
|--|------|-----|
| 1. Thường xảy ra ở trẻ < 6 tháng           |      |     |
| 2. Xảy ra từ từ                            |      |     |
| 3. Thiếu máu thường nặng                   |      |     |
| 4. Thường gặp ở trẻ suy dinh dưỡng         |      |     |
| 5. Thiếu máu dễ hồi phục khi được điều trị |      |     |
|  |      |     |

- 6. Hãy kể 4 nhóm nguyên nhân chính gây thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em :
  - A. Cung cấp thiếu
  - B. Hấp thu kém

C.

D. Nhu cầu cao

- 7. Trẻ bị thiếu máu thiếu sắt khi nồng độ sắt huyết thanh giảm dưới bao nhiêu?
- 8. Triệu chứng nào không phù hợp trong các triệu chứng lâm sàng của thiếu máu thiếu sắt.
  - A. Thiếu máu xảy ra từ từ
  - B. Thường gặp ở trẻ 6 tháng  $\rightarrow$  3 tuổi
  - C. Thường kèm theo gan lách to
  - D. Thường gặp trên trẻ suy dinh dưỡng
  - E. Thường gặp ở trẻ rối loạn tiêu hoá kéo dài
- 9. Sắt ở trẻ mới đẻ được người mẹ cung cấp trong thời kỳ mang thai chủ yếu:
  - A. 3 tháng đầu
- B. 3 tháng giữa
- C. 3 tháng cuối
- D. Cả quá trình mang thai
- 10. Thời gian uống viên sắt ở trẻ bị thiếu máu thiếu sắt tối thiểu:
- A. 1 tuần
- B. 2 tuần
- C. 1 tháng
- D. 2 tháng