CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ BÀI SUY HÔ HẤP SƠ SINH

1 /		,	^	1 ^	1 ^	1 /	-	• ^	^		1 ^	1 ^	4
. /	rong	000	nauwan	nhan	Chiivon	hoò	COLL	AII	COX	CITY	hā	han	twive
	I I OHY	LAL.	nguyên	1111111111	CHUVCH	HUA	Sau u	ıcu	YAV	311 V	1117	111111	. II II .
-,					,		> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		5	~,			,

- a. Hạ đường máu.
- b. Ha canxi máu.
- c. Hạ thân nhiệt
- d. Mẹ dùng thuốc gây mê, thuốc an thần.

2/ Để đánh giá mức độ suy hô hấp sơ sinh, người ta dựa vào:

- a. Chỉ số apgar.
- b. Chỉ số Silverman.
- c. Chỉ số Sigtuna
- d. Nhịp thở và tím tái.

3/ Trẻ sơ sinh, một ngày tuổi, đẻ non 28 tuần, cân nặng 1500 gr. Sau đẻ trẻ hồng hào nhưng một giờ sau đẻ xuất hiện suy hô hấp ngày càng nặng và trẻ được chuyển tới bệnh viện. Vào viện trẻ đợc khám thấy đập cánh mũi rõ, rút lõm cơ liên sườn rõ, rút lõm trên ức, thở rên thì thở ra, di động ngực bụng ngược chiều.

- 1/ Hãy khoanh tròn vào nguyên nhân có khả năng nhất:
- a. Thoát vị hoành
- b. Bệnh màng trong
- c. Hội chứng hít phân xu
- d. Viêm phế quản phổi
- 2/ Bệnh nhân được chụp XQuang tim phổi, hãy kể các khả năng có thể gặp về hình ảnh của phổi trên phim ?
- 3/ Hãy kể 5 nguyên tắc điều trị triệu chứng trên bệnh nhân này:
 - +
 - +
 - +
 - +
 - +