

TEST LƯỢNG GIÁ BÀI TÁO BÓN Ở TRẺ EM

1. Theo định nghĩa táo bón ở trẻ em, số lần ỉa trong 1 ngày ở lứa tuổi sơ sinh. Kèm theo với phân rắn, đau khi bài xuất được quy định là.

- 1) Trẻ sơ sinh dưới 2lần/ngày.
- 2) Trẻ sơ sinh dưới 1lần/ngày.
- 3) Trẻ sơ sinh dưới 1lần/3ngày.
- 4) Trẻ sơ sinh dưới 1lần/1tuần.

2.Theo định nghĩa táo bón ở trẻ em, số lần ỉa nào dưới đây được quy định ở lứa tuổi trẻ bú mẹ. Kèm theo với phân rắn, đau khi bài xuất phân.

- 1) Dưới 3 lần ỉa/1tuần.
- 2) Trên 2 ngày ỉa 1lần.
- 3) Trên 3 ngày ỉa 1 lần.
- 4) Trên 5 ngày ỉa 1 lần.

3. Theo định nghĩa táo bón ở trẻ em, số lần ỉa/1tuần dưới đây được quy định ở lứa tuổi trẻ lớn. Kèm theo với phân rắn và đau khi bài xuất phân.

- 1) Dưới 2lần ỉa/1tuần.
- 2) Trên 3 ngày ỉa 1 lần.
- 3) Dưới 3 lần ỉa/1 tuần.
- 4) Dưới 1 lần/2 tuần.

4. Anh chị hãy liệt kê nguyên nhân thực tổn đại tràng, trực tràng hậu môn gây táo bón ở trẻ em.

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

5. Anh chị hãy liệt kê nguyên nhân tổn thương thực thể thần kinh gây táo bón ở trẻ em.

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

6. Anh chị hãy liệt kê các nguyên nhân bệnh toàn thân gây táo bón ở trẻ em.

- 1.....
- 2.....
- 3.....

7. Anh chị hãy liệt kê các nguyên nhân gây táo bón cơ năng trẻ em:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

8. Anh chị hãy chọn trong các triệu chứng sau, triệu chứng nào là triệu chứng của táo bón cơ năng:

- 1- Tình trạng toàn thân phát triển bình thường.**
- 2- Tình trạng toàn thân chậm. về cân nặng, chiều cao, kém ăn.
- 3- Chướng bụng, đau bụng.
- 4- Có nhiều đợt viêm đại tràng.
- 5- Thăm trực tràng đầy phân, cục phân to.**
- 6- Táo bón ngay giai đoạn sơ sinh.
- 7- Thăm trực tràng phân cục nhỏ, phân dê.

9. Anh chị hãy chọn trong các triệu chứng sau, triệu chứng nào là triệu chứng của táo bón thực thể.

- 1) Phân phát triển thể chất chiều cao cân nặng.**
- 2) Táo bón 2-3 tháng trở lại đây - tuổi sơ sinh ỉa bình thường.
- 3) Chậm phân xu, táo bón ngay giai đoạn sơ sinh.**
- 4) Cục phân to, rắn thường bị nứt rách hậu môn khi ỉa són phân.
- 5) Cục phân dê, rắn, thăm trực tràng không có phân.**

10. Anh chị hãy điền liều dùng cho trẻ em các loại thuốc điều trị táo bón sau ở trẻ em.

- 1) Dầu parafun.....
- 2) Lactulose (Dufalax)
- 3) Dung dịch đa điện giải (Magie citrate, sorbitol).
- 4) Polyéthylène glycol