Módulo 14

Bulário

Leitura da bula do paciente e do profissional (RDC 47/2009 e alterações), Bulário Eletrônico da Anvisa, referência, genérico e similar intercambiável (RDC 16/2007, RDC 58/2014), rotulagem vigente (RDC 768/2022), orientação ao paciente e farmacovigilância (Lei 13.021/2014, VigiMed e Notivisa), com um bulário de bolso dos medicamentos mais dispensados.

- Estrutura da bula
- Bulário Eletrônico da Anvisa
- Referência, genérico e similar intercambiável
- Embalagem e rotulagem no balcão
- Da bula à orientação ao paciente
- Farmacovigilância a partir da bula

Estrutura da bula

A **bula** é o documento legal, aprovado pela Anvisa, que acompanha o medicamento e reúne as informações necessárias ao uso seguro. A norma que fixa forma e conteúdo da bula é a RDC 47/2009, ainda vigente em outubro de 2026, com alterações pontuais feitas pela RDC 406/2020, pela RDC 769/2022 e pela RDC 831/2023. Ela define dois textos diferentes para o mesmo produto: a bula para o paciente e a bula para o profissional de saúde.

O QUE DIZ A NORMA

Bula para o paciente: "bula destinada ao paciente, aprovada pela Anvisa, com conteúdo sumarizado, em linguagem apropriada e de fácil compreensão". A bula para o profissional de saúde tem conteúdo detalhado tecnicamente (RDC 47/2009, art. 4º, IV e V).

As três partes de toda bula

As duas versões seguem o mesmo esqueleto, em três partes (RDC 47/2009, Anexo I):

1. **Identificação do medicamento**: nome comercial, denominação genérica pela DCB, apresentações (forma farmacêutica, concentração, quantidade e acessório dosador), via de administração, faixa etária de uso (em caixa alta e negrito, como USO ADULTO ou USO PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 MESES) e composição com os excipientes.
2. **Informações ao paciente** (na bula do paciente) ou **informações técnicas aos profissionais de saúde** (na bula do profissional).
3. **Dizeres legais**: número de registro no Ministério da Saúde, farmacêutico responsável com o número no CRF, razão social e CNPJ da empresa titular, fabricante e importador, telefone do SAC e as restrições de venda e de uso.

Bula do paciente: nove perguntas

A parte central da bula do paciente é escrita como perguntas fixas, sempre na mesma ordem. Saber a ordem economiza tempo no balcão.

Nº	Pergunta da bula do paciente	Uso típico no balcão
1	Para que este medicamento é indicado?	Conferir se a indicação bate com a queixa
2	Como este medicamento funciona?	Tempo de início de ação
3	Quando não devo usar este medicamento?	Contraindicações, idade mínima
4	O que devo saber antes de usar este medicamento?	Gestação, lactação, interações, álcool, direção

Nº	Pergunta da bula do paciente	Uso típico no balcão
5	Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento?	Conservação e validade depois de aberto
6	Como devo usar este medicamento?	Dose, intervalo, relação com refeições
7	O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento?	Dose esquecida
8	Quais os males que este medicamento pode me causar?	Reações adversas por frequência
9	O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?	Superdose, intoxicação acidental

Leitura rápida no balcão

Com o cliente esperando, a leitura segue uma ordem que responde primeiro ao que pode causar dano:

1. **Identificação**: concentração, forma farmacêutica e faixa etária. Muitos erros nascem aqui, antes de qualquer dose.
2. **Contraindicações** (pergunta 3 ou item 4): idade mínima, gestação, doenças que impedem o uso.
3. **Posologia** (pergunta 6 ou item 8): dose por tomada, intervalo, dose máxima e duração sem reavaliação médica.
4. **Interações e advertências** (pergunta 4 ou itens 5 e 6): álcool, outros medicamentos em uso, direção de veículos.
5. **Conservação** (pergunta 5 ou item 7): temperatura, luz, prazo depois de aberto.

Indicação, mecanismo e estudos de eficácia raramente mudam a conduta no balcão e podem ser lidos depois. Quando a bula do paciente usa termo vago, como "conforme orientação médica", a resposta técnica costuma estar no item 8 da bula do profissional.

Bula do profissional: dez itens

A bula do profissional de saúde é organizada em dez itens numerados: 1. Indicações; 2. Resultados de eficácia; 3. Características farmacológicas; 4. Contraindicações; 5. Advertências e precauções; 6. Interações medicamentosas; 7. Cuidados de armazenamento do medicamento; 8. Posologia e modo de usar; 9. Reações adversas; 10. Superdose. É nela que estão as doses por quilo, a farmacocinética, o ajuste na insuficiência renal ou hepática e a lista completa de interações. Para conferir dose pediátrica ou dose máxima, a fonte é o item 8 da bula do profissional, e não a bula impressa do paciente que está na caixa.

PONTO-CHAVE

As reações adversas do item 9 são agrupadas por frequência: muito comum (mais de 1 em 10 pacientes), comum (1 em 100 a 1 em 10), incomum (1 em 1.000 a 1 em 100), rara (1 em 10.000 a 1 em 1.000) e muito rara (menos de 1 em 10.000). Uma reação "rara" pode ser grave, como a agranulocitose da dipirona.

Alterações recentes da norma

- **RDC 406/2020**: atualizou as frases obrigatórias do item de reações adversas da bula do profissional, ligadas à notificação de eventos adversos.
- **RDC 769/2022**: passou a permitir, nas embalagens, um mecanismo digital (como QR Code) que dá acesso à bula publicada no Bulário Eletrônico.
- **RDC 831/2023**: em vigor desde fevereiro de 2024, alterou o art. 14 e permitiu que bulas de genéricos e similares difiram da bula padrão, desde que de acordo com o que foi aprovado no registro de cada produto.
- **RDC 885/2024**: aprovou um projeto-piloto de bula digital, com dispensa opcional da bula impressa em embalagens de determinados medicamentos, condicionada ao fornecimento da bula impressa sempre que o paciente, o prescritor ou o estabelecimento pedir. Em 2026 a Anvisa abriu consultas para avaliar o resultado do piloto.

ATENÇÃO

Se a caixa participa do piloto e veio sem bula impressa, o paciente continua com direito ao texto em papel. A farmácia não deve negar a informação: imprime a bula do Bulário Eletrônico ou orienta o acesso pelo código da embalagem (RDC 885/2024).

Bula em formato especial

A empresa titular do registro deve fornecer de graça a bula em formato especial (áudio, formato digital, Braille ou fonte ampliada) quando a pessoa com deficiência visual pedir, e o SAC deve ser capaz de ler a bula por telefone (RDC 47/2009, art. 40). O envio deve ocorrer em até 10 dias úteis (art. 41). O telefone do SAC está nos dizeres legais da bula e na embalagem.

NO BALCÃO

Cliente idoso com baixa visão pede ajuda para "ler a bula do remédio novo". Leia com ele os itens 6 e 7 (como usar e dose esquecida), escreva o horário na caixa em letra grande e informe que o fabricante é obrigado a enviar a bula em fonte ampliada ou áudio pelo SAC.

Bulário Eletrônico da Anvisa

O **Bulário Eletrônico** é a base pública da Anvisa onde ficam as últimas versões aprovadas das bulas do paciente e do profissional. A RDC 47/2009 determina que as bulas sejam publicadas ali e que apenas bulas de medicamentos comercializados constem da base (art. 38). Na prática, é a fonte oficial para conferir dose, contraindicação e categoria de venda de um produto.

Como consultar

1. Acesse o portal de consultas da Anvisa (consultas.anvisa.gov.br) e escolha **Bulário Eletrônico**. Pelo site gov.br/anvisa, o caminho passa por "Sistemas" e "Sistemas de consultas".
2. Preencha ao menos um campo: nome do medicamento, empresa, número de registro, número do expediente da bula, categoria regulatória ou período de publicação. Os filtros podem ser combinados.

3. Na lista de resultados, cada linha corresponde a um produto de uma empresa. Abra o PDF da **bula do paciente** ou da **bula do profissional** pelo ícone correspondente.
4. Confira a data de publicação e, se precisar, o histórico de versões anteriores.

PONTO-CHAVE

Pesquise pelo nome comercial quando quiser a bula de um produto específico. Pesquise pela substância (DCB) quando quiser ver todos os fabricantes: aparecem referência, genéricos e similares, cada um com sua bula.

Bula do referência, do genérico e do similar

A RDC 47/2009 chama de **bula padrão** o texto que serve de modelo para harmonizar as demais bulas do mesmo fármaco; para genéricos e similares, a bula padrão é a do medicamento de referência (art. 4º, VII). Por isso a bula de um genérico costuma repetir quase literalmente a do referência. Desde a RDC 831/2023, porém, a bula de genérico ou similar pode diferir da bula padrão quando o registro do produto aprovou características diferentes. Exemplos que mudam a orientação:

- apresentações e concentrações diferentes (um genérico pode não ter a forma pediátrica do referência);
- excipientes diferentes, que importam para quem tem alergia a corante, intolerância à lactose ou fenilcetonúria;
- número de gotas por mL, que depende do conta-gotas de cada fabricante;
- cuidados de conservação e prazo depois de aberto;
- categoria de venda, quando um registro foi atualizado para isento de prescrição e outro não.

Bula do profissional ou do paciente

Para estudar e para responder a dúvidas técnicas, use a bula do profissional: ela traz posologia por peso, ajuste em insuficiência renal e hepática, interações com mecanismo e superdose com conduta. Para orientar o paciente, use a linguagem da bula do paciente, que já foi escrita para o público leigo. As duas devem dizer a mesma coisa em níveis de detalhe diferentes.

Versão e data da bula

Toda bula muda ao longo do tempo: inclusão de nova reação adversa, mudança de faixa etária, nova apresentação, alteração de categoria de venda. A bula impressa que acompanha uma caixa fabricada há dois anos pode estar desatualizada em relação à versão publicada hoje. Para questões de segurança, a referência é a última versão do Bulário Eletrônico, cuja data aparece na consulta. A empresa tem prazos para colocar a nova bula nas embalagens e no Bulário depois de cada alteração aprovada (RDC 47/2009, art. 51).

Quando o Bulário não abre

O sistema da Anvisa às vezes fica lento ou bloqueia acessos automatizados. Alternativas, em ordem de confiança: o site do fabricante (que deve manter a bula aprovada), a bula impressa da embalagem em

estoque (conferindo a data de aprovação no fim do texto) e reproduções em portais privados. Portais privados podem estar desatualizados e misturar textos de apresentações diferentes; use como apoio, nunca como fonte final de dose máxima ou de categoria de venda.

CASO

Mãe pede "o mesmo antialérgico em xarope" para um filho de 8 meses. O produto de referência tem solução oral liberada a partir de 6 meses, mas o genérico disponível na loja tem outra faixa etária na bula. O farmacêutico pesquisa a substância no Bulário, abre a bula do profissional do genérico e confere a idade mínima antes de dispensar.

NO BALCÃO

Mantenha no computador do balcão um atalho para o Bulário Eletrônico. Em dúvida sobre dose pediátrica, idade mínima ou dose máxima, consulte a bula do profissional do produto que será entregue, e não a de outro fabricante.

Referência, genérico e similar intercambiável

O cliente pergunta se "o genérico é igual". A resposta correta depende de três categorias de registro, definidas pela regulamentação de genéricos (RDC 16/2007, com redação da RDC 51/2007) e pela norma de similares intercambiáveis (RDC 58/2014).

Categoria	Definição resumida	Como reconhecer	Intercambialidade
Referência	Inovador registrado, com eficácia, segurança e qualidade comprovadas no registro	Nome de marca; consta da lista de referência da Anvisa	Pode ser trocado pelo genérico ou pelo similar intercambiável correspondente
Genérico	Intercambiável com o referência, designado pela DCB	Nome pela DCB; logotipo "Medicamento Genérico" em faixa amarela; frase "Medicamento genérico, Lei nº 9.787, de 1999"	Substitui o referência, salvo restrição expressa do prescritor
Similar	Mesmo princípio ativo, concentração, forma, via, posologia e indicação; identificado por marca	Nome comercial próprio	Só é intercambiável se aprovado pela Anvisa e listado
Similar intercambiável	Similar com equivalência farmacêutica e bioequivalência (ou bioisenção) aprovadas	Frase "MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA" na bula	Substitui o referência

O QUE DIZ A NORMA

"Será considerado intercambiável o medicamento similar cujos estudos de equivalência farmacêutica, biodisponibilidade relativa/bioequivalência ou bioisenção tenham sido apresentados, analisados e aprovados pela ANVISA." (RDC 58/2014, art. 2º). O parágrafo único manda a Anvisa publicar a relação dos similares com os referências correspondentes.

Regras da substituição no balcão

- O farmacêutico pode substituir o medicamento prescrito pelo genérico correspondente, salvo restrição expressa do prescritor (RDC 16/2007, Anexo, item 2.1).
- Ao substituir, indica a troca na receita, apõe carimbo com nome e número no CRF, data e assina (item 2.2).
- Deve explicar ao paciente a dispensação feita e orientar o uso (item 2.4). A Resolução CFF 349/2000 reconhece essa atribuição do farmacêutico.
- A troca de similar intercambiável é feita em relação ao referência. A lista publicada pela Anvisa liga cada similar ao seu referência; ela não autoriza trocar genérico por similar nem similar por outro similar.

O que a bula garante e o que não garante

A bula de um genérico ou de um similar intercambiável garante o mesmo princípio ativo, na mesma concentração, forma farmacêutica, via e posologia do referência, com equivalência demonstrada. Ela não garante que o produto seja idêntico em tudo. Podem mudar: cor, formato, sulco do comprimido, excipientes, sabor, tamanho do frasco, acessório dosador, número de gotas por mL e prazo de validade. Para o paciente, isso tem consequência prática: o idoso estranha o comprimido de outra cor e acha que é outro remédio; o alérgico a corante reage ao excipiente; a mãe usa o conta-gotas de um frasco para medir a dose de outro fabricante.

ATENÇÃO

A categoria de registro não muda a regra de venda. Um genérico de antimicrobiano continua sujeito à retenção de receita pela RDC 471/2021, e um genérico de tramadol continua na lista A2 da Portaria 344/1998, com a receita definida pelo adendo da lista.

CASO

Receita de Allegra® 180 mg, sem restrição à troca. O cliente pede algo mais barato. O farmacêutico oferece o genérico de fexofenadina 180 mg, anota a substituição na receita com carimbo, CRF, data e assinatura e avisa que o comprimido pode ter outra cor. Um similar só poderia entrar no lugar do referência se constasse da relação de intercambiáveis da Anvisa.

Biológicos, fitoterápicos e específicos

Não existe genérico de medicamento biológico nem de fitoterápico no modelo da Lei 9.787/1999. Vitaminas, minerais e outros medicamentos específicos também ficam fora da lógica de intercambialidade. Nesses casos, a troca de marca precisa de nova prescrição.

NO BALCÃO

Ao entregar um genérico ou similar intercambiável no lugar do referência, mostre ao paciente o nome da substância na caixa, diga que a cor ou o formato podem ser diferentes e peça que não tome os dois juntos. Se o produto anterior era em gotas, explique a nova dose em gotas, conferida na bula do produto entregue.

Embalagem e rotulagem no balcão

A embalagem é a primeira bula que o atendente lê. Desde dezembro de 2022, as regras de rotulagem de medicamentos estão na **RDC 768/2022**, que revogou a RDC 71/2009 (art. 104, III). O prazo final para as empresas adequarem as embalagens foi 30 de dezembro de 2025 (art. 95 e regras de transição), e a Anvisa ainda analisa pedidos individuais de exceção para esgotar estoques antigos. Em 2026, portanto, o balcão convive com caixas do modelo novo e algumas do modelo antigo.

Face frontal

A face principal do cartucho deve trazer o nome comercial, a DCB, a concentração, a forma farmacêutica, a via de administração, a restrição de uso por idade (por exemplo USO ADULTO, em caixa alta e negrito) e a identificação da empresa (RDC 768/2022, art. 3º). É ali também que aparecem as marcas de categoria de venda:

- **Venda sob prescrição**: faixa vermelha ou preta com a frase VENDA SOB PRESCRIÇÃO dentro da faixa (arts. 20 e 23). A faixa preta identifica os controlados mais restritos, como os sujeitos a Notificação de Receita.
- **Retenção de receita**: frase própria para os controlados das listas que exigem retenção e para os antimicrobianos (arts. 35 e 43). Nas bulas conferidas aparece como "Só pode ser vendido com retenção da receita" (Tramal®, Tylex®, Dermazine®).
- **Isento de prescrição**: frase em negrito "Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de um profissional de saúde", além das indicações e das principais contraindicações na embalagem (art. 17).
- **Genérico**: logotipo "Medicamento Genérico" dentro da faixa amarela (arts. 25 a 29).

Demais faces

As outras faces trazem os dados de rastreio e de uso seguro: empresa, CNPJ e "Registrado por"; número de registro; lote, data de fabricação e prazo de validade; telefone do SAC; cuidados de conservação; a orientação para consultar a bula; frases de alerta definidas na RDC 770/2022; quantidade total; e o código de barras e os dados de rastreabilidade (RDC 768/2022, art. 5º).

Informação	Onde está	Para que serve no balcão
Concentração e forma	Face frontal	Evitar troca de 200 mg/mL por 50 mg/mL; comprimido de liberação prolongada por convencional
Restrição de idade	Face frontal	USO ADULTO no frasco de gotas impede a venda para criança
Faixa e frase de venda	Face frontal	Decidir se exige receita e se retém
Lote e validade	Lateral ou aba	Conferir na entrega; anotar na queixa técnica e na notificação de evento adverso
Conservação	Lateral	Orientar temperatura, luz, umidade e prazo após aberto
Registro e SAC	Lateral	Confirmar regularidade; contato com o fabricante

PONTO-CHAVE

A categoria de venda vale por registro, e não por substância. A desloratadina consta da lista de isentos, mas a bula do Desalex® consultada em 2026 ainda traz "venda sob prescrição médica". O ibuprofeno em gotas de 50 e 100 mg/mL é isento, e a apresentação de 200 mg/mL do mesmo fabricante traz venda sob prescrição. Leia a embalagem do produto que está na mão.

Erros de leitura que causam dano

- Confundir mg/mL com mg/gota: 500 mg/mL de dipirona em gotas são 25 mg por gota quando o frasco tem 20 gotas por mL.
- Ler só o nome de marca e não ver a extensão: "Retard", "Entérico", "Flash", "D", "Baby" mudam forma, dose ou idade.
- Ignorar "uso adulto" em gotas de metoclopramida ou em comprimidos de loperamida.
- Dispensar embalagem com validade próxima do fim de um tratamento longo.

NO BALCÃO

Antes de embalar, leia em voz alta para o cliente o nome, a concentração e a forma farmacêutica escritos na caixa e compare com a receita ou com o pedido. A conferência em três pontos (nome, concentração, forma) pega a maioria das trocas.

Da bula à orientação ao paciente

A bula diz o que pode ser feito; a orientação diz ao paciente o que ele vai fazer amanhã às 8 horas. Transformar uma em outra é trabalho do farmacêutico (Lei 13.021/2014, art. 13, VI). O roteiro abaixo cobre o que mais gera erro de uso.

Posologia em horários

"1 comprimido a cada 8 horas" e "3 vezes ao dia" não são a mesma coisa para medicamentos que dependem de nível constante. Combine com o paciente horários reais (por exemplo 6 h, 14 h e 22 h) e escreva na caixa. Para analgésicos usados "se dor", explique o intervalo mínimo entre doses e a dose máxima do dia, que estão no item 8 da bula do profissional e no item 6 da bula do paciente.

Medicamento (bula consultada)	Dose máxima diária na bula
Paracetamol 750 mg (genérico Medley)	4000 mg, sem passar de 1000 mg por dose
Dipirona (Novalgina®)	Adulto: 40 gotas ou 1 g por dose, até 4 vezes ao dia
Ibuprofeno 400 mg (Advil®)	1200 mg sem prescrição
Naproxeno sódico (Flanax®)	550 mg sem prescrição, até 10 dias
Loperamida (Imosec®)	16 mg (8 comprimidos)
Dimenidrinato 50 mg (Dramin® Capsgel)	400 mg no adulto; 150 mg de 6 a 12 anos

Relação com alimentos e com outros medicamentos

A bula indica se o medicamento deve ser tomado em jejum, com alimento ou longe de outro produto. Exemplos conferidos:

- Bisacodil (Dulcolax®): não tomar com leite, antiácido ou inibidor de bomba de prótons, que dissolvem o revestimento entérico antes da hora.
- Fexofenadina (Allegra®): evitar suco de frutas junto e esperar 2 horas de antiácido com alumínio e magnésio.
- Acetilcisteína (Fluimucil®): quando houver antibiótico oral, separar 2 horas.
- Metoclopramida (Plasil®): 10 minutos antes das refeições; domperidona (Motilium®): 15 a 30 minutos antes.
- AINE (Advil®, Profenid®): durante ou após as refeições.
- Omeprazol (Losec Mups®): pela manhã; se precisar dispersar, usar água sem gás ou suco, nunca leite.
- Montelucaste na asma (Singulair®): ao anoitecer.
- Simeticona e levotiroxina: a simeticona pode reduzir a absorção da levotiroxina (bula do Luftal®).

Medir a dose líquida

O número de gotas por mL é definido pelo conta-gotas de cada produto e está na bula. Nas bulas consultadas: dipirona Novalgina® 20 gotas/mL; bromoprida Digesan® 24 gotas/mL; metoclopramida Plasil® 21 gotas/mL; butilescopolamina Buscopan® 20 gotas/mL; tramadol Tramal® 20 a 40 gotas para 50 a 100 mg, a 100 mg/mL. Orientar sempre com o dosador que veio na caixa e nunca com colher de cozinha.

ATENÇÃO

Trocar o frasco de gotas por outro fabricante ou outra concentração sem recalcular a dose é causa clássica de superdose em criança. Ibuprofeno existe em 50, 100 e 200 mg/mL; a mesma "quantidade de gotas" muda a dose em até quatro vezes.

Conservação

Quase todas as bulas conferidas pedem temperatura ambiente entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade. O banheiro, com vapor do chuveiro, e o carro ao sol são os piores lugares. Alguns produtos têm prazo próprio depois de aberto: acetilcisteína xarope (Fluimucil®) 14 dias; tramadol gotas (Tramal®) 6 meses; fexofenadina suspensão (Allegra®) 12 meses; budesonida + formoterol spray (Symbicort®) 3 meses após abrir o invólucro de alumínio. O aerossol de salbutamol não pode ser furado nem exposto a mais de 50 °C, e o efeito cai se o frasco ficar frio (bula do Aerolin®). O aciclovir creme não deve ir à geladeira (bula do Zovirax®).

Dose esquecida

A resposta está no item 7 da bula do paciente. A regra mais comum é tomar assim que lembrar, a menos que esteja perto do horário da próxima dose; nesse caso, pular a esquecida e seguir o horário, sem dobrar a dose. Há exceções que dependem do produto, como contraceptivos orais e anticoagulantes: leia o item 7 do produto antes de responder.

CASO

Senhor de 70 anos sai com omeprazol 20 mg, bisacodil 5 mg e leite de magnésia comprados juntos. A orientação, tirada das bulas, é: omeprazol pela manhã, em jejum; bisacodil à noite, nunca com o leite de magnésia nem com leite, e longe do omeprazol; procurar o médico se a prisão de ventre durar mais que alguns dias.

NO BALCÃO

Termine a entrega com três perguntas de checagem: "Como o senhor vai tomar?", "Até quando?" e "O que faz se esquecer?". Se o paciente não souber responder, a orientação ainda não terminou.

Farmacovigilância a partir da bula

Farmacovigilância é a vigilância dos efeitos dos medicamentos depois que chegam ao mercado. A farmácia comercial é um ponto privilegiado: é ali que o cliente volta dizendo que "o remédio deu coceira" ou que "a cápsula veio grudada". A Lei 13.021/2014 obriga o farmacêutico a notificar os profissionais de saúde, os órgãos sanitários e o laboratório fabricante dos efeitos colaterais, reações adversas, intoxicações e farmacodependência observados (art. 13, I).

O QUE DIZ A NORMA

"Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas atividades, a: I - notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência observados e registrados na prática da farmacovigilância" (Lei 13.021/2014, art. 13, I).

Evento adverso ou queixa técnica

	Evento adverso	Queixa técnica
O que é	Dano ou efeito indesejado na pessoa que usou o medicamento	Suspeita de problema no produto: desvio de qualidade, falsificação, produto sem registro, empresa irregular
Exemplos	Urticária após dipirona; sonolência intensa com ciclobenzaprina; falta de efeito inesperada	Comprimido quebrado ou manchado, cor diferente no mesmo lote, frasco vazando, rótulo ilegível, lacre violado
Sistema da Anvisa	VigiMed	Notivisa
Quem notifica	Cidadão, profissional de saúde, serviço de saúde, empresa	Profissional, serviço, cidadão

Para notificar evento adverso não é preciso ter certeza da causa: a suspeita basta. A Anvisa não reconhece bases privadas de notificação como válidas para farmacovigilância. Na queixa técnica, o sigilo do notificante é preservado e os dados pessoais não ficam visíveis para a empresa, que recebe a notificação para investigar.

Como a bula ajuda

- O **item 8 da bula do paciente** (item 9 da bula do profissional) diz se a reação é esperada e com que frequência. Reação descrita na bula também deve ser notificada; reação grave ou ausente da bula merece atenção dobrada.
- O **item 3 ou 4** (contraindicações e advertências) mostra se houve uso fora do previsto, por exemplo AINE em quem tem asma induzida por ácido acetilsalicílico.
- Os **dizeres legais** trazem o fabricante, o registro e o SAC, dados exigidos na notificação.
- A **embalagem** traz lote e validade, sem os quais a queixa técnica não pode ser rastreada.

PONTO-CHAVE

Guarde o produto suspeito, a embalagem e a bula. Na queixa técnica, separe as unidades do mesmo lote que estão em estoque até a resposta da empresa ou da vigilância sanitária.

O que registrar

1. Paciente: iniciais, idade, sexo, peso se criança, gestação.
2. Medicamento: nome comercial e DCB, concentração, fabricante, lote, validade, dose, via, data de início e de suspensão.
3. Evento: descrição, data de início, gravidade, desfecho, se melhorou com a suspensão e se voltou ao reintroduzir.
4. Outros medicamentos em uso, inclusive isentos de prescrição e fitoterápicos.
5. Conduta da farmácia: encaminhamento, suspensão orientada, contato com o prescritor.

ATENÇÃO

Sinais de gravidade pedem encaminhamento imediato antes de qualquer formulário: falta de ar, inchaço de lábios ou língua, bolhas na pele ou nas mucosas, febre com dor de garganta durante uso de dipirona, fezes pretas durante uso de AINE, sonolência extrema ou respiração lenta com codeína ou tramadol.

CASO

Cliente de 41 anos volta à farmácia com placas vermelhas que coçam, dois dias após iniciar nimesulida prescrita. Não há falta de ar nem lesão em mucosa. O farmacêutico orienta suspender e procurar o prescritor, consulta o item de reações adversas da bula, registra lote e validade da caixa e notifica a suspeita no VigiMed.

NO BALCÃO

Tenha um formulário interno de farmacovigilância junto ao caixa, com campos de lote e validade. A notificação feita no mesmo dia, com a caixa na mão, é muito mais completa do que a feita de memória.


Fontes consultadas

1. Anvisa. Resolução RDC nº 47, de 8 de setembro de 2009. Estabelece regras para elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas de medicamentos. Texto em bvsms.saude.gov.br (consulta out. 2026).
2. Anvisa. Resolução RDC nº 406, de 2020 (farmacovigilância; altera frases obrigatórias de reações adversas da bula do profissional). Citada em fontes secundárias.
3. Anvisa. Resolução RDC nº 769, de 12 de dezembro de 2022 (altera a RDC 47/2009: mecanismo digital de acesso à bula, art. 26, § 2º).
4. Anvisa. Resolução RDC nº 831, de 6 de dezembro de 2023 (altera o art. 14 da RDC 47/2009). Vigência a partir de 6 fev. 2024.
5. Anvisa. Resolução RDC nº 885, de 2024. Projeto-piloto de bula digital (publicada em julho de 2024); Consultas Dirigidas 4/2026 e 5/2026 para avaliação de resultado regulatório.
6. Anvisa. Resolução RDC nº 768, de 12 de dezembro de 2022. Regras para a rotulagem de medicamentos (arts. 3º, 5º, 17, 20, 23, 25 a 29, 35, 43, 95 e 104). Texto em lex.com.br (consulta out. 2026); Perguntas e Respostas RDC 768/2022, v.2, 2025.

7. Anvisa. Resolução RDC nº 16, de 2 de março de 2007, com redação da RDC nº 51, de 15 de agosto de 2007. Regulamento técnico para medicamentos genéricos (definições e itens 2.1 a 2.5 de dispensação), conforme transcrição do CRF-SP, Orientação Farmacêutica Intercambialidade de medicamentos, 2023.
8. Anvisa. Resolução RDC nº 58, de 10 de outubro de 2014. Intercambialidade de medicamentos similares com o medicamento de referência.
9. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 349, de 20 de janeiro de 2000. Competência do farmacêutico para intercambialidade e substituição genérica.
10. Brasil. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 (medicamento genérico).
11. Brasil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, art. 13. planalto.gov.br (consulta out. 2026).
12. Anvisa. VigiMed e Notivisa: páginas de notificação de eventos adversos e queixas técnicas em gov.br (consulta out. 2026); nota da Anvisa de 27/08/2025 sobre notificação por suspeita.
13. Anvisa. Instrução Normativa nº 285, de 7 de março de 2024, com redação da IN nº 404, de 10 de novembro de 2025 (LMIP).
14. Anvisa. Resolução RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021, e Instrução Normativa nº 360, de 23 de abril de 2025 (antimicrobianos).
15. Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, Anexo I, lista A2 e adendos (conforme módulo de controlados do SOS Farmácia Comercial).
16. Ministério da Saúde. Cartaz Manejo do paciente com diarreia. bvsms.saude.gov.br/bvs/cartazes/manejo_paciente_diarreia_cartaz.pdf (consulta out. 2026).
17. Bulas consultadas (bula do paciente com trechos da bula do profissional, texto reproduzido no portal Consulta Remédios, outubro de 2026; o Bulário Eletrônico da Anvisa não foi acessado diretamente): Tylenol® Bebê e Criança (Janssen-Cilag); paracetamol 750 mg genérico (Sanofi Medley); Novalgina® comprimido e solução oral (Sanofi Medley); Advil® 400 mg (PF Consumer Healthcare); Alivium® (Cosmed); Nisulid® (Aché); Cataflam®, Cataflam® gotas e Voltaren® (Novartis); Profenid® (Sanofi Medley); Flanax®, Naprosyn® e Aspirina® (Bayer); Miosan® (Apsen); Tramal® (Grünenthal); Tylex® (Cellera); Meticorten® (Organon); Predsim® (Cosmed); Prelone® e Decadron® (Aché).
18. Bulas consultadas (mesma origem): Claritin® (Bayer); Desalex® e Singulair® (Organon); Zyrtec® e Aerolin® (GlaxoSmithKline); Allegra® e Mucosolvan® (Sanofi Medley); Polaramine® (Cosmed); Symbicort® Spray (AstraZeneca); Fluimucil® (Zambon); Losec Mups® (Biopas); Pantozol® (Takeda); Vonau Flash® (Biolab); Zofran® (Novartis); Plasil® (Sanofi-Aventis); Digesan® (Eurofarma); Motilium® e Imosec® (Janssen-Cilag); Buscopan® (Cosmed); Luftal® (Reckitt Benckiser); Hidrafix® (Takeda); Lactulona® (Daiichi Sankyo); Dulcolax® (Sanofi Medley); Dramin® Capsgel (Cosmed); Nizoral® creme e Daktarin® gel oral (Janssen-Cilag); Vodol® (União Química); Gino-Canesten® (Bayer); Micostatin® creme vaginal (Takeda); nistatina suspensão oral genérico (Prati-Donaduzzi); Zovirax® creme (GlaxoSmithKline); Dermazine® (Cristália).
19. Bulas dos medicamentos do Bulário de bolso: texto reproduzido no portal Consulta Remédios (consultaremedios.com.br), consulta em outubro de 2026; fabricante indicado em cada item.
20. Anvisa. Instrução Normativa nº 360/2025 (lista de antimicrobianos da RDC 471/2021).
21. Anvisa. RDC nº 1.036/2026: Atualização nº 101 do Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344/1998.


Bula e embalagem

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 14



Da bula ao uso seguro

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 14



Bulário de bolso

Resumo para consulta rápida, montado a partir das bulas conferidas em outubro de 2026. A bula vigente do produto dispensado prevalece sobre este quadro.

Acetilcisteína (Fluimucil® (referência)). Mucolítico. *Isento de prescrição*

Apresentações: Granulado 600 mg; comprimido efervescente 200 e 600 mg; xarope 20 mg/mL (pediátrico) e 40 mg/mL (adulto)

Indicações: Secreção espessa em bronquite e outras doenças respiratórias; antídoto do paracetamol (uso hospitalar)

Adulto: 600 mg 1 vez ao dia, de preferência à noite, por 5 a 10 dias

Criança: 2 a 4 anos: 100 mg 2 a 3 vezes ao dia; acima de 4 anos: 100 mg 3 a 4 vezes ao dia (xarope 20 mg/mL)

Dose máxima: 600 mg/dia sem prescrição

Contraindicações: Menor de 2 anos; alergia aos componentes

Interações: Antitussígenos (acúmulo de secreção); antibiótico oral: separar 2 h; carvão ativado

Gestação e lactação: Preferível evitar na gestação

Conservação: 15 a 30 °C; xarope válido por 14 dias após aberto

No balcão: Dissolver o granulado em meio copo de água e tomar logo. Beber bastante líquido. Não associar a xarope para tosse seca.

Fonte: Bula do Fluimucil® (Zambon), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; IN 285/2024 (LMIP)

Aciclovir (creme) (Zovirax® creme (referência)). Antiviral tópico. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Creme 50 mg/g, bisnaga 10 g

Indicações: Herpes labial e genital

Adulto: 5 vezes ao dia, a cada 4 h acordado; pelo menos 4 dias (labial) ou 5 dias (genital)

Criança: Mesmo esquema (uso adulto e pediátrico)

Dose máxima: Se não cicatrizar, mais 5 dias; lesão após 10 dias: médico

Contraindicações: Alergia a aciclovir, valaciclovir ou propilenoglicol

Interações: Sem interações significativas

Gestação e lactação: Só se o benefício superar o risco

Conservação: Abaixo de 30 °C; não colocar na geladeira

No balcão: Começar no formigamento. Lavar as mãos antes e depois. Sem receita, a lista de isentos tem penciclovir creme.

Fonte: Bula do Zovirax® creme (GlaxoSmithKline), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Aciclovir (oral) (Zovirax® comprimido (referência)). Antiviral (análogo de nucleosídeo). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 200 mg (25); genéricos com 400 mg conforme o fabricante

Indicações: Herpes simples (tratamento, supressão e prevenção) e herpes-zóster

Adulto: Herpes simples: 200 mg 5 vezes ao dia (de 4/4 h, pulando a noite) por 5 dias. Supressão: 400 mg de 12/12 h. Zóster: 800 mg 5 vezes ao dia por 7 dias

Criança: Comprimido a partir de 6 anos; dose pediátrica conforme a bula do produto

Dose máxima: 4 g/dia (800 mg 5 vezes ao dia, no zóster)

Contraindicações: Alergia a aciclovir ou valaciclovir

Interações: Probenecida, cimetidina e micofenolato (aumentam níveis); ajustar dose em insuficiência renal e idosos

Gestação e lactação: Só se o benefício superar o risco. Lactação: passa ao leite; com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, na embalagem original

No balcão: Começar o quanto antes, de preferência ao primeiro formigamento. Beber água ao longo do dia, sobretudo idosos. Lesão perto do olho: encaminhar.

Fonte: Bula do Zovirax® comprimido (GlaxoSmithKline Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da IN 360/2025

Ácido acetilsalicílico (dose analgésica) (Aspirina® 500 mg (referência)). Analgésico, antitérmico e anti-inflamatório (salicilato). *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 500 mg

Indicações: Dor e febre em adultos

Adulto: 500 a 1000 mg a cada 4 a 8 h, após refeições, com bastante líquido

Criança: A partir de 12 anos: 500 mg a cada 4 a 8 h, até 3 comprimidos/dia

Dose máxima: 4 g/dia (8 comprimidos); até 3 a 5 dias sem médico

Contraindicações: Alergia a salicilatos; asma por AINE; úlcera; tendência a sangramento; insuficiência renal, hepática ou cardíaca grave; metotrexato 15 mg/semana ou mais; último trimestre de gestação

Interações: Anticoagulantes, antiagregantes, álcool, outros AINE, corticoide, metotrexato, valproato

Gestação e lactação: Contraindicado no último trimestre; evitar no restante sem orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da umidade

No balcão: Não usar na suspeita de dengue, gripe ou varicela em criança e adolescente (síndrome de Reye). Dose analgésica é diferente da dose antiplaquetária.

Fonte: Bula da Aspirina® 500 mg (Bayer), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Ácido acetilsalicílico 100 mg (antiagregante) (Aspirina® Prevent). Antiagregante plaquetário (inibidor da COX-1). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos gastrorresistentes 100 mg e 300 mg

Indicações: Prevenção secundária após infarto, AVC ou AIT; angina; prevenção de trombose após intervenção vascular; redução do risco de primeiro infarto conforme avaliação médica

Adulto: 100 a 300 mg 1 vez ao dia (redução de risco do primeiro infarto: 100 mg/dia). Tomar 30 minutos antes de uma refeição, com água, sem partir nem mastigar

Contraindicações: Alergia a salicilatos; asma induzida por AINE; úlcera gastrointestinal ativa; tendência a sangramento; insuficiência renal, hepática ou cardíaca grave; metotrexato a partir de 15 mg/semana; último trimestre da gestação. Não recomendado abaixo de 18 anos

Interações: Anticoagulantes, clopidogrel e outros antiagregantes: sangramento. AINE e ISRS: úlcera e sangramento digestivo. Álcool: lesão gástrica. Insulina e sulfonilureias: hipoglicemia. Metotrexato: toxicidade

Gestação e lactação: Evitar no 1º e 2º trimestres salvo necessidade; contraindicado no 3º trimestre

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da umidade; tirar do blíster só na hora de tomar

No balcão: Não partir nem mastigar o comprimido gastrorresistente no uso diário. Fezes escuras, vômito com sangue ou manchas roxas fáceis exigem avaliação médica. Avisar o dentista antes de extração

Fonte: Bula de Aspirina® Prevent (Bayer), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Ácido fólico (Endofolin® (Marjan)). Vitamina do complexo B (folato). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 2 mg (30) e 5 mg (30 ou 90); solução oral 0,2 mg/mL em produtos de notificação simplificada (isentos)

Indicações: Prevenção de defeitos do tubo neural; anemia megaloblástica por folato; prevenção da toxicidade do metotrexato; hiper-homocisteinemia

Adulto: Tubo neural: 5 mg/dia (ou 2 x 2 mg) desde antes da concepção até 12 semanas de gestação. Metotrexato: 5 mg 1 vez por semana ou 2 mg/dia

Dose máxima: 15 mg/dia (bula do Endofolin®)

Contraindicações: Anemia perniciosa sem diagnóstico excluído (mascara a falta de B12); hepatopatia grave com distúrbio de coagulação; menores de 14 anos (Endofolin®)

Interações: Fenitoína, fenobarbital e primidona (reduzem folato e o folato pode reduzir o efeito delas); metotrexato; pirimetamina; colestiramina, metformina e antiácidos reduzem a absorção

Gestação e lactação: Indicado na gestação com prescrição

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Na gestação, o ideal é começar antes de engravidar. Com metotrexato, seguir exatamente o dia e a dose de folato da receita.

Fonte: Bula do Endofolin® (Marjan) e de ácido fólico genérico, reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de abr. 2025 e 2023)

Ácido valproico (valproato) (Depakene®; também Depakote® (divalproato)). Anticonvulsivante de amplo espectro. *Controle especial · C1*

Apresentações: Depakene®: comprimidos revestidos de liberação entérica 300 mg e 500 mg (valproato de sódio); xarope 50 mg/mL, frasco 100 mL. Outras formas conforme o fabricante

Indicações: Epilepsia (crises generalizadas e parciais, ausência); outros usos conforme a bula de cada produto

Adulto: Epilepsia: 10 a 15 mg/kg/dia (ausência: 15 mg/kg/dia), aumentando 5 a 10 mg/kg por semana; pelo menos 2 tomadas por dia

Criança: Mesma dose por kg; Depakene® é contraindicado abaixo de 10 anos (outras marcas conforme a bula)

Dose máxima: 60 mg/kg/dia

Contraindicações: Doença ou disfunção hepática significativa; síndrome de Alpers-Huttenlocher; distúrbio do ciclo da ureia; porfiria; deficiência de carnitina; gestação, salvo sem alternativa

Interações: Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital e ritonavir: menos valproato. Carbapenêmicos: queda importante do nível. AAS: mais valproato. Lamotrigina: reduzir a dose dela. Anticoncepcional com estrogênio e dipirona: podem reduzir o nível

Gestação e lactação: Alto risco de malformação e de distúrbio do neurodesenvolvimento: em mulher fértil, só com programa de prevenção da gravidez. Amamentação conforme avaliação médica

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz (comprimido também da umidade)

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias; anticonvulsivante pode ser prescrito para até 6 meses. Engolir o comprimido inteiro. Mulher em idade fértil deve usar contracepção e não engravidar sem planejar com o médico

Fonte: Bula de Depakene® (Abbott), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Albendazol (Zentel® (referência)). Anti-helmíntico benzimidazólico. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido mastigável 400 mg (1); suspensão oral 40 mg/mL (frasco de 10 mL, dose única de 400 mg)

Indicações: Ascaridíase, ancilostomíase, tricuríase, enterobíase, estrongiloidíase, teníase, himenolepíase, giardíase (2 a 12 anos), larva migrans cutânea

Adulto: 400 mg dose única (ascaris, ancilostomo, tricúris, enteróbio); estrongiloides, tênia e H. nana: 400 mg/dia por 3 dias; larva migrans: 400 mg/dia por 1 a 3 dias

Criança: Acima de 2 anos: mesma dose do adulto; giardíase (2 a 12 anos): 400 mg/dia por 5 dias

Dose máxima: 400 mg/dia nas indicações usuais (opistorquíase: 400 mg de 12/12 h por 3 dias)

Contraindicações: Alergia a benzimidazólicos; gestação, suspeita de gestação ou plano de engravidar

Interações: Cimetidina, praziquantel e dexametasona aumentam níveis; ritonavir, fenitoína, carbamazepina e fenobarbital reduzem

Gestação e lactação: Contraindicado na gestação. Lactação: não usar, salvo benefício que justifique

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Pode mastigar o comprimido ou engolir com água, sem dieta especial. Na oxiuríase, orientar higiene das mãos, unhas curtas e tratamento dos moradores conforme o médico.

Fonte: Bula do Zentel® (GlaxoSmithKline Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da LMIP e da IN 360/2025

Alopurinol (Zyloric® (referência)). Inibidor da xantina oxidase (hipouricemiante). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 100 mg e 300 mg (30)

Indicações: Gota crônica e hiperuricemia; prevenção de cálculo de ácido úrico; hiperuricemia de quimioterapia

Adulto: Iniciar com 100 mg/dia e subir conforme o ácido úrico; leve: 100 a 200 mg/dia; moderada: 300 a 600 mg/dia; grave: 700 a 900 mg/dia; após refeição, com bastante líquido

Criança: Menores de 10 anos: 10 a 20 mg/kg/dia, máximo 400 mg/dia (uso raro: neoplasias e defeitos enzimáticos)

Dose máxima: 900 mg/dia (adulto); acima de 300 mg/dia, pode dividir as doses

Contraindicações: Hipersensibilidade ao alopurinol

Interações: Azatioprina e mercaptopurina (toxicidade grave), varfarina, amoxicilina e ampicilina (exantema), teofilina, ciclofosfamida; tiazídicos e IECA aumentam risco de hipersensibilidade

Gestação e lactação: Categoria C: só sem alternativa mais segura. Não usar na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Uso contínuo, mesmo sem dor. Beber cerca de 2 litros de água por dia. Erupção na pele ou febre: suspender e procurar o médico logo (bula).

Fonte: Bula do Zyloric® (Aspen Pharma), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025)

Alprazolam (Frontal®, Frontal® XR). Benzodiazepínico. *Controle especial · B1*

Apresentações: Comprimidos 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg e 2 mg; liberação lenta (XR) 0,5 mg, 1 mg e 2 mg

Indicações: Transtornos de ansiedade; transtorno do pânico

Adulto: Ansiedade: 0,25 a 0,5 mg 3 vezes ao dia; faixa 0,5 a 4 mg/dia. Pânico: 0,5 a 1 mg ao deitar ou 0,5 mg 3 vezes ao dia, com aumentos de no máximo 1 mg a cada 3 a 4 dias. Idoso: 0,25 mg 2 a 3 vezes ao dia

Dose máxima: Ansiedade 4 mg/dia; pânico até cerca de 10 mg/dia em casos selecionados

Contraindicações: Alergia a benzodiazepínicos; miastenia gravis; glaucoma agudo de ângulo estreito; menor de 18 anos

Interações: Opioides (inclusive tramadol): sedação profunda, parada respiratória e morte. Álcool e outros depressores. Cetoconazol, itraconazol, fluvoxamina, fluoxetina, macrolídeos, inibidores de protease: mais alprazolam

Gestação e lactação: Avisar o médico se engravidar. Não usar na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Notificação de Receita B (azul) com receita. Redução para parar deve ser lenta, em geral até 0,5 mg a cada 3 dias. Não usar com álcool nem com analgésico opioide

Fonte: Bula de Frontal® (Viatris), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 22/01/2026. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Ambroxol (Mucosolvan® (referência)). Mucolítico e expectorante. *Isento de prescrição*

Apresentações: Xarope adulto 6 mg/mL e pediátrico 3 mg/mL; gotas 7,5 mg/mL; cápsula de liberação prolongada 75 mg

Indicações: Secreção respiratória espessa

Adulto: 30 mg 3 vezes ao dia (4 mL das gotas) ou 75 mg (cápsula) 1 vez ao dia

Criança: 2 a 5 anos: 7,5 mg 3 vezes ao dia; 6 a 12 anos: 15 mg 3 vezes ao dia (ou 0,5 mg/kg 3 vezes ao dia)

Dose máxima: 90 mg/dia no adulto

Contraindicações: Alergia ao ambroxol; xarope: intolerância à frutose

Interações: Sem interações prejudiciais conhecidas

Gestação e lactação: Não recomendado no 1º trimestre nem na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C; gotas e xarope protegidos da luz

No balcão: Cápsula de 75 mg inteira, sem abrir. Gotas podem ir em inalação com soro fisiológico, conforme a bula.

Fonte: Bula do Mucosolvan® (Sanofi Medley), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Amitriptilina (Amytril®). Antidepressivo tricíclico. *Controle especial · C1*

Apresentações: Comprimidos revestidos 10 mg, 25 mg e 75 mg

Indicações: Depressão; enurese noturna

Adulto: Depressão ambulatorial: 75 mg/dia divididos ou 50 a 100 mg à noite, até 150 mg/dia; manutenção 50 a 100 mg/dia à noite. Idoso e adolescente: 10 a 50 mg/dia

Criança: Enurese: 6 a 10 anos, 10 a 20 mg ao deitar; a partir de 11 anos, 25 a 50 mg ao deitar. Depressão: só acima de 12 anos

Dose máxima: 150 mg/dia ambulatorial; até 300 mg/dia em internados

Contraindicações: Alergia ao fármaco; uso de IMAO; uso de cisaprida; infarto nos últimos 30 dias

Interações: Álcool, benzodiazepínicos e outros depressores: sedação. Anticolinérgicos: íleo paralítico. Tramadol e serotoninérgicos: síndrome serotoninérgica. Fluoxetina, paroxetina e outros inibidores do CYP2D6: nível maior. Topiramato: aumento do nível

Gestação e lactação: Na gestação só com orientação médica. Passa ao leite; escolher entre remédio e amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias, retida. Causa sonolência, boca seca e intestino preso; tomar à noite e evitar álcool. Guardar longe de crianças: superdose é grave

Fonte: Bula de Amytril® (Cristália), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Amoxicilina (Amoxil® (referência)). Penicilina (aminopenicilina). *Retenção de receita*

Apresentações: Cápsula 500 mg (15, 21 ou 30); pó para suspensão oral 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL (frasco de 150 mL)

Indicações: Infecções respiratórias (otite, sinusite, amigdalite, pneumonia), urinárias, de pele e partes moles; erradicação do H. pylori em esquema combinado

Adulto: 250 a 500 mg de 8/8 h; casos graves: 3 g de 12/12 h; H. pylori: 1 g de 12/12 h por 7 dias, com IBP e outro antimicrobiano

Criança: Abaixo de 40 kg: 20 a 50 mg/kg/dia divididos de 8/8 h

Dose máxima: Adulto: 6 g/dia. Criança: 150 mg/kg/dia

Contraindicações: Alergia a penicilinas; cautela com história de alergia a cefalosporinas. Suspensão: contém aspartamo (fenilcetonúria)

Interações: Varfarina (INR pode subir), metotrexato (toxicidade), alopurinol (exantema), probenecida; bula recomenda método adicional com pílula anticoncepcional

Gestação e lactação: Pode ser usada na gestação se o benefício justificar. Lactação: passa em quantidade mínima; compatível com orientação

Conservação: 15 a 30 °C, protegida da umidade. Suspensão reconstituída do Amoxil®: geladeira (2 a 8 °C) por 14 dias; genéricos e similares: conforme a bula do produto

No balcão: Tomar nos horários certos, de preferência às refeições, até o fim do tratamento. Diarreia intensa, manchas na pele ou inchaço no rosto: suspender e procurar atendimento.

Fonte: Bula do Amoxil® (GlaxoSmithKline Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Amoxicilina + clavulanato de potássio (Clavulin® e Clavulin® BD (referência)). Penicilina associada a inibidor de betalactamase. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 500 mg + 125 mg e 875 mg + 125 mg; pó para suspensão 250 mg + 62,5 mg/5 mL (100 mL), 200 mg + 28,5 mg/5 mL (70 mL) e 400 mg + 57 mg/5 mL (70 ou 140 mL)

Indicações: Otite, sinusite, infecções respiratórias baixas, urinárias, de pele e partes moles, mordeduras, quando há suspeita de bactéria produtora de betalactamase

Adulto: 875 mg + 125 mg de 12/12 h ou 500 mg + 125 mg de 8/8 h, no início da refeição; não passar de 14 dias sem reavaliação

Criança: Suspensão BD (acima de 2 meses): 25/3,6 a 45/6,4 mg/kg/dia de 12/12 h; infecções graves até 70/10 mg/kg/dia

Dose máxima: Criança: 70/10 mg/kg/dia (BD). Insuficiência renal grave (TFG abaixo de 30 mL/min): comprimido 875 mg não recomendado

Contraindicações: Alergia a betalactâmicos; icterícia ou disfunção hepática prévia associada ao produto ou a penicilinas

Interações: Varfarina e acenocumarol (sangramento), metotrexato, micofenolato, alopurinol, probenecida, dissulfiram; anticoncepcional oral citado na bula

Gestação e lactação: Evitar na gestação, sobretudo no 1º trimestre, salvo indicação médica. Lactação: pode ser usada (bula)

Conservação: Comprimido BD: 15 a 30 °C; após abrir o envelope, usar em 14 dias. Suspensão reconstituída: geladeira (2 a 8 °C) por 7 dias, depois descartar

No balcão: Tomar no começo da refeição para reduzir enjoo e diarreia. A suspensão escurece fora da geladeira; frasco com mais de 7 dias deve ser descartado.

Fonte: Bulas do Clavulin® e do Clavulin® BD (GlaxoSmithKline Brasil), reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Anlodipino (Norvasc®). Bloqueador dos canais de cálcio (di-hidropiridínico). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 5 mg e 10 mg (besilato de anlodipino)

Indicações: Hipertensão; angina estável e vasoespástica

Adulto: 5 mg 1 vez ao dia; pode subir para 10 mg 1 vez ao dia. Idoso e renal: dose habitual

Dose máxima: 10 mg/dia

Contraindicações: Alergia a di-hidropiridínicos ou a componente da fórmula

Interações: Sinvastatina: o anlodipino aumenta a exposição, rever a dose da estatina. Cetoconazol, itraconazol, claritromicina, ritonavir: mais efeito. Rifampicina e erva-de-são-joão: menos efeito. Toranja: não recomendada

Gestação e lactação: Segurança na gestação e na amamentação não estabelecida; só com orientação médica

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Tomar 1 vez ao dia, com ou sem comida. Inchaço (edema), em geral nas pernas, é efeito comum e deve ser relatado ao médico, sem suspender por conta própria

Fonte: Bula de Norvasc® (Viatris), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Apixabana (Eliquis®). Anticoagulante oral inibidor direto do fator Xa. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 2,5 mg e 5 mg

Indicações: Prevenção de AVC na fibrilação atrial não valvar; tratamento e prevenção de recorrência de TVP e embolia pulmonar; prevenção de TEV após artroplastia de quadril ou joelho

Adulto: Fibrilação atrial: 5 mg 2 vezes ao dia; 2,5 mg 2 vezes ao dia se 2 destes: 80 anos ou mais, peso até 60 kg, creatinina a partir de 1,5 mg/dL. TVP/TEP: 10 mg 2 vezes ao dia por 7 dias, depois 5 mg 2 vezes ao dia

Dose máxima: 20 mg/dia só na fase inicial de TVP/TEP; depois 10 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco; sangramento clinicamente relevante; doença hepática com coagulopatia. Não recomendada com depuração de creatinina abaixo de 15 mL/min ou diálise

Interações: Cetoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, ritonavir: não recomendado. Rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, erva-de-são-joão: menos efeito. AAS, AINE e outros anticoagulantes: sangramento

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação. Na amamentação, o médico decide entre suspender o remédio ou a amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Tomar de 12 em 12 horas, com ou sem comida; esqueceu, toma assim que lembrar e segue o horário. Não usar anti-inflamatório por conta própria. Suspensão antes de cirurgia só com orientação médica

Fonte: Bula de Eliquis® (Pfizer), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Atenolol (Atenol®). Betabloqueador cardiosseletivo (beta-1). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações: Hipertensão; angina; arritmias; prevenção após infarto

Adulto: Hipertensão: 50 a 100 mg 1 vez ao dia (efeito pleno em 1 a 2 semanas). Angina: 100 mg 1 vez ao dia ou 50 mg 2 vezes ao dia. Insuficiência renal: reduzir (depuração 15 a 35 mL/min: 50 mg/dia; abaixo de 15: 25 mg/dia)

Dose máxima: 100 mg/dia (sem benefício adicional acima disso na angina)

Contraindicações: Bradicardia; bloqueio AV de 2º ou 3º grau; doença do nó sinusal; choque cardiogênico; hipotensão; insuficiência cardíaca descompensada; doença arterial periférica grave; feocromocitoma não tratado; acidose metabólica

Interações: Verapamil e diltiazem: bradicardia e hipotensão. Clonidina: rebote ao suspender (o betabloqueador sai antes). Amiodarona e digoxina: condução lenta. AINE (ibuprofeno): menos efeito. Adrenalina: efeito contrário

Gestação e lactação: Usar na gestação e na amamentação só com orientação médica

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Não interromper de repente: a suspensão brusca pode piorar angina. O comprimido de 25 mg não deve ser partido. Diabético deve saber que o remédio pode mascarar sinais de hipoglicemia

Fonte: Bula de Atenol® (AstraZeneca), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 17/04/2024

Atorvastatina (Lípitor®). Estatina (inibidor da HMG-CoA redutase). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 10 mg, 20 mg, 40 mg e 80 mg

Indicações: Hipercolesterolemia e dislipidemia mista; prevenção de eventos cardiovasculares

Adulto: 10 a 80 mg 1 vez ao dia, a qualquer hora, com ou sem alimento. Reavaliar lipídeos 2 a 4 semanas após ajuste

Criança: A partir de 10 anos (comprimidos de 10 mg e 20 mg), conforme a bula do produto

Dose máxima: 80 mg/dia; 10 mg/dia se usado com ciclosporina, telaprevir, tipranavir/ritonavir ou glecaprevir/pibrentasvir

Contraindicações: Doença hepática ativa ou transaminases persistentemente acima de 3 vezes o normal; gestação, amamentação e mulher fértil sem contracepção; menor de 10 anos

Interações: Ciclosporina, claritromicina, inibidores de protease, itraconazol e genfibrozila: risco de miopatia. Álcool em excesso: risco hepático

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação e na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Pode ser tomada em qualquer horário, sempre o mesmo. Dor muscular inexplicada, sobretudo com febre ou mal-estar, deve ser comunicada ao médico

Fonte: Bula de Lípitor® (Viatris), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Azitromicina (Zitromax® (referência); Azi® suspensão (similar equivalente)). Macrolídeo (azalida). *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 500 mg (2 ou 3); pó para suspensão oral 200 mg/5 mL (frascos de 600, 900 e 1.500 mg)

Indicações: Infecções respiratórias, otite, pele e partes moles; uretrite e cervicite por clamídia; cancro mole

Adulto: 500 mg 1 vez ao dia por 3 dias (total 1,5 g); clamídia, cancro mole e gonococo sensível: 1 g em dose única

Criança: 10 mg/kg 1 vez ao dia por 3 dias (total 30 mg/kg); comprimido só acima de 45 kg

Dose máxima: 500 mg/dia nos esquemas de 3 dias; total de 1.500 mg por tratamento em crianças

Contraindicações: Alergia a azitromicina, eritromicina, outros macrolídeos ou cetolídeos

Interações: Não tomar junto com antiácidos nem com derivados do ergô; monitorar digoxina, colchicina, varfarina e ciclosporina; cautela com outros fármacos que prolongam o QT

Gestação e lactação: Só com orientação médica; há dados limitados de maior risco de aborto no início da gestação. Lactação: só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade. Suspensão reconstituída (Azi®): temperatura ambiente por até 5 dias; outras marcas: conforme a bula

No balcão: Uma vez ao dia, sempre no mesmo horário, com ou sem alimento. Separar de antiácido. O efeito continua dias depois da última dose: não repetir a caixa por conta própria.

Fonte: Bula do Zitromax® (Pfizer Brasil) e do Azi® suspensão (EMS Sigma Pharma), reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Bisacodil (Dulcolax® (referência)). Laxante estimulante. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido revestido 5 mg

Indicações: Constipação intestinal; preparo para exames

Adulto: 5 a 10 mg à noite

Criança: Acima de 10 anos: 5 a 10 mg; 4 a 10 anos: 5 mg

Dose máxima: 10 mg/dia

Contraindicações: Íleo, obstrução, abdome agudo, dor abdominal grave com vômitos, desidratação intensa; intolerância a galactose ou frutose

Interações: Leite, antiácidos e IBP dissolvem o revestimento; diuréticos e corticoides (perda de potássio)

Gestação e lactação: Só com recomendação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Engolir inteiro à noite, longe de leite, antiácido e omeprazol. Uso diário prolongado: médico.

Fonte: Bula do Dulcolax® (Sanofi Medley), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Bromoprida (Digesan® (referência)). Antiemético e procinético (antagonista dopaminérgico). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Cápsula 10 mg; gotas pediátricas 4 mg/mL (24 gotas/mL)

Indicações: Náusea, vômito, refluxo e distúrbios de motilidade

Adulto: 10 mg a cada 8 ou 12 h

Criança: A partir de 1 ano: 1 a 2 gotas/kg 3 vezes ao dia

Dose máxima: 60 mg/dia

Contraindicações: Hemorragia, obstrução ou perfuração digestiva; epilepsia; fármacos extrapiramidais; feocromocitoma

Interações: Anticolinérgicos e opioides (antagonizam); sedativos e álcool

Gestação e lactação: Sem estudos adequados; só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Mesmo cuidado da metoclopramida com movimentos involuntários. Na doença renal, começar com metade da dose.

Fonte: Bula do Digesan® (Eurofarma), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Budesonida + formoterol (Symbicort® (referência)). Corticoide inalatório + beta-2 agonista de longa ação. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Spray (aerossol) 6/100 e 6/200 mcg por inalação, 120 doses; pó inalante (Turbuhaler) conforme a bula do produto

Indicações: Asma e DPOC (6/200)

Adulto: Asma: 2 inalações 1 ou 2 vezes ao dia; DPOC: 2 inalações (6/200) 2 vezes ao dia

Criança: Spray 6/100 de 6 a 11 anos: 2 inalações 2 vezes ao dia

Dose máxima: Asma no adulto: até 4 inalações 2 vezes ao dia por tempo limitado; DPOC e criança: 4 inalações/dia

Contraindicações: Alergia aos componentes

Interações: Betabloqueadores; inibidores de CYP3A4 (cetoconazol, suco de grapefruit); antiarrítmicos; tricíclicos; IMAO

Gestação e lactação: Só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, bocal para baixo; usar até 3 meses após abrir o invólucro

No balcão: Enxaguar a boca após o uso (candidíase oral). Uso diário de manutenção: não parar quando melhorar.

Fonte: Bula do Symbicort® Spray (AstraZeneca), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Butilbrometo de escopolamina (Buscopan® (referência)). Antiespasmódico antimuscarínico. *Isento de prescrição*

Apresentações: Drágea 10 mg; gotas 10 mg/mL (20 gotas/mL)

Indicações: Cólica abdominal, intestinal, biliar e urinária

Adulto: 10 a 20 mg 3 a 5 vezes ao dia

Criança: Lactente: 5 mg (10 gotas) 3 vezes ao dia; 1 a 6 anos: 0,3 a 0,5 mg/kg/dose 3 vezes ao dia; drágea acima de 6 anos

Dose máxima: 100 mg/dia no adulto

Contraindicações: Miastenia gravis; obstrução ou estenose intestinal; íleo; megacólon; criança com diarreia; idoso sensível a antimuscarínicos

Interações: Tricíclicos, anti-histamínicos, antipsicóticos e outros anticolinérgicos; metoclopramida; beta-agonistas (taquicardia)

Gestação e lactação: Evitar na gestação e na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Dor abdominal persistente, febre ou vômitos: médico. Não usar de forma contínua sem investigar a causa.

Fonte: Bula do Buscopan® (Cosmed/Brainfarma), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Captopril (Capoten®). Inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 25 mg e 50 mg

Indicações: Hipertensão; insuficiência cardíaca; disfunção ventricular após infarto; nefropatia diabética

Adulto: Hipertensão: 25 mg 2 vezes ao dia ou 50 mg 1 vez ao dia; pode subir para 50 mg 2 vezes ao dia. Na hipertensão a dose costuma não passar de 150 mg/dia. Tomar 1 hora antes das refeições

Dose máxima: 450 mg/dia (teto da bula)

Contraindicações: Alergia ao captopril ou a outro IECA

Interações: Suplemento de potássio, sal light, diurético poupador de potássio: hipercalemia. AINE (inclusive AAS): menos efeito e risco renal em idosos desidratados. Lítio: toxicidade

Gestação e lactação: Contraindicado na gestação (lesão e morte fetal); suspender assim que a gravidez for detectada. Na amamentação, suspender o remédio ou a amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da umidade. Leve cheiro de enxofre é normal

No balcão: Tomar com o estômago vazio, 1 hora antes das refeições. Tosse seca e inchaço no rosto devem ser comunicados ao médico; inchaço na garganta é urgência

Fonte: Bula de Capoten® (Bristol-Myers Squibb), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 21/05/2024

Carbamazepina (Tegretol®, Tegretol® CR). Anticonvulsivante (bloqueador de canais de sódio). *Controle especial · C1*

Apresentações: Comprimidos 200 mg e 400 mg; liberação prolongada (CR) 200 mg e 400 mg; suspensão oral 20 mg/mL, frasco 100 mL

Indicações: Epilepsia; neuralgia do trigêmeo e glossofaríngea; mania e prevenção no transtorno bipolar

Adulto: Epilepsia: 100 a 200 mg 1 a 2 vezes ao dia, subindo até 800 a 1.200 mg/dia em 2 a 3 tomadas. Neuralgia do trigêmeo: 200 a 400 mg/dia, até a dor ceder (usual 200 mg 3 a 4 vezes ao dia). Bipolar: 400 a 600 mg/dia

Criança: Início 100 a 200 mg/dia (base 10 a 20 mg/kg/dia), manutenção 400 a 600 mg/dia; adolescente 600 a 1.000 mg/dia. Suspensão contraindicada abaixo de 4 semanas de vida

Dose máxima: Epilepsia: 1.600 a 2.000 mg/dia em alguns casos; neuralgia: 1.200 mg/dia

Contraindicações: Alergia; doença cardíaca grave (bloqueio AV); doença grave do sangue prévia; porfiria hepática; uso de IMAO

Interações: Indutor enzimático: reduz anticoncepcional hormonal (usar método não hormonal), varfarina e muitos outros. Claritromicina, fluconazol e toranja: mais carbamazepina. Álcool: evitar

Gestação e lactação: Risco de malformação; não suspender por conta própria, planejar com o médico. Avaliar com o médico na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C. Comprimido CR partido ao meio vale 7 dias

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias; anticonvulsivante pode ser prescrito para até 6 meses. Tomar durante ou após as refeições. Febre, dor de garganta, manchas ou bolhas na pele exigem procurar o médico logo

Fonte: Bula de Tegretol® (Novartis), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 30/05/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Carvedilol (Cardilol®). Betabloqueador não seletivo com bloqueio alfa-1. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg e 25 mg

Indicações: Hipertensão; angina; insuficiência cardíaca crônica

Adulto: Hipertensão: 12,5 mg 1 vez ao dia por 2 dias, depois 25 mg 1 vez ao dia; até 50 mg/dia. Insuficiência cardíaca: 3,125 mg 2 vezes ao dia por 2 semanas, dobrando a cada 2 semanas até a dose tolerada

Dose máxima: Hipertensão 50 mg/dia; angina 100 mg/dia; insuficiência cardíaca 25 mg 2 vezes ao dia (50 mg 2 vezes ao dia se acima de 85 kg)

Contraindicações: Insuficiência cardíaca descompensada com inotrópico venoso; insuficiência hepática; asma ou DPOC com broncoespasmo; bloqueio AV de 2º ou 3º grau sem marca-passo; frequência abaixo de 50 bpm; doença do nó sinusal; choque; pressão sistólica abaixo de 85 mmHg

Interações: Digoxina e ciclosporina: níveis aumentados. Amiodarona, fluoxetina e paroxetina: mais carvedilol. Rifampicina: menos efeito. Verapamil e diltiazem: bradicardia. Insulina e antidiabéticos: mascara hipoglicemia

Gestação e lactação: Na gestação só se o benefício justificar. Amamentação não recomendada

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Na insuficiência cardíaca a dose sobe devagar; piora do inchaço ou falta de ar deve ser comunicada ao médico. Não parar de repente

Fonte: Bula de Cardilol® (Libbs), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Cefadroxila (Cefamox® (referência)). Cefalosporina de 1ª geração. *Retenção de receita*

Apresentações: Cápsula 500 mg (8); pó para suspensão oral 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL (100 mL)

Indicações: Infecções de pele e partes moles, faringoamigdalite estreptocócica, infecções urinárias

Adulto: 1 a 2 g/dia divididos de 12/12 h; em algumas infecções, 1 a 2 g em dose única diária

Criança: 25 a 50 mg/kg/dia divididos de 12/12 h

Dose máxima: 2 g/dia (adulto). Insuficiência renal: 1 g de ataque e 500 mg em intervalo de 12 a 36 h conforme a depuração

Contraindicações: Alergia a cefalosporinas; cautela em alérgicos à penicilina e em história de colite. Suspensão contém açúcar

Interações: A bula não destaca interação medicamentosa específica; desaconselha álcool durante o tratamento

Gestação e lactação: Só se claramente necessário, com orientação médica. Lactação: passa ao leite; usar com cautela

Conservação: 15 a 30 °C, local seco. Suspensão reconstituída: 10 dias em temperatura ambiente ou 14 dias na geladeira (2 a 8 °C); pode amarelar sem perder qualidade

No balcão: Pode ser tomada com alimento para reduzir enjoo. Agitar a suspensão antes de cada dose e usar o dosador da embalagem.

Fonte: Bula do Cefamox® (Bristol-Myers Squibb Farmacêutica), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de maio 2024); IN 360/2025, art. 1º

Cefalexina (Keflex® (referência)). Cefalosporina de 1ª geração. *Retenção de receita*

Apresentações: Drágea 500 mg e 1 g; pó para suspensão gotas 100 mg/mL (15 ou 30 mL); suspensão oral pronta 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL (100 mL)

Indicações: Infecções de pele e partes moles, faringite estreptocócica, cistite, infecções respiratórias, otite, ósseas

Adulto: Usual 250 mg de 6/6 h; faixa de 1 a 4 g/dia. Faringite, pele e cistite (acima de 15 anos): 500 mg a 1 g de 12/12 h; cistite por 7 a 14 dias

Criança: 25 a 50 mg/kg/dia em doses divididas (de 12/12 h em faringite, pele e ITU leve); otite: 75 a 100 mg/kg/dia em 4 doses

Dose máxima: 4 g/dia por via oral; acima disso, a bula orienta cefalosporina injetável

Contraindicações: Alergia a cefalosporinas; cautela em alérgicos à penicilina. Gotas: contém tartrazina; gotas e suspensão: contêm açúcar

Interações: Probenecida (aumenta níveis); metformina (interação descrita na bula); falso positivo de glicosúria com Benedict ou Fehling

Gestação e lactação: Categoria B: só com orientação médica. Lactação: conforme a bula do produto

Conservação: 15 a 30 °C, ao abrigo da luz. Gotas após o preparo: geladeira (2 a 8 °C) por até 14 dias. Suspensão pronta: temperatura ambiente, frasco bem tampado

No balcão: Pode ser tomada com ou sem alimento. Confirmar o horário de 6/6 h ou 12/12 h da receita; não espaçar por conta própria.

Fonte: Bula do Keflex® (Laboratórios Bagó do Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de jan. 2026); IN 360/2025, art. 1º

Cefuroxima (Zinnat® (referência)). Cefalosporina de 2ª geração (axetilcefuroxima). *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 250 mg (10 ou 14) e 500 mg (10, 14 ou 20); pó para suspensão 250 mg/5 mL (50 ou 70 mL)

Indicações: Amigdalite, faringite, sinusite, otite, pneumonia, exacerbação de DPOC, ITU, pielonefrite, pele e partes moles

Adulto: 250 mg de 12/12 h após as refeições; pneumonia: 500 mg de 12/12 h; ITU: 125 mg de 12/12 h. Duração usual de 7 dias

Criança: Suspensão (acima de 3 meses): 10 mg/kg de 12/12 h, máximo 500 mg/dia; comprimido (2 anos ou mais) em otite e pneumonia: 15 mg/kg de 12/12 h

Dose máxima: Adulto: 1 g/dia nas indicações da bula. Criança: 500 mg/dia nas indicações citadas

Contraindicações: Alergia a cefalosporinas; alergia grave (anafilaxia) a qualquer betalactâmico

Interações: Antiácidos e redutores de acidez diminuem a absorção; probenecida não recomendada; anticoagulante oral (INR pode subir); anticoncepcional citado na bula

Gestação e lactação: Dados limitados; só se o benefício superar o risco. Lactação: pequena passagem ao leite; observar diarreia no bebê

Conservação: 15 a 30 °C. Suspensão reconstituída: refrigerar logo após o preparo (2 a 8 °C) por até 10 dias; não congelar

No balcão: Tomar após a refeição, que melhora a absorção. Não partir nem triturar o comprimido; criança que não engole deve usar a suspensão.

Fonte: Bula do Zinnat® (GlaxoSmithKline Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º (cefuroxima e axetilcefuroxima)

Cetirizina (Zyrtec® (referência)). Anti-histamínico H1 de segunda geração. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 10 mg; solução oral 1 mg/mL

Indicações: Rinite alérgica e urticária

Adulto: 10 mg 1 vez ao dia

Criança: 2 a 6 anos: 2,5 mg 2 vezes ao dia; 6 a 12 anos: 5 mg 2 vezes ao dia

Dose máxima: 10 mg/dia

Contraindicações: Alergia a cetirizina, hidroxizina ou piperazínicos; insuficiência renal grave

Interações: Álcool e depressores do SNC (sonolência adicional)

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação nem na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Pode dar sonolência maior que a loratadina. Ajuste na doença renal. Levocetirizina e cetirizina são produtos diferentes no balcão.

Fonte: Bula do Zyrtec® (GlaxoSmithKline), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Cetoconazol (tópico) (Nizoral® creme (referência)). Antifúngico imidazólico tópico. *Isento de prescrição*

Apresentações: Creme 20 mg/g, bisnaga 30 g; xampu 20 mg/mL. Comprimido: venda sob prescrição

Indicações: Micoses de pele (tinhas, candidíase cutânea, pitiríase versicolor); xampu na dermatite seborreica

Adulto: Creme 1 vez ao dia, por cerca de 4 semanas e alguns dias após sumirem as lesões

Criança: Uso adulto e pediátrico pela bula do creme

Dose máxima: Não se aplica (uso tópico)

Contraindicações: Alergia ao cetoconazol ou excipientes

Interações: Sem interações descritas para o creme

Gestação e lactação: Sem riscos conhecidos no uso tópico; informar o médico

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Lavar e secar bem a pele, aplicar na lesão e ao redor, lavar as mãos. Toalha e roupas separadas.

Fonte: Bula do Nizoral® creme (Janssen-Cilag), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Cetoprofeno (Profenid® (referência)). AINE (derivado do ácido propiônico). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Cápsula 50 mg; comprimido entérico 100 mg; comprimido retard 200 mg; gotas 20 mg/mL; injetável 100 mg/2 mL

Indicações: Dor e inflamação musculoesquelética e reumática

Adulto: Cápsula: 100 mg 2 vezes ao dia ou 50 mg 3 vezes ao dia; entérico: 200 mg/dia em 2 tomadas; durante ou após refeições

Criança: Gotas a partir de 1 ano: conforme a bula do produto

Dose máxima: 300 mg/dia

Contraindicações: Alergia a AINE ou AAS; úlcera péptica ou sangramento; insuficiência cardíaca, hepática ou renal grave; após 6 meses de gestação

Interações: Outros AINE, salicilatos em dose alta, álcool, anticoagulantes, antiagregantes

Gestação e lactação: Não usar após o 6º mês; evitar antes sem orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Engolir sem mastigar, com meio a um copo de líquido, junto da refeição. Retard e entérico não podem ser partidos.

Fonte: Bula do Profenid® (Sanofi Medley), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Cianocobalamina (Injetáveis de 1.000 e 5.000 mcg; associações orais e injetáveis com B1 e B6). Vitamina B12. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Solução injetável 1.000 mcg e 5.000 mcg (IM); oral isolada pouco disponível, em geral associada a B1 e B6

Indicações: Deficiência de vitamina B12 (anemia megaloblástica, anemia perniciosa, má absorção, dieta vegana, pós-bariátrica)

Adulto: Ataque sem sintoma neurológico: 1.000 mcg IM 3 vezes por semana por 2 semanas, ou 1.000 mcg/dia por via oral. Manutenção: 1.000 mcg IM ao mês ou 1.000 mcg/dia oral (TelessaúdeRS)

Criança: Não há formulação IM autorizada para crianças no Brasil; tratamento oral conforme orientação especializada

Dose máxima: Não fixada; a apresentação de 5.000 mcg IM pode substituir a de 1.000 mcg sem risco de superdose (TelessaúdeRS)

Contraindicações: Alergia a cobalaminas; demais conforme a bula do produto

Interações: Metformina, IBP, antagonistas H2 e anticonvulsivantes são causas de deficiência por uso prolongado; investigar B12 antes de iniciar folato isolado

Gestação e lactação: Deficiência na gestação deve ser tratada logo; via IM preferida (TelessaúdeRS)

Conservação: Conforme a bula do produto

No balcão: Aplicação IM por profissional, em local autorizado. Quem usa metformina ou omeprazol há anos e tem formigamento ou cansaço deve ser encaminhado para dosar B12.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS. Como deve ser feita a reposição de vitamina B12? (atualizado em 2023). Bula de referência brasileira não consultada

---

Ciclobenzaprina (Miosan® (referência)). Relaxante muscular de ação central. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido revestido 5 e 10 mg

Indicações: Espasmo muscular associado a dor aguda musculoesquelética

Adulto: 20 a 40 mg/dia em 2 a 4 tomadas (a cada 12 ou 6 h)

Criança: Uso adulto

Dose máxima: 60 mg/dia; mais de 2 a 3 semanas só com acompanhamento médico

Contraindicações: Glaucoma, retenção urinária, pós-infarto, arritmia, bloqueio de condução, insuficiência cardíaca, hipertireoidismo; IMAO há menos de 14 dias

Interações: Álcool e depressores do SNC; IMAO; ISRS, tricíclicos, tramadol, bupropiona (síndrome serotoninérgica); anticolinérgicos

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação; amamentação só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Causa sonolência e boca seca: evitar álcool e direção. Não partir nem mastigar o comprimido de 10 mg.

Fonte: Bula do Miosan® (Apsen), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Ciprofloxacino (Cipro® (referência)). Fluoroquinolona. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 500 mg (6 ou 14); genéricos com 250 e 750 mg conforme o fabricante

Indicações: Infecções urinárias, respiratórias (conforme o microrganismo), gonorreia, diarreia bacteriana, osteoarticulares, intra-abdominais

Adulto: 250 a 750 mg de 12/12 h conforme a indicação; cistite não complicada: 250 mg 1 a 2 vezes ao dia; diarreia: 500 mg 1 a 2 vezes ao dia

Criança: Uso restrito na bula (fibrose cística dos 5 aos 17 anos, antraz); não é antibiótico de rotina em pediatria

Dose máxima: 1,5 g/dia (750 mg de 12/12 h)

Contraindicações: Alergia a quinolonas; uso com tizanidina

Interações: Antiácidos, ferro, cálcio, magnésio, zinco e sucralfato: tomar 1 a 2 h antes ou 4 h depois; não tomar só com leite, iogurte ou suco enriquecido com cálcio; teofilina; varfarina; fármacos que prolongam o QT

Gestação e lactação: Não recomendado na gestação nem na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Não tomar com leite, iogurte ou suplemento de cálcio e ferro no mesmo horário. Dor ou inchaço em tendão (calcanhar): parar e procurar o médico.

Fonte: Bula do Cipro® (Bayer S.A.), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Claritromicina (Klaricid® e Klaricid® UD (referência)). Macrolídeo. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 250 e 500 mg; comprimido de liberação prolongada (UD) 500 mg; grânulos para suspensão 25 mg/mL e 50 mg/mL (60 mL)

Indicações: Infecções respiratórias, de pele e partes moles; erradicação do H. pylori em esquema combinado; micobactérias atípicas

Adulto: Liberação imediata: 250 a 500 mg de 12/12 h. Liberação prolongada: 500 mg 1 vez ao dia com alimento; graves, 1 g 1 vez ao dia

Criança: 6 meses a 12 anos: 7,5 mg/kg de 12/12 h por 5 a 10 dias

Dose máxima: 1 g/dia (500 mg de 12/12 h). Criança: 500 mg por dose

Contraindicações: Alergia a macrolídeos; QT longo ou arritmia ventricular; hipocalemia ou hipomagnesemia; insuficiência hepática grave com renal; menores de 6 meses. UD: contraindicada com depuração de creatinina abaixo de 30 mL/min

Interações: Contraindicada com sinvastatina, lovastatina, colchicina, ergotamina, midazolam oral, cisaprida, pimozida, ticagrelor, ranolazina e lomitapida; muitas outras por inibição do CYP3A4

Gestação e lactação: Usar só se o benefício justificar, com orientação médica. Lactação: passa ao leite em pequena quantidade; segurança não estabelecida

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz. Suspensão reconstituída: temperatura ambiente, sem geladeira, por até 14 dias

No balcão: Perguntar sempre por estatina, colchicina e remédios do coração antes de dispensar. Gosto amargo na boca é comum; a suspensão não vai à geladeira.

Fonte: Bulas do Klaricid® suspensão (Abbott Brasil) e de claritromicina comprimido, reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de 2022 e abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Clonazepam (Rivotril®). Benzodiazepínico. *Controle especial · B1*

Apresentações: Comprimidos 0,5 mg e 2 mg; comprimidos sublinguais 0,25 mg; solução oral 2,5 mg/mL, frasco 20 mL (1 gota = 0,1 mg)

Indicações: Epilepsia; transtorno do pânico; ansiedade; fobia social; adjuvante em transtornos do humor; outros usos da bula

Adulto: Pânico: 0,5 mg/dia em 2 tomadas, ajustada pelo médico. Ansiedade em geral: 0,5 a 1,5 mg/dia em 3 tomadas. Epilepsia: início até 1,5 mg/dia em 3 tomadas

Criança: Epilepsia até 10 anos ou 30 kg: 0,01 a 0,03 mg/kg/dia, até 0,05 mg/kg/dia, em 2 a 3 tomadas. 10 a 16 anos: início 1 a 1,5 mg/dia; usual 3 a 6 mg/dia

Dose máxima: Epilepsia: 20 mg/dia

Contraindicações: Alergia a benzodiazepínico; insuficiência respiratória grave; insuficiência hepática grave; glaucoma agudo de ângulo fechado; pânico com apneia do sono

Interações: Álcool, opioides, antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes e hipnóticos: sedação e depressão respiratória. Toranja: mais efeito

Gestação e lactação: Só com indicação absoluta; altas doses no fim da gestação afetam o recém-nascido. Suspender a amamentação se o uso for necessário

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C; solução oral protegida do calor

No balcão: Notificação de Receita B (azul) com receita; até 60 dias de tratamento por notificação. Não beber álcool nem dirigir se sonolento. Não parar de repente: a retirada é gradual com o médico

Fonte: Bula de Rivotril® (Roche, registro Blanver), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Clopidogrel (Plavix®). Antiagregante plaquetário (inibidor do receptor P2Y12). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 75 mg

Indicações: Prevenção de eventos aterotrombóticos após infarto, AVC isquêmico ou doença arterial periférica; síndrome coronariana aguda (com AAS); fibrilação atrial em casos selecionados (com AAS)

Adulto: 75 mg 1 vez ao dia. Síndrome coronariana aguda sem supra de ST: ataque de 300 mg e depois 75 mg/dia, junto com AAS

Contraindicações: Alergia ao fármaco; úlcera péptica ou sangramento ativo; hemorragia intracraniana

Interações: Omeprazol e esomeprazol: reduzem a ativação do clopidogrel (desaconselhado; a bula sugere pantoprazol). Varfarina, AAS, AINE e heparinas: sangramento

Gestação e lactação: Na gestação só se claramente necessário. Na amamentação, o médico decide entre suspender o remédio ou a amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da umidade

No balcão: Não suspender sem falar com o cardiologista, principalmente quem tem stent. Cliente que pede omeprazol junto deve ser orientado a conversar com o médico

Fonte: Bula de Plavix® (Sanofi Medley), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Clortalidona (Higroton®). Diurético tiazídico-símile. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 12,5 mg, 25 mg e 50 mg

Indicações: Hipertensão; insuficiência cardíaca; edema; prevenção de cálculo de oxalato de cálcio com hipercalciúria

Adulto: Hipertensão: 12,5 a 25 mg 1 vez ao dia (faixa usual 12,5 a 50 mg); efeito máximo em 3 a 4 semanas. Insuficiência cardíaca: 25 a 50 mg/dia, até 200 mg/dia

Dose máxima: Hipertensão: 50 mg/dia; insuficiência cardíaca: 200 mg/dia

Contraindicações: Alergia à clortalidona ou a sulfonamidas; anúria; doença hepática grave; gota; potássio ou sódio muito baixos; cálcio alto; gestante hipertensa

Interações: Lítio: toxicidade. Corticoides e anfotericina: hipocalemia. AINE e salicilatos: menos efeito. Outros anti-hipertensivos: efeito somado. Digitálicos: arritmia se o potássio cair

Gestação e lactação: Não usar na gestação nem na amamentação (passa ao leite)

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Tomar de manhã, junto de uma refeição. Dieta com frutas e verduras ajuda a repor potássio; restrição rigorosa de sal não é aconselhada pela bula

Fonte: Bula de Higroton® (Novartis), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 21/05/2024

Clotrimazol (vaginal) (Gino-Canesten® (referência)). Antifúngico imidazólico vaginal. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido e cápsula vaginal 500 mg; creme vaginal 10 mg/g (50 mg/5 g) e 20 mg/g (100 mg/5 g)

Indicações: Candidíase vulvovaginal

Adulto: 500 mg dose única à noite; creme 1%: 6 noites; creme 2%: 3 noites

Criança: Uso adulto

Dose máxima: Dose única (500 mg)

Contraindicações: Alergia ao clotrimazol ou ao álcool cetoestearílico (creme)

Interações: Tacrolimo e sirolimo (aumento de nível)

Gestação e lactação: Só com prescrição; na gestação, inserir sem aplicador

Conservação: 15 a 30 °C; comprimido protegido da umidade

No balcão: Aplicar deitada, ao deitar. Primeiro episódio, gestante, menor de idade ou sinais de outra infecção: médico.

Fonte: Bula do Gino-Canesten® (Bayer), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Colchicina (Colchis® (Apsen)). Antigotoso (alcaloide). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 0,5 mg (20 ou 30) e 1 mg (30)

Indicações: Crise aguda de gota e prevenção de crises; doença de Peyronie

Adulto: Prevenção: 0,5 mg 1 a 3 vezes ao dia. Crise, pela bula: 0,5 a 1,5 mg e depois 0,5 mg a cada 1 a 2 h até alívio, total habitual até 4 mg. Diretriz EULAR 2016 prefere dose baixa: 1 mg e 0,5 mg após 1 h no 1º dia

Dose máxima: Bula: abaixo de 7 mg/dia; margem de segurança estreita, reduzir ao surgir diarreia, náusea ou vômito

Contraindicações: Alergia; doença gastrointestinal, hepática, renal ou cardíaca grave; gestação

Interações: Claritromicina, eritromicina, cetoconazol, itraconazol, ritonavir, ciclosporina, verapamil, diltiazem e suco de toranja (toxicidade fatal relatada); estatinas (rabdomiólise)

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação. Lactação: conforme a bula do produto

Conservação: 15 a 30 °C, protegida da luz e da umidade

No balcão: Diarreia é o primeiro sinal de excesso: parar e avisar o médico. Perguntar por antibiótico macrolídeo ou antifúngico em uso antes de dispensar.

Fonte: Bula do Colchis® (Apsen Farmacêutica), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); EULAR, recomendações para gota, 2016

Colecalciferol (vitamina D) (Depura® (Sanofi Medley), Addera D3® (Cosmed)). Vitamina D3. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Cápsula, comprimido ou orodispersível de 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, 10.000 e 50.000 UI conforme a marca; gotas em outros registros

Indicações: Prevenção e tratamento da deficiência de vitamina D; adjuvante em osteoporose, osteomalácia e raquitismo

Adulto: Manutenção (Depura®): 1.000 a 2.000 UI/dia ou 7.000 a 14.000 UI/semana. Ataque: 7.000 UI/dia ou 50.000 UI/semana por 6 a 8 semanas

Dose máxima: Não há teto único na bula; faixa terapêutica de 1.000 a 50.000 UI conforme o esquema e o nível sérico

Contraindicações: Hipervitaminose D; hipercalcemia ou hiperfosfatemia; condições que levam à hipercalcemia (sarcoidose, mieloma, hiperparatireoidismo primário)

Interações: Tiazídicos (hipercalcemia); fenitoína, barbitúricos e rifampicina reduzem o efeito; corticoides; colestiramina; antiácidos com magnésio

Gestação e lactação: Pode ser usado na deficiência, sem exceder a dose diária recomendada; na lactação, sob supervisão médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Conferir se a dose é diária ou semanal: troca de 50.000 UI por dia causa intoxicação. Tomar perto de uma refeição. Produtos de baixa dose podem ter outro enquadramento: ver a embalagem.

Fonte: Bulas do Depura® (Sanofi Medley) e do Addera D3® comprimido (Cosmed), reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de abr. 2025)

Dapagliflozina (Forxiga®). Inibidor do SGLT2. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 5 mg e 10 mg

Indicações: Diabetes tipo 2; insuficiência cardíaca; doença renal crônica

Adulto: 10 mg 1 vez ao dia, a qualquer hora, com ou sem alimento, em todas as indicações

Dose máxima: 10 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco. Não iniciar com TFGe abaixo de 25 mL/min/1,73 m² (efeito glicêmico menor abaixo de 45)

Interações: Insulina e sulfonilureias: hipoglicemia (o médico pode reduzir a dose). Diuréticos: desidratação. Lítio: nível de lítio pode cair

Gestação e lactação: Não usar no 2º e 3º trimestres; não usar na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Beber água e manter higiene íntima: o remédio aumenta glicose na urina e o risco de infecção genital. Mal-estar, vômitos e respiração rápida pedem avaliação médica (cetoacidose, mesmo com glicemia pouco alta)

Fonte: Bula de Forxiga® (AstraZeneca), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Desloratadina (Desalex® (referência)). Anti-histamínico H1 de segunda geração. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 5 mg; xarope 0,5 mg/mL. Consta da lista de isentos, mas o Desalex® consultado traz venda sob prescrição: vale a frase da embalagem

Indicações: Rinite alérgica e urticária

Adulto: A partir de 12 anos: 5 mg 1 vez ao dia

Criança: 6 a 11 meses: 1 mg; 1 a 5 anos: 1,25 mg; 6 a 11 anos: 2,5 mg; 1 vez ao dia

Dose máxima: 5 mg/dia; dose maior não aumenta o efeito e pode dar sonolência

Contraindicações: Alergia aos componentes

Interações: Sem interações relevantes descritas; não potencializa o álcool

Gestação e lactação: Só com orientação médica; não recomendada na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C; comprimido protegido da umidade

No balcão: Pode ser tomada com ou sem alimento. Não aumentar a dose por conta própria.

Fonte: Bula do Desalex® (Organon), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; IN 285/2024 com redação da IN 404/2025 (LMIP)

Desogestrel (Cerazette® (referência)). Contraceptivo oral só de progestágeno. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 75 mcg (28 ou 84)

Indicações: Contracepção, inclusive na amamentação e para quem não pode usar estrogênio

Adulto: 1 comprimido ao dia, no mesmo horário, sem pausa entre cartelas; iniciar no 1º dia da menstruação

Dose máxima: 1 comprimido ao dia

Contraindicações: Trombose atual; doença hepática grave sem normalização; câncer sensível a esteroides sexuais (ex.: mama); sangramento vaginal sem diagnóstico; alergia

Interações: Anticonvulsivantes indutores (carbamazepina, fenitoína, topiramato, fenobarbital), rifampicina, antirretrovirais, erva-de-são-joão, carvão ativado: usar método de barreira

Gestação e lactação: Contraindicado na gestação. Pode ser usado na amamentação (não altera a produção nem a qualidade do leite)

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Atraso de até 12 h mantém a proteção. Sangramento irregular é comum e não é motivo para parar por conta própria.

Fonte: Bula do Cerazette® (Organon Farmacêutica), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025)

Dexametasona (Decadron® (referência)). Corticoide sistêmico de longa ação. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 0,5, 0,75 e 4 mg; elixir 0,5 mg/5 mL

Indicações: Doenças alérgicas, inflamatórias, endócrinas e outras, conforme prescrição

Adulto: 0,75 a 15 mg/dia, conforme a doença

Criança: Doses reduzidas, guiadas pela gravidade da doença

Dose máxima: Conforme prescrição

Contraindicações: Infecção fúngica sistêmica; alergia a sulfitos ou componentes; vacinas de vírus vivo

Interações: Fenitoína, fenobarbital, rifampicina, efedrina (reduzem efeito); AAS (cautela)

Gestação e lactação: Só com orientação médica; dose alta: não amamentar

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Comprimido de 0,5 mg e de 4 mg são parecidos no nome: conferir a concentração. Retirada gradual após uso prolongado.

Fonte: Bula do Decadron® (Aché), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Dexclorfeniramina (Polaramine® (referência)). Anti-histamínico H1 de primeira geração. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 2 mg; drágea de liberação repetida; gotas e solução oral

Indicações: Alergias de pele e respiratórias

Adulto: 2 mg 3 a 4 vezes ao dia (gotas: 20 gotas 3 a 4 vezes)

Criança: 6 a 12 anos: 10 gotas 3 vezes ao dia (máx. 6 mg/dia); 2 a 6 anos: 5 gotas 3 vezes ao dia (máx. 3 mg/dia); abaixo de 2 anos contraindicado

Dose máxima: 12 mg/dia no adulto (120 gotas)

Contraindicações: Prematuro e recém-nascido; menor de 2 anos (líquidos) e de 12 anos (comprimido); uso de IMAO

Interações: IMAO; álcool e depressores do SNC; outros anticolinérgicos

Gestação e lactação: Segurança não comprovada; cautela na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Dá sonolência e boca seca: evitar dirigir e álcool. Evitar em idoso.

Fonte: Bula do Polaramine® (Cosmed/Brainfarma), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Diazepam (Valium®). Benzodiazepínico de ação longa. *Controle especial · B1*

Apresentações: Comprimidos 5 mg e 10 mg; outras formas conforme o fabricante

Indicações: Ansiedade; adjuvante em espasmo muscular e abstinência alcoólica; outros usos da bula

Adulto: 5 a 10 mg para iniciar; 5 a 20 mg/dia conforme a gravidade. Cada dose em geral não passa de 10 mg. Idoso: doses menores

Dose máxima: 10 mg por tomada (em geral)

Contraindicações: Alergia a benzodiazepínico; glaucoma de ângulo agudo; insuficiência respiratória ou hepática grave; apneia do sono; cautela na miastenia gravis. Não usar sozinho para depressão

Interações: Álcool, opioides e outros depressores: sedação e depressão respiratória. Antifúngicos azólicos, alguns antibióticos, cimetidina e omeprazol: mais efeito. Toranja

Gestação e lactação: Só sob orientação médica. Passa ao leite: sonolência e dificuldade de sucção no bebê

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Notificação de Receita B (azul) com receita. A bula limita o tratamento a 2 a 3 meses, incluindo a retirada. Idoso tem mais risco de queda

Fonte: Bula de Valium® (Roche, registro Belfar), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Diclofenaco (Cataflam® (potássico) e Voltaren® (sódico)). AINE (derivado do ácido fenilacético). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Drágea e comprimido dispersível 50 mg (potássico); comprimido 50 mg e liberação prolongada 75 e 100 mg (sódico); gotas 15 mg/mL. Gel tópico é MIP

Indicações: Dor e inflamação, dismenorreia, crise de gota, doenças reumáticas

Adulto: 100 a 150 mg/dia divididos em 2 ou 3 tomadas; casos leves 75 a 100 mg/dia

Criança: Gotas a partir de 1 ano: 1 a 4 gotas/kg/dia em 2 ou 3 tomadas; comprimidos a partir de 14 anos

Dose máxima: 150 mg/dia (dismenorreia: até 200 mg/dia por indicação médica); gotas: até 300 gotas/dia

Contraindicações: Alergia a AINE ou AAS; úlcera ou sangramento digestivo; insuficiência cardíaca, hepática ou renal grave; 3º trimestre

Interações: Lítio, ISRS, digoxina, diuréticos, IECA, betabloqueadores, outros AINE, corticoide, anticoagulantes

Gestação e lactação: Contraindicado nos 3 últimos meses; evitar no restante sem orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da umidade

No balcão: Drágea e comprimido de preferência antes das refeições, conforme a bula; o dispersível é dissolvido em água. Não associar a ibuprofeno ou nimesulida.

Fonte: Bulas do Cataflam®, Cataflam® gotas e Voltaren® (Novartis), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Dimenidrinato (Dramin® (referência)). Anti-histamínico antiemético (cinetose). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Cápsula mole 25 e 50 mg; com piridoxina (Dramin B6®) conforme a bula do produto

Indicações: Prevenção e tratamento de náusea, vômito e tontura, inclusive cinetose

Adulto: Acima de 12 anos: 50 a 100 mg a cada 4 a 6 h; viagem: 30 minutos antes

Criança: 6 a 12 anos: 25 a 50 mg a cada 6 a 8 h

Dose máxima: 400 mg/dia no adulto; 150 mg/dia de 6 a 12 anos

Contraindicações: Menor de 6 anos; porfiria; alergia aos componentes

Interações: Álcool, sedativos, tranquilizantes, IMAO; pode mascarar ototoxicidade

Gestação e lactação: Informar o médico; avaliar na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Dá sonolência: não dirigir. Para cinetose sem prescrição, a lista de isentos tem meclozina 50 mg.

Fonte: Bula do Dramin® Capsgel (Cosmed), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Dipirona (Novalgina® (referência)). Analgésico e antitérmico (pirazolona). *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 500 mg e 1 g; efervescente 1 g; gotas 500 mg/mL (20 gotas/mL); solução oral 50 mg/mL

Indicações: Dor e febre

Adulto: Acima de 15 anos: 500 a 1000 mg (20 a 40 gotas) até 4 vezes ao dia

Criança: Gotas por faixa de peso: 5 a 8 kg, 2 a 5 gotas; 9 a 15 kg, 3 a 10 gotas; 16 a 23 kg, 5 a 15 gotas; até 4 vezes ao dia

Dose máxima: 4 g/dia no adulto; na criança, o teto da faixa de peso da bula

Contraindicações: Menor de 3 meses ou 5 kg; alergia a pirazolonas; agranulocitose prévia; doença de medula óssea; porfiria; deficiência de G6PD; gestação e amamentação (bula)

Interações: Reduz níveis de bupropiona, metadona, ciclosporina, tacrolimo, sertralina e valproato (indução enzimática)

Gestação e lactação: A bula do Novalgina® lista gravidez e amamentação entre as contraindicações

Conservação: 15 a 30 °C; comprimido simples protegido da luz e umidade

No balcão: Febre com dor de garganta ou feridas na boca durante o uso: suspender e procurar atendimento (risco de agranulocitose). Cuidado com queda de pressão.

Fonte: Bulas do Novalgina® comprimido e solução oral (Sanofi Medley), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Domperidona (Motilium® (referência)). Antiemético e procinético (antagonista dopaminérgico periférico). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 10 mg; suspensão oral 1 mg/mL

Indicações: Dispepsia, náusea e vômito

Adulto: 10 mg 3 vezes ao dia, 15 a 30 minutos antes das refeições

Criança: Só a partir de 35 kg (comprimido); suspensão acima de 12 anos ou 35 kg

Dose máxima: 40 mg/dia; náusea aguda por até 1 semana

Contraindicações: Prolactinoma; doença hepática; dor de estômago intensa ou fezes escuras; uso de inibidores fortes de CYP3A4 que prolongam QT

Interações: Cetoconazol, itraconazol, eritromicina, claritromicina, amiodarona, ritonavir (arritmia)

Gestação e lactação: Só se justificado, com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Conferir antifúngico ou macrolídeo em uso: risco de arritmia. Palpitação ou desmaio: procurar atendimento.

Fonte: Bula do Motilium® (Janssen-Cilag), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Doxiciclina (Vibramicina® (referência)). Tetraciclina. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido solúvel 100 mg (20); comprimido revestido 100 mg (15)

Indicações: Infecções respiratórias, urogenitais (clamídia), acne, doenças por riquétsias, leptospirose, entre outras

Adulto: 200 mg no 1º dia (dose única ou 100 mg de 12/12 h), depois 100 mg/dia; infecções graves: 200 mg/dia todo o tratamento

Criança: Acima de 8 anos e até 45 kg: 4,4 mg/kg no 1º dia, depois 2,2 mg/kg/dia; acima de 45 kg, dose de adulto

Dose máxima: 200 mg/dia

Contraindicações: Alergia a tetraciclinas; gestantes e lactantes; menores de 8 anos

Interações: Antiácidos, cálcio, magnésio, ferro e bismuto reduzem a absorção; varfarina (sangramento); álcool, carbamazepina, fenitoína e barbitúricos reduzem o efeito; evitar com penicilina

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação e na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegida da luz e da umidade

No balcão: Tomar com bastante água e não tomar antes de deitar (risco de ferida no esôfago). Evitar sol forte e usar protetor solar. Separar de leite e suplemento mineral.

Fonte: Bula da Vibramicina® (Pfizer Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Empagliflozina (Jardiance®). Inibidor do SGLT2. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 10 mg e 25 mg

Indicações: Diabetes tipo 2; insuficiência cardíaca

Adulto: Diabetes: 10 mg 1 vez ao dia, até 25 mg. Insuficiência cardíaca: 10 mg 1 vez ao dia. Com ou sem alimento

Dose máxima: 25 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco. Não recomendada no diabetes com TFG abaixo de 30, na insuficiência cardíaca com TFG abaixo de 20 mL/min/1,73 m², abaixo de 18 anos ou a partir de 85 anos

Interações: Diuréticos tiazídicos e de alça: desidratação e hipotensão. Sulfonilureias e insulina: hipoglicemia. Lítio: nível pode cair

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação salvo necessidade clara; suspender a amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Hidratar-se bem e cuidar da higiene íntima. Tontura ao levantar, sobretudo em quem usa diurético, deve ser relatada ao médico

Fonte: Bula de Jardiance® (Boehringer Ingelheim), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Enalapril (Renitec®). Inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 5 mg, 10 mg e 20 mg (maleato de enalapril)

Indicações: Hipertensão; insuficiência cardíaca; disfunção ventricular esquerda

Adulto: Hipertensão: 10 a 20 mg 1 vez ao dia; manutenção usual 20 mg/dia. Insuficiência cardíaca: começa com 2,5 mg/dia e sobe aos poucos até 20 mg/dia em 1 ou 2 tomadas

Dose máxima: 40 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco; angioedema prévio com IECA, hereditário ou sem causa; uso com alisquireno em diabéticos; uso com sacubitril/valsartana (intervalo de 36 horas)

Interações: Suplemento de potássio, sal light, diurético poupador de potássio: hipercalemia. AINE: menos efeito e piora renal. Lítio: toxicidade. Sacubitril, vildagliptina, sirolimo, everolimo: angioedema. Antidiabéticos: hipoglicemia

Gestação e lactação: Contraindicado na gestação (lesão e morte fetal no 2º e 3º trimestres). Passa ao leite em quantidade muito pequena; decisão médica

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade; tirar do blíster só na hora de tomar

No balcão: A tosse seca persistente é efeito conhecido da classe e deve ser relatada ao médico. Inchaço de lábios, língua ou garganta exige atendimento de urgência. Cuidado com tontura na primeira dose

Fonte: Bula de Renitec® (Organon), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Escitalopram (Lexapro®). Antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS). *Controle especial · C1*

Apresentações: Comprimidos revestidos 10 mg, 15 mg e 20 mg; solução oral (gotas) 20 mg/mL, frasco 15 mL (1 gota = 1 mg)

Indicações: Depressão; transtorno do pânico; ansiedade generalizada; fobia social; transtorno obsessivo-compulsivo

Adulto: Depressão: 10 mg 1 vez ao dia, até 20 mg. Pânico: 5 mg/dia na 1ª semana, depois 10 mg, até 20 mg

Dose máxima: 20 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco; uso de IMAO, selegilina, moclobemida ou linezolida; prolongamento do QT ou arritmia; uso de medicamentos que alteram o ritmo cardíaco

Interações: IMAO: esperar 14 dias após IMAO não seletivo e 7 dias após o escitalopram. Fármacos que prolongam o QT: contraindicado. Lítio, tramadol e triptanos: síndrome serotoninérgica. AAS, AINE e varfarina: sangramento

Gestação e lactação: Só após discussão de riscos com o médico; sintomas no recém-nascido se usado no 3º trimestre. Evitar na amamentação salvo indicação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C. Gotas: proteger do calor e da umidade; usar em até 8 semanas após aberto

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias, retida. Gotas: diluir em água ou suco de laranja ou maçã e tomar na hora. Não suspender de repente

Fonte: Bula de Lexapro® (Lundbeck), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Espironolactona (Aldactone®). Diurético poupador de potássio (antagonista da aldosterona). *Venda sob*

prescrição

Apresentações: Comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações: Hipertensão; insuficiência cardíaca; edema da cirrose e da síndrome nefrótica; hiperaldosteronismo primário; hipocalemia por diurético

Adulto: Hipertensão: 50 a 100 mg/dia, até 200 mg/dia em casos resistentes. Insuficiência cardíaca: usual 100 mg/dia (faixa 25 a 200 mg). Cirrose: 100 a 400 mg/dia conforme sódio e potássio urinários

Criança: Edema: início com cerca de 3,3 mg/kg/dia em doses divididas

Dose máxima: 400 mg/dia (cirrose e teste diagnóstico)

Contraindicações: Alergia ao fármaco; insuficiência renal aguda ou significativa; anúria; hiperpotassemia; doença de Addison; uso com eplerenona

Interações: IECA, BRA, suplemento de potássio, sal light: hipercalemia. AINE e AAS: menos efeito diurético. Digoxina: meia-vida maior. Outros anti-hipertensivos: efeito somado

Gestação e lactação: Avisar o médico se engravidar. Na amamentação, se o uso for essencial, a bula indica alimentação alternativa para o bebê

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Evitar suplemento de potássio e sal light sem orientação. Aumento ou dor nas mamas pode ocorrer e deve ser relatado ao médico

Fonte: Bula de Aldactone® (Pfizer), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Fexofenadina (Allegra® (referência)). Anti-histamínico H1 de segunda geração. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 60, 120 e 180 mg; suspensão oral 6 mg/mL

Indicações: Rinite alérgica e urticária crônica

Adulto: Rinite: 60 mg 2 vezes ao dia, 120 mg ou 180 mg 1 vez ao dia; urticária: 60 mg 2 vezes ao dia ou 180 mg 1 vez ao dia

Criança: 2 a 11 anos: 30 mg (5 mL) 2 vezes ao dia; urticária a partir de 6 meses conforme a bula

Dose máxima: 180 mg/dia

Contraindicações: Alergia aos componentes; comprimido abaixo de 12 anos

Interações: Antiácido com alumínio e magnésio: esperar 2 h; suco de frutas reduz a absorção

Gestação e lactação: Sem estudos; só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C; suspensão válida por 12 meses após aberta

No balcão: Tomar com água, longe de suco de frutas e de antiácido.

Fonte: Bula do Allegra® (Sanofi Medley), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Finasterida (Proscar® (referência, 5 mg)). Inibidor da 5-alfa-redutase. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido revestido 5 mg; genéricos de 1 mg para alopecia androgenética masculina

Indicações: Hiperplasia prostática benigna (5 mg); alopecia androgenética masculina (1 mg)

Adulto: HPB: 5 mg 1 vez ao dia, com ou sem alimento, por tempo prolongado. Alopecia: 1 mg 1 vez ao dia, conforme a bula do produto

Dose máxima: 5 mg/dia (HPB)

Contraindicações: Mulheres e crianças; alergia a componente da fórmula

Interações: Sem interação relevante descrita; reduz o PSA, o que deve ser informado ao médico que pedir o exame

Gestação e lactação: Contraindicada para mulheres. Gestantes não devem manusear comprimido quebrado ou esfarelado (risco ao feto masculino)

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Efeito leva meses; não interromper por conta própria. Avisar o médico do uso antes de dosar PSA. Mulher grávida não deve tocar em comprimido partido.

Fonte: Bulas do Proscar® (Merck Sharp & Dohme) e de finasterida genérico, reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de 2023 e 2020)

Fluconazol (Zoltec® (referência)). Antifúngico triazólico. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Cápsula 100 mg (8) e 150 mg (1 ou 2); solução para infusão 2 mg/mL (uso hospitalar)

Indicações: Candidíase vaginal e balanite, candidíase orofaríngea, dermatomicoses, onicomicose, infecções fúngicas sistêmicas

Adulto: Candidíase vaginal: 150 mg dose única; recorrente: 150 mg 1 vez ao mês por 4 a 12 meses. Dermatomicoses: 150 mg 1 vez por semana por 2 a 4 semanas. Orofaríngea: 50 a 100 mg/dia por 7 a 14 dias

Criança: Infecções graves: 6 mg/kg no 1º dia, depois 3 a 6 mg/kg/dia; demais indicações conforme a bula

Dose máxima: Nas infecções graves, 400 mg/dia (bula); doses maiores só sob indicação médica

Contraindicações: Alergia a azólicos; uso com terfenadina, cisaprida, astemizol, eritromicina, pimozida e quinidina

Interações: Varfarina (sangramento), benzodiazepínicos, ciclosporina, tacrolimo, celecoxibe, amiodarona e outros fármacos que prolongam o QT

Gestação e lactação: Evitar na gestação, salvo infecção grave; contracepção durante o uso e por cerca de 1 semana após. Lactação: só com orientação médica; amamentação não recomendada após doses repetidas ou altas

Conservação: Cápsulas: 15 a 30 °C, protegidas da luz e da umidade

No balcão: Na candidíase vaginal, a cápsula única basta; sintomas podem levar alguns dias para sumir. Episódios repetidos ou gestante: encaminhar ao médico.

Fonte: Bula do Zoltec® (Pfizer Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da lista da IN 360/2025

Fluoxetina (Prozac®). Antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS). *Controle especial · C1*

Apresentações: Cápsulas 20 mg; outras formas (comprimido, solução oral) conforme o fabricante

Indicações: Depressão; bulimia nervosa; transtorno obsessivo-compulsivo; transtorno disfórico pré-menstrual

Adulto: Depressão: 20 mg/dia. TOC: 20 a 60 mg/dia. Bulimia: 60 mg/dia. Disfórico pré-menstrual: 20 mg/dia contínuo ou na fase lútea

Dose máxima: Doses acima de 80 mg/dia não foram avaliadas sistematicamente

Contraindicações: Alergia ao fármaco; uso de IMAO (esperar 14 dias após o IMAO; e 5 semanas após a fluoxetina para iniciar IMAO ou tioridazina)

Interações: IMAO e tioridazina: graves. Inibe o CYP2D6: tricíclicos, metoprolol, carvedilol, alguns antipsicóticos em nível maior. Varfarina, AAS e AINE: sangramento. Tramadol e triptanos: síndrome serotoninérgica

Gestação e lactação: Só se o benefício justificar; sintomas no recém-nascido se usada no fim da gestação. Passa ao leite; cautela

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias, retida. Tomar de manhã se causar insônia. Como fica muito tempo no corpo, interações podem ocorrer semanas depois de parar

Fonte: Bula de Prozac® (Eli Lilly), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Fosfomicina trometamol (Monuril® (referência)). Derivado do ácido fosfônico. *Retenção de receita*

Apresentações: Envelope com 8 g de granulado contendo 5,631 g de fosfomicina trometamol (dose de 3 g de fosfomicina); caixa com 1 ou 2

Indicações: Cistite aguda e recorrente, bacteriúria assintomática na gestação, profilaxia de ITU em procedimentos urológicos

Adulto: 1 envelope em dose única, dissolvido em 50 a 75 mL de água, em jejum, à noite após urinar; Pseudomonas, Proteus e Enterobacter: 2 envelopes com 24 h de intervalo

Dose máxima: 2 envelopes por tratamento, com intervalo de 24 h (bula)

Contraindicações: Alergia; insuficiência renal grave (depuração abaixo de 10 mL/min) e hemodiálise; crianças sem orientação médica

Interações: Metoclopramida e outros aceleradores do trânsito intestinal reduzem níveis; alimento retarda a absorção; antibióticos em geral podem alterar o INR de quem usa varfarina

Gestação e lactação: Pode ser usada na gestação com prescrição. Lactação: dose única é aceitável segundo a bula

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da umidade. Tomar logo após dissolver; não guardar a solução

No balcão: Esvaziar a bexiga antes e tomar de estômago vazio, à noite. Os sintomas costumam ceder em 2 a 3 dias; se não melhorar, voltar ao médico.

Fonte: Bula do Monuril® (Zambon Laboratórios Farmacêuticos), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Furosemida (Lasix®). Diurético de alça. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 40 mg; solução injetável 10 mg/mL (ampola 2 mL)

Indicações: Edema de origem cardíaca, renal ou hepática; hipertensão leve a moderada

Adulto: Oral: início 20 a 80 mg/dia; manutenção 20 a 40 mg/dia, de preferência em uma tomada, em jejum

Criança: Oral: 2 mg/kg/dia, no máximo 40 mg/dia

Dose máxima: Adulto: depende da resposta (não fixada na bula). Criança: 40 mg/dia

Contraindicações: Anúria; pré-coma ou coma hepático; hipocalemia ou hiponatremia graves; desidratação ou hipovolemia; alergia a furosemida ou sulfonamidas; lactação

Interações: Aminoglicosídeos, cisplatina: ototoxicidade. Lítio: toxicidade. Digoxina: arritmia por hipocalemia. AINE: menos efeito e risco renal. Outros anti-hipertensivos: hipotensão

Gestação e lactação: Só se estritamente indicada e por curto período. Passa ao leite e inibe a lactação; contraindicada na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz, na embalagem original

No balcão: O efeito diurético é rápido: tomar em horário que não atrapalhe a rotina, em geral pela manhã. Tontura, cãibra e sede intensa devem ser relatadas ao médico

Fonte: Bula de Lasix® (Sanofi Medley), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Glibenclamida (Daonil®). Sulfonilureia. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 5 mg

Indicações: Diabetes tipo 2

Adulto: Início ½ a 1 comprimido (2,5 a 5 mg) 1 vez ao dia antes do café da manhã; aumentos de no máximo 2,5 mg a cada 1 a 2 semanas. Usual 5 a 10 mg/dia; acima de 10 mg, dividir antes do jantar

Dose máxima: 15 mg/dia recomendados (até 20 mg/dia só em casos excepcionais); dose única máxima de 10 mg

Contraindicações: Diabetes tipo 1 ou cetoacidose; pré-coma ou coma diabético; disfunção renal ou hepática grave; alergia a glibenclamida; gestação e amamentação; uso com bosentana; criança

Interações: Bosentana: contraindicada (lesão hepática). Insulina e outros antidiabéticos, inibidores do CYP2C9 (fluconazol): hipoglicemia. Álcool: hipoglicemia imprevisível. Betabloqueador: mascara os sinais

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação e na amamentação; trocar por insulina

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz

No balcão: Nunca pular refeição depois de tomar. Ensinar os sinais de hipoglicemia (suor frio, tremor, confusão) e a corrigir com açúcar. Idoso e quem come pouco têm mais risco

Fonte: Bula de Daonil® (Sanofi Medley), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Gliclazida (Diamicron® MR). Sulfonilureia de liberação modificada. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos de liberação prolongada 30 mg e 60 mg (60 mg é sulcado)

Indicações: Diabetes tipo 2

Adulto: 30 a 120 mg em dose única no café da manhã, sempre seguida de refeição

Dose máxima: 120 mg/dia

Contraindicações: Alergia a gliclazida, sulfonilureias ou sulfamidas; diabetes tipo 1; cetoacidose, pré-coma ou coma; doença renal ou hepática grave; uso de antifúngico (miconazol); amamentação; menor de 18 anos

Interações: Miconazol e fluconazol, claritromicina, sulfonamidas, IECA, betabloqueadores, álcool, outros antidiabéticos: hipoglicemia. Corticoides, clorpromazina e salbutamol: hiperglicemia

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação; contraindicada na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Engolir inteiro (o de 60 mg pode ser partido ao meio no sulco, sem mastigar). Tomar no café da manhã e não pular refeições. Miconazol, inclusive gel oral, exige falar com o médico

Fonte: Bula de Diamicron® MR (Servier), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Hidroclorotiazida (Clorana®). Diurético tiazídico. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 25 mg e 50 mg

Indicações: Hipertensão; edema de origem cardíaca, hepática ou renal

Adulto: Hipertensão: a bula indica início com 50 a 100 mg/dia pela manhã, ajustado à menor dose eficaz (há comprimido de 25 mg). Edema: 50 a 100 mg 1 ou 2 vezes ao dia; manutenção 25 a 200 mg/dia ou em dias alternados

Criança: Até 2 anos: 12,5 a 25 mg/dia; 2 a 12 anos: 25 a 100 mg/dia; base usual 2 a 3 mg/kg/dia, sempre em 2 tomadas

Contraindicações: Alergia ao fármaco; insuficiência renal grave (depuração abaixo de 30 mL/min) ou anúria; doença hepática grave; distúrbio grave de eletrólitos; icterícia em criança

Interações: Lítio: toxicidade. Digoxina e antiarrítmicos: a hipocalemia aumenta o risco de arritmia. Antidiabéticos e insulina: piora da glicemia. AINE: menos efeito. Álcool e sedativos: hipotensão postural

Gestação e lactação: Evitar na gestação, sobretudo para edema ou hipertensão gestacional. Passa ao leite e pode reduzir a produção; não recomendada na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Tomar pela manhã para não levantar à noite para urinar. Cãibra, fraqueza e tontura ao levantar devem ser relatadas ao médico

Fonte: Bula de Clorana® (Sanofi Medley), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 01/04/2026

Ibuprofeno (Advil® e Alivium®). AINE (derivado do ácido propiônico). *Isento de prescrição*

Apresentações: Cápsula 400 mg (MIP); suspensão 30 mg/mL; gotas 50 e 100 mg/mL (MIP); gotas 200 mg/mL do Alivium®: venda sob prescrição na bula

Indicações: Dor, febre, cólica menstrual

Adulto: 400 mg a cada 4 a 6 h, durante ou após refeições

Criança: A partir de 6 meses: dose por peso da tabela da bula, a cada 6 a 8 h, até 4 vezes ao dia (suspensão 30 mg/mL: até 7 mL por dose)

Dose máxima: 1200 mg/dia sem prescrição (Advil®)

Contraindicações: Alergia a AAS ou AINE; úlcera ou sangramento digestivo; insuficiência renal, hepática ou cardíaca grave; 3º trimestre de gestação

Interações: Anticoagulantes, outros AINE, AAS, corticoide, IECA, BRA, diuréticos, lítio, metotrexato

Gestação e lactação: Contraindicado no 3º trimestre; evitar no restante da gestação e na amamentação sem orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Não indicar na suspeita de dengue. Não usar para dor por mais de 10 dias nem para febre por mais de 3 dias sem médico.

Fonte: Bulas do Advil® 400 mg (PF Consumer Healthcare) e do Alivium® (Cosmed/Brainfarma), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Insulina humana NPH (Humulin® N, Novolin® N). Insulina de ação intermediária (isofana). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Suspensão injetável 100 UI/mL: frasco-ampola 10 mL; refil 3 mL para caneta

Indicações: Diabetes que requer insulina

Adulto: Dose individual em UI, definida pelo médico conforme glicemia; via subcutânea

Criança: Dose individual em UI (Humulin® N: uso acima de 3 anos)

Contraindicações: Hipoglicemia; alergia à insulina humana ou a componente. Não usar em bomba de infusão

Interações: Aumentam a necessidade: corticoides, tiazídicos, anticoncepcionais, hormônio tireoidiano. Reduzem: outros antidiabéticos, salicilatos, IMAO, IECA, BRA. Betabloqueadores mascaram a hipoglicemia. Álcool: hipoglicemia

Gestação e lactação: Pode ser usada na gestação e na amamentação com ajuste de dose pelo médico

Conservação: Fechada: geladeira, 2 a 8 °C, sem congelar, protegida da luz. Em uso: abaixo de 30 °C, longe de calor e luz, por até 28 dias (Humulin®) ou até 4 semanas entre 15 e 30 °C (Novolin®); refil em uso não volta à geladeira. Congelada: descartar

No balcão: Homogeneizar antes de aplicar rolando entre as mãos e invertendo, sem agitar com força, até ficar uniformemente leitosa. Fazer rodízio dos locais e não reutilizar agulha. Anotar a data de abertura

Fonte: Bula de Humulin® N (Eli Lilly), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025; Bula de Novolin® N (Novo Nordisk), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Insulina humana regular (Humulin® R, Novolin® R). Insulina de ação rápida (regular). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Solução injetável 100 UI/mL: frasco-ampola 10 mL; refil 3 mL para caneta

Indicações: Diabetes que requer insulina; controle da glicemia nas refeições e em situações agudas

Adulto: Dose individual em UI, definida pelo médico; via subcutânea antes das refeições conforme prescrição. Via venosa ou muscular só por profissional de saúde

Criança: Dose individual em UI (Humulin® R: uso acima de 3 anos)

Contraindicações: Hipoglicemia; alergia à insulina humana ou a componente

Interações: Iguais às da NPH: corticoides, tiazídicos e anticoncepcionais aumentam a necessidade; salicilatos, IMAO, IECA e outros antidiabéticos reduzem; betabloqueador mascara hipoglicemia; álcool

Gestação e lactação: Pode ser usada na gestação e na amamentação com ajuste de dose pelo médico

Conservação: Fechada: geladeira, 2 a 8 °C, sem congelar, protegida da luz. Em uso: abaixo de 30 °C, longe de calor e luz, por até 28 dias (Humulin® R); refil em uso não volta à geladeira

No balcão: Solução deve estar límpida e incolor; turva ou com partículas, não usar. Aplicar no horário prescrito em relação à refeição e não deixar de comer depois

Fonte: Bula de Humulin® R (Eli Lilly), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Ivermectina (Revectina® (referência)). Antiparasitário (avermectina). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 6 mg (2 ou 4)

Indicações: Estrongiloidíase, filariose, ascaridíase, escabiose, pediculose, oncocercose

Adulto: Cerca de 200 mcg/kg em dose única (oncocercose: 150 mcg/kg), com água; por faixa de peso: 51 a 65 kg, 2 comprimidos; 66 a 79 kg, 2 e meio

Criança: A partir de 15 kg e 5 anos: 15 a 24 kg, meio comprimido; 25 a 35 kg, 1; 36 a 50 kg, 1 e meio

Dose máxima: Dose única de cerca de 200 mcg/kg; repetição só por avaliação médica

Contraindicações: Alergia; meningite ou outras doenças do SNC; menores de 5 anos ou abaixo de 15 kg; uso com barbitúricos, benzodiazepínicos, ácido valproico e oxibato de sódio não recomendado

Interações: Depressores do SNC (benzodiazepínicos, álcool); varfarina (INR pode subir)

Gestação e lactação: Categoria C: só com orientação médica. Lactação: passa em baixa concentração; só se indicado

Conservação: 15 a 30 °C, protegida da luz e da umidade

No balcão: Dose calculada pelo peso, tomada de uma vez com água. Na escabiose, a bula orienta retorno ao médico em 1 a 2 semanas para confirmar a cura.

Fonte: Bula da Revectina® (Abbott Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da LMIP e da IN 360/2025

Lactulose (Lactulona®). Laxante osmótico. *Isento de prescrição*

Apresentações: Xarope 667 mg/mL, frasco 120 mL e sachês de 15 mL

Indicações: Constipação intestinal; encefalopatia hepática (prescrição)

Adulto: Constipação: 15 a 30 mL/dia em 1 tomada

Criança: Lactente: 5 mL/dia; 1 a 5 anos: 5 a 10 mL/dia; 6 a 12 anos: 10 a 15 mL/dia

Dose máxima: Ajustar para 2 a 3 evacuações/dia; encefalopatia: até 150 mL/dia com prescrição

Contraindicações: Intolerância a lactose, galactose ou frutose; obstrução, sangramento intestinal, apendicite; preparo de colonoscopia com eletrocautério

Interações: Antibióticos podem reduzir o efeito; evitar com outros laxantes e antiácidos

Gestação e lactação: Sob orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Pode causar gases nos primeiros dias. Pode ser misturada a suco, leite ou iogurte.

Fonte: Bula da Lactulona® (Daiichi Sankyo), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Levofloxacino (Levaquin® (Janssen-Cilag)). Fluoroquinolona. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 500 mg (7 ou 10); genéricos de 250, 500 e 750 mg

Indicações: Sinusite, exacerbação de bronquite crônica, pneumonia comunitária, ITU complicada, pielonefrite, prostatite, pele e partes moles

Adulto: 500 mg 1 vez ao dia (alguns esquemas com 750 mg 1 vez ao dia), com ou sem alimento; ajustar na insuficiência renal

Criança: Não usar em crianças e adolescentes (bula)

Dose máxima: 750 mg/dia

Contraindicações: Alergia a levofloxacino ou a outras quinolonas

Interações: Antiácidos com cálcio, magnésio ou alumínio, sucralfato, ferro e polivitamínico com zinco: 2 h antes ou 2 h depois; teofilina; varfarina; fármacos que prolongam o QT

Gestação e lactação: Só se o benefício superar o risco. Lactação: escolher entre suspender a amamentação ou o tratamento

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Uma vez ao dia, sempre no mesmo horário, longe de antiácido e de suplemento mineral. Dor em tendão, formigamento ou palpitação: suspender e procurar o médico.

Fonte: Bula do Levaquin® (Janssen-Cilag) e de levofloxacino 750 mg (genérico), reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de 2025); IN 360/2025, art. 1º

Levonorgestrel + etinilestradiol (Nordette® (Pfizer), Microvlar® (Bayer)). Contraceptivo oral combinado. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 0,15 mg + 0,03 mg (150 mcg + 30 mcg), cartela de 21

Indicações: Contracepção; controle de irregularidades menstruais

Adulto: 1 comprimido ao dia, no mesmo horário, por 21 dias; pausa de 7 dias e nova cartela no 8º dia. Primeira cartela no 1º dia da menstruação

Dose máxima: 1 comprimido ao dia

Contraindicações: Gestação; trombose ou embolia atual ou prévia; AVC ou doença coronariana; trombofilias; doenças valvares e arritmias trombogênicas; fumante acima de 35 anos tem risco cardiovascular acentuado; demais condições conforme a bula

Interações: Indutores enzimáticos (rifampicina, carbamazepina, fenitoína, erva-de-são-joão) reduzem a eficácia; ombitasvir, paritaprevir e dasabuvir (hepatite C) contraindicam o uso simultâneo

Gestação e lactação: Contraindicado na gestação e durante a amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Esquecimento de até 12 h: tomar assim que lembrar e seguir no horário normal. Atraso maior: seguir a bula e usar preservativo. Dor na perna, falta de ar ou dor no peito: atendimento imediato.

Fonte: Bula do Nordette® (Pfizer Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025)

Levonorgestrel 1,5 mg (contracepção de emergência) (Postinor Uno® (Gedeon Richter)). Progestágeno (contraceptivo de emergência). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 1,5 mg (1)

Indicações: Prevenção da gravidez após relação desprotegida ou falha do método

Adulto: 1 comprimido o mais cedo possível, até 72 h após a relação; vômito em até 4 h: repetir a dose

Dose máxima: 1 comprimido de 1,5 mg ao dia, em dose única

Contraindicações: Gravidez confirmada ou suspeita; sangramento genital anormal sem causa definida; alergia; uso por homens

Interações: Indutores enzimáticos (barbitúricos, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, efavirenz, ritonavir) reduzem a eficácia; demais conforme a bula

Gestação e lactação: Não interrompe gravidez já implantada. Lactação: passa ao leite; bulas de genéricos recomendam suspender a amamentação temporariamente

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Quanto antes tomar, maior a eficácia. Não substitui método regular nem protege de IST. Menstruação atrasada mais de 7 dias: procurar o médico (bula).

Fonte: Bula do Postinor Uno® (Gedeon Richter do Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2024); bula de levonorgestrel genérico para a lactação

---

Levotiroxina (Puran T4®; também Synthroid® e Euthyrox®). Hormônio tireoidiano (T4 sintético). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos de 12,5 mcg a 300 mcg (Puran T4®: 12,5; 25; 37,5; 50; 62,5; 75; 88; 100; 112; 125; 150; 175; 200 e 300 mcg)

Indicações: Hipotireoidismo; supressão do TSH no câncer de tireoide, nódulos e bócio

Adulto: Início 50 mcg/dia (25 mcg em cardiopatas ou hipotireoidismo antigo), subindo 25 mcg a cada 2 a 3 semanas. Manutenção usual 75 a 125 mcg/dia

Criança: Recém-nascido: 5 a 6 mcg/kg/dia. Criança: em geral 3 mcg/kg/dia, guiada pelos exames

Dose máxima: Em geral até 200 mcg/dia; falta de resposta a essa dose sugere má absorção ou má adesão

Contraindicações: Infarto recente; tireotoxicose ou hipertireoidismo não tratados; insuficiência suprarrenal descompensada; alergia a componente

Interações: Antiácidos, carbonato de cálcio, sucralfato, colestiramina: reduzem a absorção (separar o horário). Varfarina: efeito maior. Antidiabéticos e insulina: pode ser preciso ajustar. Indutores enzimáticos: menos efeito

Gestação e lactação: Mantida na gestação, com acompanhamento de exames pelo médico. Compatível com a amamentação (mínima excreção no leite)

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Tomar em jejum, com água, 30 minutos a 1 hora antes do café da manhã, todos os dias. Separar de cálcio, ferro e antiácidos. Não trocar de marca sem avisar o médico, porque a dose pode precisar de ajuste

Fonte: Bula de Puran T4® (Sanofi Medley), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 05/06/2025

Loperamida (Imosec® (referência)). Antidiarreico (opioide de ação periférica). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 2 mg

Indicações: Diarreia aguda e crônica, sem sangue e sem febre

Adulto: Aguda: 4 mg e depois 2 mg após cada evacuação líquida

Criança: Uso exclusivamente adulto; contraindicado na diarreia da criança

Dose máxima: 16 mg/dia (8 comprimidos)

Contraindicações: Criança; diarreia com sangue ou febre; constipação, distensão; colite

Interações: Ritonavir, quinidina, itraconazol, cetoconazol, genfibrozila, desmopressina oral

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação nem na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Parar se as fezes ficarem sólidas ou após 24 h sem evacuar. Manter soro de reidratação oral.

Fonte: Bula do Imosec® (Janssen-Cilag), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Loratadina (Claritin® (referência)). Anti-histamínico H1 de segunda geração. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 10 mg; xarope 1 mg/mL

Indicações: Rinite alérgica, urticária e outras alergias

Adulto: 10 mg 1 vez ao dia

Criança: 2 a 12 anos: abaixo de 30 kg, 5 mL (5 mg) 1 vez ao dia; acima de 30 kg, 10 mL (10 mg)

Dose máxima: 10 mg/dia

Contraindicações: Alergia aos componentes

Interações: Suspender 48 h antes de teste cutâneo de alergia

Gestação e lactação: Só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Pouca sedação. Doença hepática ou renal: procurar orientação antes.

Fonte: Bula do Claritin® (Bayer), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Losartana (Cozaar®). Bloqueador do receptor da angiotensina II (BRA). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 50 mg e 100 mg

Indicações: Hipertensão; hipertensão com hipertrofia ventricular esquerda; insuficiência cardíaca; nefropatia no diabetes tipo 2 com proteinúria

Adulto: Hipertensão: 50 mg 1 vez ao dia, até 100 mg 1 vez ao dia. Insuficiência cardíaca: começa com 12,5 mg 1 vez ao dia e sobe aos poucos até 50 mg/dia

Dose máxima: 100 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco; insuficiência hepática grave; gestação (evitar no 1º trimestre, contraindicada depois); uso com alisquireno em diabéticos ou renais

Interações: Suplemento de potássio, sal light com potássio, espironolactona, amilorida, trimetoprima: hipercalemia. AINE: menos efeito e piora renal. Lítio: toxicidade. Outros anti-hipertensivos: queda maior da pressão

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação (lesão fetal a partir do 2º trimestre). Não recomendada na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz

No balcão: Tomar todo dia no mesmo horário, com ou sem comida. Evitar sal light e suplemento de potássio sem falar com o médico. Mulher que engravidar deve procurar o médico logo para trocar o remédio

Fonte: Bula de Cozaar® (Organon), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Metformina (Glifage®, Glifage® XR). Biguanida. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 500 mg, 850 mg e 1 g; liberação prolongada (XR) 500 mg, 750 mg, 850 mg e 1 g

Indicações: Diabetes tipo 2 (isolada ou associada); associada à insulina no tipo 1; pré-diabetes; síndrome dos ovários policísticos

Adulto: 500 mg 2 vezes ao dia ou 850 mg 1 vez ao dia, durante ou após as refeições, com aumento gradual. XR: 1 vez ao dia, no jantar, conforme a bula do produto

Criança: A partir de 10 anos: 500 mg ou 850 mg 1 vez ao dia, até 2.000 mg/dia

Dose máxima: 2.550 mg/dia (comprimido de 850 mg) ou 2.500 mg/dia (500 mg); criança: 2.000 mg/dia

Contraindicações: TFGe abaixo de 30 mL/min/1,73 m²; doença hepática; acidose metabólica ou cetoacidose; desidratação ou infecção grave; insuficiência cardíaca ou respiratória com hipóxia; alcoolismo; cirurgia ou contraste iodado (suspensão temporária)

Interações: Contraste iodado: suspender antes e depois do exame. Álcool: acidose láctica. Diuréticos, corticoides e salbutamol: alteram a glicemia. Cimetidina, verapamil, dolutegravir: mais metformina

Gestação e lactação: Na gestação o tratamento padrão é a insulina. Não recomendada na amamentação (uso só com avaliação médica)

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da umidade (XR também da luz)

No balcão: Tomar com a refeição para reduzir náusea e diarreia, que costumam melhorar com o tempo. Avisar que usa metformina antes de exame com contraste. Vômito ou diarreia intensos são motivo para procurar o médico

Fonte: Bula de Glifage® (Merck), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 10/06/2025

Metoclopramida (Plasil® (referência)). Antiemético e procinético (antagonista dopaminérgico). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Solução oral 1 mg/mL; gotas 4 mg/mL (21 gotas/mL); comprimido 10 mg conforme a bula do produto; injetável (uso hospitalar)

Indicações: Náusea, vômito e distúrbios de motilidade

Adulto: 10 mg 3 vezes ao dia, 10 minutos antes das refeições (10 mL da solução ou 53 gotas)

Criança: Apresentações do Plasil® são de uso adulto

Dose máxima: Conforme a bula do produto

Contraindicações: Hemorragia, obstrução ou perfuração digestiva; epilepsia; uso de fármacos extrapiramidais; feocromocitoma

Interações: Levodopa e agonistas dopaminérgicos; álcool e depressores do SNC; neurolépticos

Gestação e lactação: Pode ser considerada se necessário, com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Movimentos involuntários de face, pescoço ou olhos: suspender e procurar atendimento. Causa sonolência.

Fonte: Bula do Plasil® (Sanofi-Aventis), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Metronidazol (Flagyl® (referência)). Nitroimidazólico. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 250 mg (20) e 400 mg (24); suspensão de benzoilmetronidazol (Flagyl® Pediátrico); gel vaginal e injetável em outros registros

Indicações: Tricomoníase, vaginose bacteriana, giardíase, amebíase, infecções por anaeróbios

Adulto: Tricomoníase: 2 g dose única ou 400 mg de 12/12 h por 7 dias. Vaginose: 400 a 500 mg de 12/12 h por 7 dias. Giardíase: 250 mg de 8/8 h por 5 dias. Anaeróbios: 400 mg de 8/8 h por 7 dias

Criança: Preferir a suspensão de benzoilmetronidazol, com dose por peso conforme a bula do produto

Dose máxima: 2 g/dia (amebíase: 500 mg de 6/6 h)

Contraindicações: Alergia a metronidazol ou a outros imidazólicos

Interações: Álcool (reação tipo dissulfiram) durante e por no mínimo 1 dia após; dissulfiram; varfarina; lítio; ciclosporina; fenitoína

Gestação e lactação: Atravessa a placenta; avaliar com cuidado, só com orientação médica. Lactação: conforme a bula do produto

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Nada de bebida alcoólica no tratamento e por pelo menos 1 dia depois. Na tricomoníase, o parceiro também precisa tratar. A urina pode escurecer.

Fonte: Bula do Flagyl® comprimido (Sanofi Medley), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Miconazol (Vodol® (pele) e Daktarin® gel oral). Antifúngico imidazólico. *Isento de prescrição*

Apresentações: Creme, pó e aerossol 20 mg/g; suspensão tópica 20 mg/mL. Gel oral 20 mg/g (Daktarin®): venda sob prescrição

Indicações: Micoses de pele e frieira; gel oral: candidíase oral

Adulto: Pele: 2 vezes ao dia por cerca de 2 semanas (pés: 4 semanas). Gel oral: 2,5 mL 4 vezes ao dia

Criança: Gel oral de 6 a 24 meses: 1,25 mL 4 vezes ao dia, fracionado

Dose máxima: Não se aplica (tópico); gel oral conforme a bula

Contraindicações: Alergia a imidazólicos. Gel oral: menor de 6 meses, doença hepática, uso de fármacos que prolongam QT, ergot e algumas estatinas

Interações: Varfarina (pode aumentar o efeito, inclusive no uso tópico); gel oral: sinvastatina, lovastatina, midazolam oral, cisaprida

Gestação e lactação: Tópico sem problemas descritos; gel oral com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C; pó protegido da umidade

No balcão: Gel oral em bebê: aplicar em pequenas porções, longe da garganta; nunca no mamilo. Quem usa varfarina deve avisar o médico.

Fonte: Bulas do Vodol® (União Química) e do Daktarin® gel oral (Janssen-Cilag), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Montelucaste (Singulair® (referência)). Antagonista de receptor de leucotrienos. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 10 mg; comprimido mastigável 4 e 5 mg; granulado 4 mg (Baby)

Indicações: Asma (prevenção e manutenção) e rinite alérgica

Adulto: A partir de 15 anos: 10 mg 1 vez ao dia; na asma, ao anoitecer

Criança: 6 a 14 anos: 5 mg; 2 a 5 anos: 4 mg; 6 meses a 2 anos: granulado 4 mg; 1 vez ao dia

Dose máxima: 1 dose a cada 24 h

Contraindicações: Alergia aos componentes

Interações: Sem interações relevantes descritas na bula do paciente

Gestação e lactação: Consultar o médico na gestação e na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade; granulado preparado é para uso imediato

No balcão: Não trata a crise: manter o broncodilatador de resgate. Relatar ao médico mudanças de humor, sono ou comportamento.

Fonte: Bula do Singulair® (Organon), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Naproxeno (Flanax® (sódico, MIP) e Naprosyn® (prescrição)). AINE (derivado do ácido propiônico). *Isento de prescrição*

Apresentações: Naproxeno sódico 275 e 550 mg (Flanax®, MIP); naproxeno 250 e 500 mg (Naprosyn®, venda sob prescrição)

Indicações: Dor, febre, cólica menstrual; com prescrição, doenças reumáticas, gota e enxaqueca

Adulto: MIP: 275 mg 1 a 2 vezes ao dia ou 550 mg 1 vez ao dia. Prescrição (Naprosyn®): 500 mg e depois 250 mg a cada 6 a 8 h

Criança: Abaixo de 12 anos só com orientação médica

Dose máxima: 550 mg/dia sem prescrição; uso por até 10 dias

Contraindicações: Alergia a AINE ou AAS; úlcera ou sangramento digestivo; insuficiência cardíaca grave

Interações: Ciclosporina, lítio, metotrexato, outros AINE; pode reduzir o efeito antiplaquetário do AAS em dose baixa

Gestação e lactação: Não usar na gestação, salvo se extremamente necessário com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Meia-vida longa: não repetir antes do intervalo. Quem usa AAS infantil para o coração deve falar com o médico antes.

Fonte: Bulas do Flanax® e do Naprosyn® (Bayer), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Nimesulida (Nisulid® (referência)). AINE (sulfonanilida, preferencial COX-2). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 100 mg; comprimido para suspensão 100 mg; gotas 50 mg/mL

Indicações: Dor e inflamação agudas, febre

Adulto: 50 a 100 mg 2 vezes ao dia, após refeições, pelo menor tempo possível

Criança: Todas as apresentações do referência: uso acima de 12 anos

Dose máxima: 400 mg/dia (bula: até 200 mg 2 vezes ao dia em casos excepcionais)

Contraindicações: Alergia a AINE ou AAS; reação hepática prévia; insuficiência hepática; insuficiência renal grave; úlcera ativa; amamentação

Interações: Outros AINE; fármacos hepatotóxicos; álcool; anticoagulantes

Gestação e lactação: Sem dados adequados na gestação; contraindicada na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Não somar com outro anti-inflamatório. Procurar médico se surgir pele ou olhos amarelados, urina escura ou se a dor não melhorar em 5 dias.

Fonte: Bula do Nisulid® (Aché), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Nistatina (Micostatin® (referência)). Antifúngico poliênico. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Suspensão oral 100.000 UI/mL; creme vaginal 25.000 UI/g, 60 g com 14 aplicadores

Indicações: Candidíase oral e vaginal

Adulto: Oral: 1 a 6 mL 4 vezes ao dia, bochechar e engolir. Vaginal: 1 aplicador à noite por 14 dias

Criança: Lactente: 1 a 2 mL 4 vezes ao dia (metade em cada lado da boca); prematuro: 1 mL 4 vezes ao dia

Dose máxima: Conforme prescrição

Contraindicações: Alergia à nistatina; suspensão contém açúcar

Interações: Sem interações conhecidas

Gestação e lactação: Oral: segurança não estabelecida; vaginal: com orientação médica, sem pressionar o colo

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Manter 48 h após sumirem os sintomas. Creme vaginal pode danificar preservativo de látex.

Fonte: Bulas da nistatina suspensão oral (Prati-Donaduzzi, genérico) e do Micostatin® creme vaginal (Takeda), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Nitazoxanida (Annita® (referência)). Antiparasitário e antiviral (tiazolida). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 500 mg (6); pó para suspensão oral 20 mg/mL (45 ou 100 mL)

Indicações: Gastroenterite por rotavírus e norovírus; helmintíases, amebíase, giardíase, criptosporidíase e outras protozooses intestinais

Adulto: Acima de 12 anos: 500 mg de 12/12 h por 3 dias, com alimento

Criança: Acima de 1 ano: 7,5 mg/kg (0,375 mL/kg da suspensão) de 12/12 h por 3 dias, com alimento

Dose máxima: 1 g/dia (500 mg de 12/12 h)

Contraindicações: Doença hepática ou renal; alergia. Suspensão: menores de 1 ano. Comprimido: menores de 12 anos

Interações: Cautela com fármacos de alta ligação proteica, como varfarina e fenitoína

Gestação e lactação: Só se o benefício justificar, com orientação médica (vale também para a lactação)

Conservação: 15 a 30 °C, local seco. Suspensão preparada: até 7 dias, frasco bem fechado

No balcão: Tomar junto com alimento, que aumenta a absorção. Agitar a suspensão e medir com a seringa; descartar a sobra após 7 dias.

Fonte: Bula do Annita® (Farmoquímica), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da LMIP e da IN 360/2025

Nitrofurantoína (Macrodantina® (referência)). Nitrofurano (antisséptico urinário). *Retenção de receita*

Apresentações: Cápsula 100 mg (28, 40 ou 144)

Indicações: Infecção urinária baixa (cistite) por germes sensíveis; profilaxia de longo prazo a critério médico

Adulto: 100 mg de 6/6 h por 7 a 10 dias, com alimento; uso prolongado: 100 mg ao deitar

Dose máxima: 400 mg/dia (100 mg de 6/6 h)

Contraindicações: Alergia; anúria, oligúria ou comprometimento renal moderado a grave; gestação a termo (38 a 42 semanas); hepatopatia prévia pelo fármaco; menores de 1 mês

Interações: Antiácidos com trissilicato de magnésio (reduzem absorção); probenecida e sulfimpirazona; quinolonas urinárias; a bula orienta método de barreira com pílula anticoncepcional

Gestação e lactação: Segurança não estabelecida; contraindicada no fim da gestação. Lactação: avaliar risco e benefício

Conservação: 15 a 30 °C, protegida da luz

No balcão: Tomar com alimento para reduzir enjoo. A urina pode ficar amarelada. Tosse ou falta de ar durante o uso: avisar o médico.

Fonte: Bula da Macrodantina® (Brainfarma), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Omeprazol (Losec Mups® (referência)). Inibidor da bomba de prótons. *Isento de prescrição*

Apresentações: MIP: cápsula 20 mg, caixa de 7 ou 14, só para azia frequente (IN 404/2025). Losec Mups® 10 e 20 mg e demais indicações: venda sob prescrição

Indicações: MIP: azia e queimação 2 ou mais dias na semana. Com prescrição: úlcera, refluxo, esofagite, H. pylori

Adulto: MIP: 20 mg 1 vez ao dia em jejum por até 14 dias. Prescrição: 20 a 40 mg/dia

Criança: A partir de 1 ano, com prescrição: 10 a 20 kg, 10 mg; acima de 20 kg, 20 mg, 1 vez ao dia

Dose máxima: MIP: 20 mg/dia, 14 dias, novo ciclo só após 4 meses

Contraindicações: Alergia a omeprazol ou benzimidazóis

Interações: Clopidogrel, cetoconazol, itraconazol, varfarina, digoxina, diazepam, fenitoína, metotrexato, erva de São João

Gestação e lactação: Só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da umidade

No balcão: MIP: em jejum, pela manhã. Engolir inteiro; se precisar dispersar, água sem gás ou suco, nunca leite. Sinal de alarme: médico.

Fonte: Bula do Losec Mups® (Biopas), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; IN 404/2025 (LMIP)

Ondansetrona (Vonau Flash® e Zofran®). Antiemético (antagonista 5-HT3). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido de desintegração oral 4 e 8 mg; injetável 4 e 8 mg (uso hospitalar)

Indicações: Náusea e vômito, inclusive de quimioterapia e pós-operatório

Adulto: Conforme prescrição; quimioterapia moderada: 8 mg 2 vezes ao dia; alta: 24 mg dose única

Criança: 2 a 11 anos: 4 mg; acima de 11 anos: 4 a 8 mg

Dose máxima: Conforme a bula do produto e a indicação

Contraindicações: Uso de apomorfina; alergia aos componentes

Interações: Apomorfina (contraindicada); serotoninérgicos (síndrome serotoninérgica); reduz efeito do tramadol

Gestação e lactação: Evitar no 1º trimestre (malformação orofacial)

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Colocar o comprimido na língua com as mãos secas; dissolve sem água. Vômito com desidratação: soro oral e avaliação.

Fonte: Bulas do Vonau Flash® (Biolab) e do Zofran® (Novartis), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Oseltamivir (Tamiflu® (referência)). Antiviral (inibidor da neuraminidase). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Cápsula 30, 45 e 75 mg (10)

Indicações: Tratamento e profilaxia da gripe (influenza A e B)

Adulto: A partir de 13 anos: tratamento 75 mg de 12/12 h por 5 dias, iniciado nas primeiras 48 h; profilaxia: 75 mg 1 vez ao dia por 10 dias após contato

Criança: 1 a 12 anos, de 12/12 h por 5 dias: até 15 kg, 30 mg; 15 a 23 kg, 45 mg; 23 a 40 kg, 60 mg; acima de 40 kg, 75 mg (profilaxia: mesma dose 1 vez ao dia)

Dose máxima: Tratamento: 150 mg/dia (adulto)

Contraindicações: Alergia ao fosfato de oseltamivir ou a componente da fórmula

Interações: Sem interações relevantes descritas com paracetamol, AAS, antiácidos, varfarina ou anticoncepcional

Gestação e lactação: Dados observacionais indicam benefício na gestação, sem ajuste de dose; lactação: conforme avaliação médica

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Começar o quanto antes; tomar com alimento reduz enjoo. A cápsula pode ser aberta e misturada em pouco alimento doce. Comportamento estranho em criança: avisar o médico.

Fonte: Bula do Tamiflu® (Produtos Roche), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da IN 360/2025

Pantoprazol (Pantozol® (referência)). Inibidor da bomba de prótons. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido de liberação retardada 20 e 40 mg; injetável 40 mg

Indicações: Refluxo, esofagite, úlcera, H. pylori (com antibióticos)

Adulto: 20 a 40 mg 1 vez ao dia; esofagite leve 4 a 8 semanas

Criança: Acima de 5 anos: 15 a 40 kg, 20 mg; acima de 40 kg, 40 mg; até 8 semanas

Dose máxima: Conforme prescrição

Contraindicações: Alergia a benzimidazóis; 20 mg: menor de 5 anos

Interações: Reduz absorção de cetoconazol; uso prolongado reduz vitamina B12

Gestação e lactação: Só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Engolir inteiro, antes, durante ou após o café da manhã. Uso por mais de um ano: acompanhamento médico.

Fonte: Bula do Pantozol® (Takeda), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Paracetamol (Tylenol® (referência)). Analgésico e antitérmico (para-aminofenol). *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 500 e 750 mg; gotas 200 mg/mL; suspensão 100 mg/mL (bebê) e 32 mg/mL (criança)

Indicações: Dor leve a moderada e febre

Adulto: 500 a 1000 mg a cada 4 a 6 h (750 mg: 1 comprimido 3 a 5 vezes ao dia)

Criança: 10 a 15 mg/kg/dose a cada 4 a 6 h, até 5 doses/dia; abaixo de 11 kg ou 2 anos: médico

Dose máxima: 4000 mg/dia e no máximo 1000 mg por dose; criança até 75 mg/kg/dia

Contraindicações: Alergia ao paracetamol; cautela em hepatopatia e uso de álcool

Interações: Outros produtos com paracetamol (antigripais); varfarina; flucloxacilina

Gestação e lactação: Gestante ou lactante: consultar o médico antes do uso (bula)

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Somar todo paracetamol do dia, inclusive antigripais. Usar o dosador do próprio frasco: as concentrações pediátricas são diferentes.

Fonte: Bulas do Tylenol® Bebê e Criança (Janssen-Cilag) e do paracetamol 750 mg genérico (Sanofi Medley), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Paracetamol + codeína (Tylex® (referência)). Analgésico: para-aminofenol + opioide fraco. *Controle especial · A2 (adendo: codeína até 100 mg por unidade em Receita de Controle Especial, retida)*

Apresentações: Comprimido 500 mg + 7,5 mg ou 500 mg + 30 mg de fosfato de codeína

Indicações: Dor moderada a intensa

Adulto: 1 comprimido a cada 4 h; dor mais intensa: 2 comprimidos a cada 6 h

Criança: Contraindicado abaixo de 12 anos para dor; abaixo de 18 anos após amigdalectomia ou adenoidectomia

Dose máxima: 8 comprimidos/dia (codeína 240 mg; paracetamol 4000 mg)

Contraindicações: Alergia aos componentes; metabolizador ultrarrápido de CYP2D6; amamentação

Interações: Depressores do SNC, benzodiazepínicos, álcool, outros opioides; inibidores de CYP2D6; outros produtos com paracetamol

Gestação e lactação: Evitar na gestação salvo benefício claro; contraindicado na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Retenção da receita. Não tomar outro remédio com paracetamol. Sonolência extrema ou respiração lenta: procurar atendimento.

Fonte: Bula do Tylex® (Cellera), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; Portaria SVS/MS 344/1998, lista A2 e adendos

---

Prednisolona (Predsim® e Prelone®). Corticoide sistêmico (glicocorticoide). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 5, 10, 20 e 40 mg; solução oral 3 mg/mL; gotas 11 mg/mL

Indicações: Doenças alérgicas, inflamatórias, respiratórias e outras, conforme prescrição

Adulto: 5 a 60 mg/dia, conforme a doença

Criança: 0,14 a 2 mg/kg/dia (ou 4 a 60 mg/m²/dia), em 1 a 4 tomadas

Dose máxima: Conforme prescrição; a bula não fixa teto único

Contraindicações: Infecção fúngica sistêmica; infecção não controlada; alergia aos componentes

Interações: Indutores enzimáticos; AINE; diuréticos; antidiabéticos; vacinas de vírus vivo em dose imunossupressora

Gestação e lactação: Só com orientação médica; cautela na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Na solução oral, 1 mL contém 3 mg; nas gotas, 11 mg/mL. Conferir a concentração e usar a pipeta da caixa.

Fonte: Bulas do Predsim® (Cosmed/Brainfarma) e do Prelone® (Aché), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Prednisona (Meticorten® (referência)). Corticoide sistêmico (glicocorticoide). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 5 e 20 mg

Indicações: Doenças alérgicas, inflamatórias, reumáticas, respiratórias e outras, conforme prescrição

Adulto: 5 a 60 mg/dia, pela manhã, conforme a doença

Criança: 0,14 a 2 mg/kg/dia (ou 4 a 60 mg/m²/dia), conforme a doença

Dose máxima: Conforme prescrição; a bula não fixa teto único

Contraindicações: Infecção fúngica sistêmica; alergia a corticoides

Interações: Fenobarbital, fenitoína, rifampicina (reduzem efeito); AINE e álcool (úlcera); diuréticos que espoliam potássio; antidiabéticos; anticoagulantes

Gestação e lactação: Só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Tomar pela manhã, com um pouco de líquido. Uso por mais de alguns dias não pode ser parado de repente: a retirada é gradual.

Fonte: Bula do Meticorten® (Organon), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Pregabalina (Lyrica®). Anticonvulsivante análogo do GABA (ligante alfa-2-delta). *Controle especial · C1*

Apresentações: Cápsulas 25 mg, 75 mg e 150 mg

Indicações: Dor neuropática; fibromialgia; ansiedade generalizada; epilepsia (crises parciais, adjuvante)

Adulto: Início 75 mg 2 vezes ao dia; após 3 a 7 dias, 150 mg 2 vezes ao dia; aumentos conforme resposta. Insuficiência renal: reduzir (início pode ser 25 mg)

Dose máxima: 600 mg/dia (dor neuropática, ansiedade, epilepsia); 450 mg/dia (fibromialgia)

Contraindicações: Alergia ao fármaco

Interações: Opioides (oxicodona), álcool e benzodiazepínicos (lorazepam): sedação, depressão respiratória. Com opioide, constipação e obstrução intestinal

Gestação e lactação: Evitar na gestação (defeitos congênitos no 1º trimestre); mulher fértil deve usar contracepção. Não recomendada na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias, retida. Causa tontura e sonolência; cuidado ao dirigir. Para parar, reduzir em pelo menos 1 semana, com o médico

Fonte: Bula de Lyrica® (Viatris), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 02/05/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Propranolol (Genéricos e similares (bula consultada: Propranolol FURP)). Betabloqueador não seletivo. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos de cloridrato de propranolol (bula consultada: 40 mg); outras dosagens conforme o fabricante

Indicações: Hipertensão; angina; arritmias; profilaxia de enxaqueca; tremor essencial; ansiedade com sintomas físicos; tireotoxicose; cardiomiopatia hipertrófica

Adulto: Hipertensão: 80 mg 2 vezes ao dia; usual 160 a 320 mg/dia. Enxaqueca, ansiedade e tremor: 40 mg 2 a 3 vezes ao dia; usual 80 a 160 mg/dia

Criança: Arritmias e tireotoxicose: 0,25 a 0,5 mg/kg 3 a 4 vezes ao dia. Enxaqueca abaixo de 12 anos: 20 mg 2 a 3 vezes ao dia

Dose máxima: Hipertensão 640 mg/dia; angina 480 mg/dia; enxaqueca 240 mg/dia; ansiedade e tremor 160 mg/dia

Contraindicações: Asma ou broncoespasmo; bradicardia; hipotensão; bloqueio AV de 2º ou 3º grau; insuficiência cardíaca descompensada; angina de Prinzmetal; choque; doença arterial periférica grave; jejum prolongado e tendência à hipoglicemia

Interações: Insulina e antidiabéticos: mascara e prolonga a hipoglicemia. Verapamil e diltiazem: bradicardia. Clonidina: rebote. Ergotamina: vasoconstrição. AINE: menos efeito. Colírio betabloqueador: efeito somado

Gestação e lactação: Só se essencial na gestação. Passa ao leite; amamentação não recomendada pela bula

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Não suspender de repente. Asmático com chiado após começar o remédio deve procurar o médico. Pode causar mãos frias e cansaço

Fonte: Bula de Propranolol FURP (Fundação para o Remédio Popular), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Quetiapina (Seroquel®, Seroquel® XRO). Antipsicótico atípico. *Controle especial · C1*

Apresentações: Comprimidos revestidos 25 mg, 100 mg e 200 mg; liberação prolongada (XRO) 50 mg, 200 mg e 300 mg

Indicações: Esquizofrenia; mania e depressão do transtorno bipolar; manutenção do bipolar; XRO também como adjuvante na depressão maior

Adulto: Esquizofrenia: 50, 100, 200 e 300 mg nos dias 1 a 4 (2 tomadas), depois 300 a 450 mg/dia (faixa 150 a 750). Depressão bipolar: 50 a 300 mg à noite em 4 dias, até 600 mg

Criança: Esquizofrenia (13 a 17 anos) e mania (10 a 17 anos): titulação de 50 até 400 mg em 5 dias; faixa 400 a 800 mg/dia (esquizofrenia) ou 400 a 600 mg/dia (mania)

Dose máxima: Esquizofrenia 750 mg/dia (adulto); mania 800 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco; síndrome do QT longo ou arritmia prévia; amamentação; má absorção de glicose-galactose

Interações: Cetoconazol, macrolídeos e inibidores de protease: mais quetiapina. Carbamazepina, fenitoína, rifampicina e barbitúricos: menos efeito. Fármacos que prolongam o QT. Álcool e sedativos: sonolência

Gestação e lactação: Sintomas de abstinência no recém-nascido se usada no fim da gestação. Contraindicada na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias, retida. Causa sono e tontura ao levantar; levantar devagar. O XRO não pode ser partido nem mastigado

Fonte: Bula de Seroquel® (AstraZeneca, registro Pharlab), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 22/07/2026. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Rivaroxabana (Xarelto®). Anticoagulante oral inibidor direto do fator Xa. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 2,5 mg, 10 mg, 15 mg e 20 mg

Indicações: Prevenção de AVC na fibrilação atrial não valvar; tratamento e prevenção de recorrência de TVP e embolia pulmonar; prevenção de TEV após artroplastia; 2,5 mg com AAS na doença coronariana ou arterial periférica

Adulto: Fibrilação atrial: 20 mg 1 vez ao dia (15 mg se a função renal estiver reduzida). TVP/TEP: 15 mg 2 vezes ao dia por 3 semanas, depois 20 mg 1 vez ao dia. 15 mg e 20 mg sempre com alimento

Dose máxima: 20 mg/dia na fibrilação atrial (30 mg/dia só nas 3 semanas iniciais de TVP/TEP)

Contraindicações: Sangramento ativo; lesão com alto risco de sangramento; uso com outro anticoagulante (exceto na troca); doença hepática com coagulopatia; gestação e amamentação

Interações: Cetoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, ritonavir, claritromicina: mais efeito. AAS, AINE, clopidogrel, ISRS e IRSN: sangramento. Rifampicina, carbamazepina, fenitoína e erva-de-são-joão podem reduzir o efeito

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação e na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, na embalagem original

No balcão: As doses de 15 mg e 20 mg precisam ser tomadas com comida, senão a absorção cai. Não usar AAS ou anti-inflamatório por conta própria. Avisar dentista e médico antes de procedimentos

Fonte: Bula de Xarelto® (Bayer), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 11/06/2025

Rosuvastatina (Crestor®). Estatina (inibidor da HMG-CoA redutase). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 5 mg, 10 mg, 20 mg e 40 mg

Indicações: Hipercolesterolemia, dislipidemia mista, hipertrigliceridemia; redução de risco cardiovascular

Adulto: Início usual 10 mg 1 vez ao dia (5 mg em populações especiais; 20 mg em hipercolesterolemia grave). Faixa 10 a 40 mg/dia; ajustes a cada 2 a 4 semanas

Criança: Hipercolesterolemia familiar heterozigótica: 6 a 9 anos, 5 a 10 mg/dia; 10 a 17 anos, 5 a 20 mg/dia

Dose máxima: 40 mg/dia; 10 mg/dia na insuficiência renal grave

Contraindicações: Doença hepática ativa; insuficiência hepática ou renal (conforme a bula); gestação ou mulher fértil sem contracepção; amamentação

Interações: Ciclosporina: evitar. Genfibrozila, inibidores de protease (lopinavir, ritonavir), febuxostate: mais rosuvastatina. Varfarina e ticagrelor: cautela (conferir RNI)

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação e na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da umidade

No balcão: Engolir inteiro, 1 vez ao dia, em qualquer horário fixo. Dor muscular sem causa deve ser relatada ao médico

Fonte: Bula de Crestor® (AstraZeneca), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Sais para reidratação oral (Hidrafix® e envelopes de SRO). Repositor hidroeletrolítico. *Isento de prescrição*

Apresentações: Envelope de pó para diluir em 1 L (fórmula do Ministério da Saúde); solução concentrada em flaconete de 25 mL para 250 mL (Hidrafix®)

Indicações: Prevenção e tratamento da desidratação por diarreia e vômito

Adulto: Após cada evacuação, a quantidade que aceitar (Plano A); desidratação: Plano B no serviço de saúde

Criança: Após cada evacuação: menor de 1 ano, 50 a 100 mL; 1 a 10 anos, 100 a 200 mL; maior de 10 anos, o que aceitar

Dose máxima: Plano B, no serviço de saúde: 50 a 100 mL/kg em 4 a 6 h, como orientação inicial (cartaz do MS)

Contraindicações: Íleo paralítico, obstrução ou perfuração intestinal, vômitos muito intensos

Interações: Sem interações descritas

Gestação e lactação: Gestante: com orientação médica (bula); manter o aleitamento da criança nos intervalos

Conservação: Pó e flaconete: 15 a 30 °C; solução preparada conforme a bula do produto

No balcão: Diluir exatamente no volume indicado, com água filtrada ou fervida. Sinais de perigo: vômitos repetidos, sangue nas fezes, pouca urina, muita sede.

Fonte: Bula do Hidrafix® (Takeda), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; Ministério da Saúde, cartaz Manejo do paciente com diarreia (BVS)

Salbutamol (aerossol) (Aerolin® spray (referência)). Broncodilatador beta-2 agonista de curta ação. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Aerossol 100 mcg/dose, 200 doses; também xarope 2 mg/5 mL e comprimidos 2 e 4 mg

Indicações: Alívio e prevenção do broncoespasmo na asma e na DPOC

Adulto: Crise: 100 a 200 mcg (1 a 2 jatos); antes do exercício: 200 mcg

Criança: 100 mcg (1 jato), podendo ir a 200 mcg; antes do exercício 100 mcg

Dose máxima: Até 200 mcg 4 vezes ao dia; não exceder 4 usos por dia

Contraindicações: Alergia ao salbutamol ou componentes

Interações: Betabloqueadores não seletivos (propranolol)

Gestação e lactação: Só se o benefício superar o risco; não recomendado na amamentação pela bula

Conservação: 15 a 30 °C, longe do sol e do congelamento; frasco pressurizado, não furar nem expor acima de 50 °C

No balcão: Agitar, expirar, disparar no início da inspiração e prender o ar; usar espaçador quando indicado. Precisar de mais jatos que o habitual é sinal de piora.

Fonte: Bula do Aerolin® (GlaxoSmithKline), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Semaglutida (Ozempic® (injetável); também Wegovy® e Rybelsus®). Agonista do receptor de GLP-1. *Retenção de receita*

Apresentações: Ozempic®: caneta com 1,34 mg/mL que libera doses de 0,25 mg e 0,5 mg (1,5 mL) ou de 1 mg (3 mL); outras marcas e doses conforme a bula do produto

Indicações: Ozempic®: diabetes tipo 2. Outras marcas de semaglutida têm indicações próprias, como obesidade

Adulto: Ozempic®: 0,25 mg 1 vez por semana por 4 semanas, depois 0,5 mg 1 vez por semana; pode subir para 1 mg semanal. Subcutânea, mesmo dia da semana, qualquer hora

Dose máxima: 1 mg/semana na bula consultada do Ozempic®; outras apresentações conforme a bula do produto

Contraindicações: Alergia à semaglutida ou a componente

Interações: Insulina e sulfonilureias: hipoglicemia (pode ser preciso reduzir a dose). Varfarina: monitorar RNI

Gestação e lactação: Não usar na gestação; suspender pelo menos 2 meses antes de gravidez planejada. Não usar na amamentação

Conservação: Antes de abrir: geladeira, 2 a 8 °C, sem congelar. Em uso: abaixo de 30 °C ou na geladeira, tampada, por até 6 semanas. Congelada: descartar

No balcão: Receita em 2 vias, com retenção e escrituração no SNGPC; validade de 90 dias (RDC 471/2021 com redação da RDC 973/2025; IN 360/2025). Náusea é comum no início. Usar agulha nova a cada aplicação e conferir a dose no contador

Fonte: Bula de Ozempic® (Novo Nordisk), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 27/07/2026; regime de venda: RDC 471/2021 (redação da RDC 973/2025) e IN 360/2025, art. 2º

Sertralina (Zoloft®). Antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS). *Controle especial · C1*

Apresentações: Comprimidos revestidos 50 mg e 100 mg

Indicações: Depressão; transtorno obsessivo-compulsivo; transtorno do pânico; estresse pós-traumático; fobia social; transtorno disfórico pré-menstrual

Adulto: Dose única diária, manhã ou noite. Depressão e TOC: em geral 50 mg/dia; pânico, estresse pós-traumático e fobia social: 25 mg/dia na 1ª semana, depois 50 mg. Ajustes até 200 mg/dia

Criança: TOC: 6 a 12 anos, início 25 mg/dia; a partir de 13 anos, 50 mg/dia

Dose máxima: 200 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco; uso de IMAO; uso de pimozida

Interações: IMAO, linezolida, azul de metileno: síndrome serotoninérgica (respeitar intervalo). Tramadol, triptanos e outros serotoninérgicos: mesmo risco. AAS, AINE e varfarina: sangramento

Gestação e lactação: Na gestação e na amamentação, só com orientação médica

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias, retida. O efeito antidepressivo leva semanas; náusea e insônia iniciais costumam passar. Não suspender de repente

Fonte: Bula de Zoloft® (Viatris), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Sildenafila (Viagra® (referência)). Inibidor da fosfodiesterase 5. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 25 mg e 100 mg (4); 50 mg (1, 2, 4 ou 8)

Indicações: Disfunção erétil

Adulto: 50 mg cerca de 1 h antes da relação; ajustar para 25 ou 100 mg conforme resposta. Ritonavir: no máximo 25 mg em 48 h. Insuficiência renal grave ou hepática, ou inibidor do CYP3A4: iniciar com 25 mg

Dose máxima: 100 mg por dia, 1 vez ao dia

Contraindicações: Uso de nitratos ou doadores de óxido nítrico em qualquer forma; riociguate; mulheres; menores de 18 anos

Interações: Nitratos (hipotensão grave); alfabloqueadores como doxazosina (hipotensão); cetoconazol, itraconazol, eritromicina, ritonavir, saquinavir e cimetidina aumentam níveis

Gestação e lactação: Não indicado para mulheres

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Perguntar sempre por remédio de angina (isossorbida, nitroglicerina). Ereção persistente e dolorosa exige atendimento de urgência.

Fonte: Bula do Viagra® (Mylan/Viatris), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de jun. 2025)

Simeticona (Luftal® (referência)). Antiflatulento. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 40 mg; gotas 75 mg/mL

Indicações: Gases e distensão abdominal

Adulto: 40 mg 3 vezes ao dia com as refeições, ou 13 gotas 3 vezes ao dia

Criança: Lactente: 3 a 5 gotas 3 vezes ao dia; até 12 anos: 5 a 10 gotas 3 vezes ao dia

Dose máxima: 500 mg/dia (12 comprimidos)

Contraindicações: Distensão ou cólica grave, dor por mais de 36 h, massa abdominal, suspeita de obstrução

Interações: Pode reduzir a absorção da levotiroxina

Gestação e lactação: Só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Não age sobre dor de outra causa. Dor que persiste mais de 36 h: médico.

Fonte: Bula do Luftal® (Reckitt Benckiser), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Sinvastatina (Zocor®). Estatina (inibidor da HMG-CoA redutase). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 10 mg, 20 mg, 40 mg e 80 mg

Indicações: Hipercolesterolemia; redução de risco cardiovascular

Adulto: 20 a 40 mg 1 vez ao dia, à noite. A dose de 80 mg não deve ser iniciada; fica só para quem já a usa há 12 meses ou mais sem lesão muscular

Dose máxima: 40 mg/dia para quem inicia (80 mg só nos casos acima)

Contraindicações: Doença hepática ativa; gestação e amamentação; uso com itraconazol, cetoconazol, posaconazol, voriconazol, inibidores de protease do HIV, eritromicina, claritromicina, nefazodona, cobicistate, genfibrozila, ciclosporina ou danazol

Interações: Além das contraindicações: amiodarona, verapamil, diltiazem, anlodipino e fibratos aumentam o risco de miopatia. Varfarina: conferir RNI

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação (pode causar malformação) e na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Tomar à noite. Dor ou fraqueza muscular sem explicação, com urina escura, deve ser comunicada ao médico logo. Antibiótico novo (claritromicina, eritromicina) ou antifúngico oral exige conferir interação

Fonte: Bula de Zocor® (MSD), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 21/05/2024

Sitagliptina (Januvia®). Inibidor da DPP-4 (gliptina). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações: Diabetes tipo 2

Adulto: 100 mg 1 vez ao dia, com ou sem alimento. Insuficiência renal: 50 mg/dia (moderada) ou 25 mg/dia (grave ou diálise)

Dose máxima: 100 mg/dia

Contraindicações: Alergia a qualquer componente

Interações: Poucas interações relevantes. Com sulfonilureia ou insulina, risco de hipoglicemia

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação nem na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Dose única diária. Dor abdominal forte e persistente, com ou sem vômito, deve ser avaliada pelo médico (pancreatite é rara)

Fonte: Bula de Januvia® (MSD), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Succinato de metoprolol (Selozok®). Betabloqueador cardiosseletivo de liberação controlada. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos de liberação controlada 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações: Hipertensão; angina; insuficiência cardíaca crônica; arritmias; após infarto; profilaxia de enxaqueca

Adulto: Hipertensão: 50 mg 1 vez ao dia, até 100 a 200 mg. Insuficiência cardíaca: 25 mg/dia por 2 semanas (12,5 mg em classe III a IV), dobrando a cada 2 semanas até 200 mg/dia ou a dose tolerada

Dose máxima: 200 mg/dia

Contraindicações: Bloqueio AV de 2º ou 3º grau; insuficiência cardíaca instável; bradicardia relevante; doença do nó sinusal sem marca-passo; choque cardiogênico; arteriopatia periférica grave

Interações: Verapamil e diltiazem: bradicardia. Clonidina: não suspender um dos dois sem orientação. Amiodarona, quinidina, antidepressivos (fluoxetina, paroxetina) e outros inibidores do CYP2D6: mais efeito. Álcool: mais metoprolol no sangue

Gestação e lactação: Não usar na gestação nem na lactação, salvo se essencial

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Dose única diária, com ou sem comida. O comprimido pode ser partido no sulco, mas não mastigado nem triturado. Não confundir com tartarato de metoprolol, que é de liberação imediata

Fonte: Bula de Selozok® (AstraZeneca), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Sulfadiazina de prata (Dermazine® (referência)). Antimicrobiano tópico (sulfonamida). *Retenção de receita*

Apresentações: Creme 10 mg/g (1%), bisnagas de 15, 30, 50 e 100 g

Indicações: Prevenção e tratamento de infecção em queimaduras e feridas

Adulto: Camada sobre a ferida limpa, 1 vez ao dia (2 vezes se muito exsudativa), coberta com gaze, até cicatrizar

Criança: A partir de 2 meses; contraindicada em prematuro

Dose máxima: Não se aplica (tópico)

Contraindicações: Alergia a sulfas; final da gestação; prematuro e menor de 2 meses; não recomendada na amamentação

Interações: Inativa colagenase; cimetidina (leucopenia descrita)

Gestação e lactação: Contraindicada no último trimestre; não recomendada na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade; pode escurecer sem perder segurança

No balcão: Retenção da receita (RDC 471/2021). Não aplicar perto dos olhos. Queimadura extensa, em face, mãos ou genitais: serviço de saúde.

Fonte: Bula do Dermazine® (Cristália), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; RDC 471/2021 e IN 360/2025

Sulfametoxazol + trimetoprima (Bactrim® e Bactrim® F (referência)). Sulfonamida associada a inibidor da di-hidrofolato redutase. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 400 mg + 80 mg (20) e F 800 mg + 160 mg (10); suspensão 200 mg + 40 mg/5 mL (50 ou 100 mL) e F 400 mg + 80 mg/5 mL (100 mL)

Indicações: Infecções urinárias, respiratórias, gastrointestinais e de pele por germes sensíveis; esquemas especiais a critério médico

Adulto: A partir de 12 anos: 800 mg + 160 mg (1 comprimido F ou 2 simples) de 12/12 h, após refeição; tratamento prolongado: metade

Criança: 6 semanas a 5 meses: 2,5 mL da suspensão simples de 12/12 h; 6 meses a 5 anos: 5 mL; 6 a 12 anos: 10 mL (cerca de 30 mg + 6 mg/kg/dia)

Dose máxima: Casos graves: 1.200 mg + 240 mg de 12/12 h (3 comprimidos simples ou 1 e meio F)

Contraindicações: Alergia a sulfonamidas ou trimetoprima; doença hepática ou renal grave; uso com dofetilida; suspensão: prematuros e menores de 6 semanas

Interações: Varfarina, metotrexato, fenitoína, antidiabéticos orais, ciclosporina, digoxina, diuréticos, pirimetamina, amantadina, memantina

Gestação e lactação: Só com orientação médica. Lactação: passa ao leite; evitar salvo orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C (comprimido e suspensão)

No balcão: Tomar após a refeição com bastante líquido, pela manhã e à noite. Manchas, bolhas ou feridas na boca: suspender e procurar atendimento no mesmo dia.

Fonte: Bula do Bactrim® (Farmoquímica), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Sulfato ferroso (Genéricos e similares (sem referência única)). Sal de ferro (antianêmico). *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido revestido com 60 mg de ferro elementar; gotas 25 mg de ferro/mL (1 gota = 1 mg); xarope 10 mg de ferro/mL

Indicações: Prevenção e tratamento da anemia por deficiência de ferro (dieta, gestação, perdas)

Adulto: 1 comprimido (60 mg de ferro) ao dia, 1 h antes ou 2 h depois das refeições; gotas: até 65 gotas ao dia; xarope: 5 mL ao dia

Criança: Gotas: 2 gotas/kg/dia; teto de 15 gotas/dia no lactente e 50 gotas/dia na criança. Xarope acima de 25 kg: 5 mL ao dia

Dose máxima: Conforme a apresentação e a prescrição; tetos pediátricos acima

Contraindicações: Anemias sem deficiência de ferro (hemolítica, falciforme, por chumbo); talassemia; hemocromatose e hemossiderose; hepatopatia aguda; diarreia crônica e retocolite

Interações: Antiácidos e cálcio reduzem a absorção; reduz o efeito de tetraciclina oral e penicilina; quinolonas também precisam de intervalo (ver bula delas)

Gestação e lactação: Categoria A; sem restrição na gestação e lactação com a posologia correta

Conservação: Temperatura ambiente, conforme a bula do produto

No balcão: Fezes escuras são efeito conhecido. Tomar longe de leite e antiácido; se o estômago reclamar, ajustar o horário com o prescritor. Guardar longe de crianças: intoxicação por ferro é grave.

Fonte: Bula de sulfato ferroso (genérico, comprimido, gotas e xarope), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de 2020); enquadramento conforme o módulo de MIP (notificação simplificada)

Tadalafila (Cialis® (referência)). Inibidor da fosfodiesterase 5. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 20 mg (1, 2, 4 ou 8); 5 mg para uso diário em genéricos e outras marcas

Indicações: Disfunção erétil; 5 mg diário também para sintomas da hiperplasia prostática benigna

Adulto: Sob demanda: até 20 mg antes da relação, efeito de 30 min até 36 h. Uso diário: 5 mg 1 vez ao dia, no mesmo horário

Dose máxima: 20 mg/dia, no máximo 1 vez ao dia

Contraindicações: Uso de nitratos (isossorbida, nitroglicerina, propatilnitrato); alergia; uso diário não recomendado na insuficiência renal grave

Interações: Nitratos; alfabloqueadores (doxazosina aumentou a queda de pressão); antifúngicos azólicos e antirretrovirais aumentam níveis; rifampicina reduz; álcool em excesso: tontura e hipotensão postural

Gestação e lactação: Não indicado para mulheres

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz, do calor e da umidade

No balcão: Tomar com ou sem alimento. O efeito longo não autoriza nova dose no mesmo dia. Conferir uso de nitrato antes de dispensar.

Fonte: Bula do Cialis® (Eli Lilly do Brasil) e de tadalafila 5 mg (genérico), reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de 2024 e abr. 2025)

Tansulosina (Secotex® (referência)). Alfabloqueador uroseletivo. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido de liberação prolongada 0,4 mg (30); genéricos em cápsula 0,4 mg

Indicações: Sintomas urinários da hiperplasia prostática benigna

Adulto: 0,4 mg 1 vez ao dia, com ou sem alimento, engolido inteiro

Dose máxima: 0,4 mg/dia (bula do Secotex®)

Contraindicações: Alergia; história de hipotensão ortostática; insuficiência hepática grave; uso com inibidor potente do CYP3A4 (ex.: cetoconazol)

Interações: Cetoconazol (contraindicado); eritromicina e outros inibidores moderados (cautela); outros alfabloqueadores e inibidores da PDE5 (hipotensão)

Gestação e lactação: Não indicado para mulheres

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Não partir nem mastigar. Levantar devagar da cama e da cadeira; tontura ao ficar em pé pede sentar ou deitar. Pode alterar a ejaculação.

Fonte: Bula do Secotex® (Boehringer Ingelheim do Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de maio 2024)

Tramadol (Tramal® (referência)). Analgésico opioide (agonista fraco com ação serotoninérgica e noradrenérgica). *Controle especial · A2 (adendo: até 100 mg por unidade em Receita de Controle Especial, retida)*

Apresentações: Cápsula 50 mg; gotas 100 mg/mL; injetável 50 mg/mL (ampolas de 1 e 2 mL)

Indicações: Dor moderada a grave

Adulto: Acima de 12 anos: 50 a 100 mg por dose (1 a 2 cápsulas ou 20 a 40 gotas); efeito de 4 a 8 h

Criança: A partir de 1 ano (gotas): 1 a 2 mg/kg por dose (4 a 8 gotas por 10 kg)

Dose máxima: 400 mg/dia; criança 8 mg/kg/dia ou 400 mg, o que for menor

Contraindicações: Intoxicação por álcool, hipnóticos ou outros psicotrópicos; IMAO nos últimos 14 dias; epilepsia não controlada; substituto na abstinência de opioides

Interações: IMAO, ISRS e outros serotoninérgicos; benzodiazepínicos, álcool e outros opioides; carbamazepina e ondansetrona reduzem o efeito

Gestação e lactação: Uso crônico na gestação pode causar abstinência no recém-nascido; consultar o médico

Conservação: 15 a 30 °C; gotas válidas por 6 meses após abertas

No balcão: Retenção da receita. Orientar sonolência, náusea e constipação; nunca associar álcool ou calmantes sem o médico saber.

Fonte: Bula do Tramal® (Grünenthal), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; Portaria SVS/MS 344/1998, lista A2 e adendos

---

Valaciclovir (Valtrex® (referência)). Antiviral (pró-fármaco do aciclovir). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 500 mg (10 ou 42)

Indicações: Herpes-zóster, herpes simples (tratamento e supressão), prevenção de CMV após transplante

Adulto: Zóster: 1 g de 8/8 h por 7 dias. Herpes simples: 500 mg de 12/12 h por 3 a 5 dias (episódio inicial, 5 a 10 dias). Herpes labial: 2 g de 12/12 h por 1 dia. Supressão: 500 mg 1 vez ao dia

Criança: A partir de 12 anos, dose de adulto para herpes simples

Dose máxima: Zóster: 3 g/dia; CMV pós-transplante: 8 g/dia

Contraindicações: Alergia a valaciclovir ou aciclovir

Interações: Cimetidina e probenecida (sem ajuste necessário pela bula); micofenolato; outros fármacos nefrotóxicos ou de eliminação renal

Gestação e lactação: Dados limitados; só se o benefício justificar, com orientação médica (vale também para a lactação)

Conservação: 15 a 30 °C, na embalagem original

No balcão: Iniciar nos primeiros sintomas e manter boa hidratação. Na insuficiência renal, a dose é menor: conferir a receita de idosos.

Fonte: Bula do Valtrex® (GlaxoSmithKline Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da IN 360/2025

Varfarina (Marevan®). Anticoagulante oral antagonista da vitamina K. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 2,5 mg, 5 mg e 7,5 mg (varfarina sódica)

Indicações: Prevenção e tratamento de trombose venosa e embolia pulmonar; prevenção de embolia na fibrilação atrial e em próteses valvares

Adulto: Início com 2,5 a 5 mg/dia; manutenção usual 2,5 a 10 mg/dia, sempre ajustada pelo TP/RNI

Contraindicações: Gestação; sangramento ativo; 24 horas antes ou depois de cirurgia ou parto; aborto incompleto; doença hepática ou renal grave; hipertensão grave não controlada; endocardite bacteriana; aneurisma cerebral ou aórtico; hemofilia; úlcera digestiva ativa

Interações: Aumentam o efeito: AAS e AINE, amiodarona, fluconazol, miconazol, metronidazol, sulfametoxazol-trimetoprima, ciprofloxacino, eritromicina. Diminuem: vitamina K, inclusive de saladas verdes. Qualquer remédio novo, inclusive de venda livre, exige conferir com o médico

Gestação e lactação: Contraindicada (teratogênica). Não foi detectada no leite; bebê amamentado deve ser observado quanto a manchas e sangramentos

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da umidade, na embalagem original

No balcão: Fazer o exame de RNI nas datas marcadas. Manter a alimentação estável, sem mudanças bruscas no consumo de verduras. Para dor, evitar AAS e anti-inflamatórios; sangramento de gengiva, urina escura ou manchas roxas devem ser avisados ao médico

Fonte: Bula de Marevan® (Farmoquímica), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Zolpidem (Stilnox®, Stilnox® CR). Hipnótico não benzodiazepínico (agonista do receptor GABA-A). *Controle especial · B1*

Apresentações: Comprimidos revestidos 10 mg; liberação prolongada (CR) 6,25 mg e 12,5 mg; outras formas conforme o fabricante

Indicações: Tratamento de curta duração da insônia

Adulto: 10 mg (ou 12,5 mg CR) imediatamente antes de deitar, dose única, sem repetir na mesma noite. Acima de 65 anos ou debilitado: 5 mg (ou 6,25 mg CR)

Dose máxima: 10 mg/dia (liberação imediata); 12,5 mg/dia (CR)

Contraindicações: Alergia ao fármaco; insuficiência respiratória grave ou aguda; insuficiência hepática grave; comportamento complexo do sono prévio; menor de 18 anos

Interações: Álcool, opioides, benzodiazepínicos, antidepressivos sedativos, antipsicóticos e anti-histamínicos: sedação e depressão respiratória

Gestação e lactação: Não recomendado na gestação; afeta o recém-nascido se usado no fim. Evitar na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C; comprimido de 10 mg protegido da luz e da umidade

No balcão: Desde agosto de 2024 exige Notificação de Receita B (azul) em qualquer dose. Tomar já deitado e reservar 7 a 8 horas para dormir. Tratamento curto, em geral até 4 semanas; relatar sonambulismo ao médico

Fonte: Bula de Stilnox® (Sanofi Medley), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 28/05/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026), sem adendo para o zolpidem

---

Anatomia de uma bula

Parte	Bula do paciente	Bula do profissional
Identificação	Nome comercial, DCB, apresentações, via, USO ADULTO/PEDIÁTRICO, composição	Igual
Indicação	1. Para que este medicamento é indicado?	1. Indicações
Eficácia e mecanismo	2. Como este medicamento funciona?	2. Resultados de eficácia; 3. Características farmacológicas
Quem não pode usar	3. Quando não devo usar este medicamento?	4. Contraindicações
Cuidados	4. O que devo saber antes de usar este medicamento?	5. Advertências e precauções; 6. Interações medicamentosas
Guarda	5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar?	7. Cuidados de armazenamento
Dose	6. Como devo usar este medicamento?	8. Posologia e modo de usar
Dose esquecida	7. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar?	Dentro do item 8, quando houver
Efeitos adversos	8. Quais os males que este medicamento pode me causar?	9. Reações adversas (por frequência)
Superdose	9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior?	10. Superdose
Dizeres legais	Registro MS, farmacêutico responsável, empresa, CNPJ, SAC, restrição de venda	Igual

Fonte: RDC 47/2009, Anexo I. A bula do paciente não tem os itens de eficácia nem de farmacologia detalhada; a do profissional não tem a pergunta da dose esquecida como item próprio.

Onde está na bula o que o cliente pergunta

Pergunta do cliente	Bula do paciente	Bula do profissional	Embalagem
Serve para o meu problema?	Item 1	1. Indicações	MIP: indicações na caixa
Quanto e de quanto em quanto tempo?	Item 6	8. Posologia e modo de usar	Não
Qual o máximo por dia?	Item 6	8. Posologia (dose máxima)	Não
Posso dar para criança de 2 anos?	Identificação e item 3	Identificação e 8. Posologia	USO ADULTO/PEDIÁTRICO na frente
Posso tomar com meu remédio de pressão?	Item 4	6. Interações medicamentosas	Não
Estou grávida ou amamentando	Itens 3 e 4	5. Advertências e precauções	Às vezes, em frase de alerta
Tomo antes ou depois de comer?	Item 6	8. Posologia e modo de usar	Não
Esqueci a dose, e agora?	Item 7	8. Posologia, quando houver	Não
Isso que senti é do remédio?	Item 8	9. Reações adversas	Não
Meu filho tomou o frasco todo	Item 9	10. Superdose	SAC nos dizeres legais
Guardo na geladeira?	Item 5	7. Cuidados de armazenamento	Lateral: conservação
Quanto tempo dura depois de aberto?	Item 5	7. Cuidados de armazenamento	Às vezes, na lateral
Precisa de receita?	Dizeres legais	Dizeres legais	Faixa e frase de venda na frente
Esse genérico é igual ao outro?	Identificação	Identificação	Faixa amarela; frase do similar intercambiável na bula

Itens da bula conforme RDC 47/2009, Anexo I; embalagem conforme RDC 768/2022, arts. 3º e 5º.

Gotas por mL e concentração nas bulas conferidas

Produto	Concentração	Gotas por mL	Dose usual em gotas (bula)
Novalgina® gotas	500 mg/mL	20	Adulto: 20 a 40 gotas até 4 vezes ao dia
Buscopan® gotas	10 mg/mL	20	Lactente: 10 gotas (5 mg) 3 vezes ao dia
Plasil® gotas	4 mg/mL	21	Adulto: 53 gotas 3 vezes ao dia
Digesan® gotas	4 mg/mL	24	1 a 2 gotas/kg 3 vezes ao dia
Tramal® gotas	100 mg/mL	40 (20 gotas = 50 mg)	Adulto: 20 a 40 gotas por dose
Mucosolvan® gotas	7,5 mg/mL	25 (1 mL = 25 gotas)	2 a 5 anos: 25 gotas 3 vezes ao dia

Valores de cada produto de marca; genéricos e similares podem ter conta-gotas diferente. Conferir sempre na bula do produto entregue.

Orientação a partir da bula

- ◯ Conferir nome, concentração e forma farmacêutica da caixa com a receita ou o pedido
- ◯ Conferir a restrição de idade na face frontal
- ◯ Conferir a frase de venda e se há retenção de receita
- ◯ Confirmar lote e validade, que cubra todo o tratamento
- ◯ Ler o item de posologia da bula do produto entregue, não de outro fabricante
- ◯ Transformar o intervalo em horários reais e escrever na caixa
- ◯ Informar a dose máxima diária e o intervalo mínimo entre doses
- ◯ Explicar a relação com alimentos e com outros medicamentos
- ◯ Mostrar o dosador correto e quantas gotas ou mL por dose
- ◯ Orientar a conservação e o prazo depois de aberto
- ◯ Explicar o que fazer se esquecer uma dose, conforme o item 7
- ◯ Citar os sinais de reação adversa que exigem suspender e procurar atendimento

- ◯ Perguntar sobre gestação, amamentação e outros medicamentos em uso
- ◯ Pedir que o paciente repita como vai tomar

SOS Farmácia Comercial

Cliente volta com problema após usar o medicamento

Cliente relata problema com medicamento comprado ou usado

DECISÃO

Há sinal de gravidade (falta de ar, inchaço de face, bolhas, sangramento, sonolência extrema)?

SIM
Encaminhar de imediato ao serviço de urgência e notificar depois

NÃO
Seguir a avaliação no balcão

DECISÃO

O problema é no corpo da pessoa ou no produto?

SIM
No corpo: suspeita de evento adverso

NÃO
No produto: suspeita de queixa técnica

Evento adverso: conferir na bula se é reação descrita, frequência e conduta

Orientar suspender ou manter conforme o caso e contatar o prescritor

Notificar no VigiMed: paciente, medicamento, lote, evento, datas e desfecho

Queixa técnica: recolher a unidade, guardar embalagem e bula, anotar lote e validade

ATENÇÃO

Separar do estoque as unidades do mesmo lote

Notificar no Notivisa e informar o SAC do fabricante

Registrar a ocorrência no arquivo da farmácia

Cartões: bula, embalagem e bulário

Pergunta	Resposta
Norma que define forma e conteúdo das bulas?	RDC 47/2009, com alterações das RDC 406/2020, 769/2022 e 831/2023.
Quantas perguntas fixas tem a bula do paciente?	Nove, da indicação à superdose.
Em que item da bula do profissional está a dose máxima?	Item 8, Posologia e modo de usar.
Onde a bula do paciente responde sobre dose esquecida?	Pergunta 7.
O que é bula padrão?	Texto modelo para harmonizar bulas; para genéricos e similares, é a bula do referência (RDC 47/2009, art. 4º, VII).
O que mudou com a RDC 831/2023?	Bulas de genérico e similar podem diferir da bula padrão, conforme o registro de cada produto.
O que é a RDC 885/2024?	Projeto-piloto de bula digital; a bula impressa continua garantida a quem pedir.
Prazo para a empresa enviar bula em formato especial?	Até 10 dias úteis após o pedido (RDC 47/2009, art. 41).
Norma vigente de rotulagem de medicamentos?	RDC 768/2022, que revogou a RDC 71/2009.
Frase que identifica o similar intercambiável na bula?	MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA (RDC 58/2014).
O que anotar ao trocar o referência pelo genérico?	A substituição na receita, com carimbo, nome, CRF, data e assinatura (RDC 16/2007, item 2.2).
Sistema para evento adverso a medicamento?	VigiMed.
Sistema para queixa técnica (desvio de qualidade, falsificação)?	Notivisa.
Base legal do dever de notificar do farmacêutico?	Lei 13.021/2014, art. 13, I.
Prazo de uso do Fluimucil® xarope depois de aberto?	14 dias.

Questões: bula, embalagem e farmacovigilância

1. Cliente esqueceu a dose da manhã de um medicamento novo e pergunta o que fazer. Em qual parte da bula do paciente está a orientação específica do produto?

A Pergunta 4: o que devo saber antes de usar

B Pergunta 6: como devo usar este medicamento

C Pergunta 7: o que fazer quando me esquecer

D Pergunta 8: quais os males que pode causar

E Dizeres legais, junto do telefone do SAC

2. Para confirmar a dose máxima diária de ibuprofeno em gotas para uma criança, a fonte mais adequada é:

A o item 8 da bula do profissional do produto dispensado

B a bula do paciente de outro fabricante, já aberta na tela

C a lista de isentos de prescrição, que fixa a dose diária

D a face frontal da embalagem secundária do produto

E o item 2 da bula do profissional, resultados de eficácia

3. Sobre a bula de um medicamento genérico, assinale a correta.

A Deve repetir a do referência palavra por palavra, sempre

B Pode diferir da bula padrão no que o registro aprovou

C Dispensa a lista de excipientes, iguais aos do referência

D É dispensada quando o referência já está no Bulário

E Só entra no Bulário se o genérico não tiver referência

4. Receita de Zyrtec® 10 mg, sem restrição à troca. O cliente pede o genérico. Qual conduta atende à regulamentação?

A Dispensar um similar qualquer, mais barato, sem anotar nada

B Recusar a troca, pois a receita usa o nome de marca

C Dispensar o genérico e anotar a troca, com carimbo e assinatura

D Dispensar o genérico e reter a receita na farmácia

E Dispensar o genérico só após falar com o prescritor

5. Qual frase identifica, na bula, um similar cuja intercambialidade com o referência foi aprovada pela Anvisa?

A Medicamento genérico, Lei nº 9.787, de 1999

B Venda sob prescrição médica, com retenção

C Siga corretamente o modo de usar o produto

D Similar equivalente ao medicamento de referência

E Só pode ser vendido com retenção da receita

6. Atendente encontra duas caixas de desloratadina: uma com a frase de isento de prescrição e outra, do Desalex®, com faixa vermelha. Como proceder?

A Vender as duas sem receita, pois a substância é isenta

B Exigir receita das duas, pois uma delas tem faixa vermelha

C Seguir a categoria impressa na embalagem de cada produto

D Reter a receita apresentada para a compra do Desalex®

E Retirar o Desalex® da venda por rotulagem irregular

7. Na rotulagem vigente de medicamentos (RDC 768/2022), lote, data de fabricação e validade devem constar:

A apenas no texto da bula impressa

B apenas no blíster ou no rótulo do frasco

C somente no código de barras da caixa

D só nos produtos de venda sob prescrição

E nas faces do cartucho, com registro e SAC

8. Mãe relata que a filha de 3 anos ficou com o pescoço torto e os olhos virados depois de tomar gotas de metoclopramida, frasco com USO ADULTO, compradas em outro lugar. A conduta inicial do farmacêutico é:

A dar mais uma dose para aliviar o vômito que persiste

B encaminhar já à urgência e depois notificar no VigiMed

C trocar o frasco por bromoprida em gotas pediátricas

D notificar queixa técnica no Notivisa e liberar a criança

E orientar soro oral e observação da criança em casa

9. Cliente devolve uma caixa de comprimidos manchados e esfarelados, dentro da validade. Qual a conduta correta?

A Descartar a caixa e trocar por outra do mesmo lote

B Notificar no VigiMed como reação adversa ao produto

C Separar o lote e notificar queixa técnica no Notivisa

D Orientar o uso dos comprimidos inteiros que restaram

E Devolver o dinheiro e encerrar o atendimento ali

10. Paciente vai usar budesonida + formoterol spray pela primeira vez. Qual orientação está de acordo com a bula do Symbicort® Spray?

A Guardar o inalador na geladeira depois de aberto

B Usar em até 3 meses após abrir o invólucro de alumínio

C Usar só nas crises, como resgate, sem uso diário

D Furar o frasco no fim para aproveitar o que sobrou

E Guardar o inalador com o bocal voltado para cima

SOS Farmácia Comercial

Gabarito comentado

1. **C**. A RDC 47/2009 (Anexo I) fixa a pergunta 7 para a dose esquecida. A 4 trata de precauções e interações, a 6 de posologia, a 8 de reações adversas, e os dizeres legais trazem registro, empresa e SAC.
2. **A**. A posologia e os tetos estão no item 8 (Posologia e modo de usar) da bula do profissional (RDC 47/2009). A concentração e o conta-gotas variam entre produtos, por isso vale a bula do produto entregue. A LMIP fixa concentração e indicação, não dose; a face frontal não traz posologia; o item 2 traz estudos.
3. **B**. A RDC 831/2023 alterou o art. 14 da RDC 47/2009 e permitiu diferenças em relação à bula padrão quando houver características aprovadas no registro. Excipientes podem variar e devem constar da identificação; toda bula de medicamento comercializado é publicada no Bulário.
4. **C**. A RDC 16/2007 (Anexo, itens 2.1, 2.2 e 2.4) permite a troca pelo genérico, salvo restrição expressa do prescritor, com registro na receita (carimbo, nome, CRF, data e assinatura) e orientação. Similar só substitui o referência se for intercambiável e listado (RDC 58/2014). Cetirizina não exige retenção.
5. **D**. A RDC 58/2014 prevê a publicação dos similares intercambiáveis, e a frase MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA aparece na Identificação do Medicamento da bula. A frase da Lei 9.787 é do genérico; as demais tratam de categoria de venda e de MIP.
6. **C**. A categoria de venda pertence ao registro. A LMIP (IN 285/2024 com redação da IN 404/2025) inclui a desloratadina, mas a bula do Desalex® consultada ainda traz venda sob prescrição; vale a frase da embalagem (RDC 768/2022). Anti-histamínico não tem retenção e a faixa não indica irregularidade.
7. **E**. O art. 5º da RDC 768/2022 lista, para as demais faces do cartucho, lote, fabricação e validade, registro, empresa, CNPJ, SAC e conservação. A exigência vale para todas as categorias de venda.
8. **B**. Movimentos involuntários sugerem reação extrapiramidal, sinal de gravidade que exige atendimento imediato. A suspeita de evento adverso vai ao VigiMed; o Notivisa recebe queixas técnicas. A bula do Plasil® restringe as apresentações ao uso adulto; trocar por outro antagonista dopaminérgico repetiria o risco.
9. **C**. Desvio de qualidade é queixa técnica, notificada no Notivisa, com a unidade, a embalagem e os dados de lote preservados e o mesmo lote separado do estoque. O VigiMed recebe eventos adversos. Descartar sem registro impede a investigação; a Lei 13.021/2014 (art. 13, I) impõe o dever de notificar.
10. **B**. A bula do Symbicort® Spray manda usar em até 3 meses após abrir o invólucro e conservar a 15 a 30 °C com o bocal para baixo. É tratamento de manutenção, de uso diário, e o enxágue da boca após o uso reduz candidíase oral.