

Paciente:  
MANUEL NAFATE GUZMAN

Edad:  
76 años 7 meses y 7 días

Fecha:  
15/04/2022

## Historia Clínica

### Antecedentes Heredofamiliares

Padre finado desconoce causa

Hijo finado por accidente automovilístico

### Personales no Patológicos

Lugar de Origen: Nuevo Mexico,  
municipio de villaflores  
Estado civil: Casado  
Religion: Catolico  
Escolaridad: 6 primaria

Lugar de Residencia: Nuevo  
Mexico, municipio de villaflores  
Ocupación: Agricultor  
Grupo Sanguineo: O +

Alcoholismo: Negados  
Actividad Fisica: Ninguna  
Nombre de la Pareja: Elizabeth  
Hernandez Lopez

Toxicomanias: Negados  
Inmunizaciones: Completas  
Comentarios:

### Personales Patológicos

Enfermedades:

Hipertension arterial tratado con losartan 50 mgrs al dia

Hiperplasia prostática benigna tratada con Tamsulosina tabs de 0.4 mgrs 1 tab por las mañanas

Insomnio tratado Clonazepam tabs de 2 mgrs, media tab por las noches

IRC tratado con alfacetoanalogos de aminoacidos 1-1-1

Diabetes negado

Infecciosos:

Negados

Tumorales:

Cancer renal derecho hace 7 años

Traumáticos:

Negados

Quirúrgicos:

Nefrectomía derecha por cancer renal etapa 1 hace 7 años

### Padecimiento Actual

Se encuentra asintomático, refiere disminución importante de la audición y de la agudeza visual

### Exploración Física

TA: 140-75

FC: 75

FR: 18

Peso (KG): 76

Exploración Física:

Talla (Cm): 156

IMC: 31.23

Temp: 36.5

Estudios de Laboratorio y Gabinete:

Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, peristalsis normal. No cuenta con estudios de laboratorio y gabinete recientes.

## Diagnóstico

Insuficiencia renal cronica

Hipertension arterial sistematica controlada con medicamentos

Hiperplasia ptostatica benigna tratada con medicamentos

Nefrectomia renal derecha por cancer renal etapa I desde hace 7 años

## Tratamiento

Medicamentosos.

1. Alfacetoanalogos de aminoacidos 1-1-1
2. Losartan tabs de 50 mgrs, tomar 1 tab por las mañanas
3. Tamdulosina tabs de 0.4 mgrs, tomar 1 tab al dia
4. Clonazepam tabs de 2mgrs, tomar media tab por las noches

No medicamentos.

1. Disminuir la ingesta de carnes
2. Disminuir la ingesta de liquidos por las noches
3. Caminar 30 minutos todos los dias
4. No ingerir bebida alcoholicas

Estudios:

Realizar biometria hematica completa, quimica sanguinea de 32 elementos, antígeno prostático específico total y fracción libre, examen general de orina

Ultrasonido abdominopelvico