



NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"
Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán.
nafate@ablacioncancer.com
Cel:(999)244-12-12

Paciente:

PATRICIA RAMIREZ VEGA

Edad:

45 años

F.N.:

21/08/1978

Fecha:

29/05/2024

Liberan (simeticona) iniciar 3 días antes del procedimiento

Tomar 1 tableta con el desayuno, almuerzo y cena

Hemosin-K oral (iniciar 3 días antes)

1 tableta c/6 hrs, suspender hasta que se indique

Dicynone caps 500 mgrs (iniciar 3 días antes)

1 caps c/6 hrs, suspender hasta que se indique

Cefalexina caps 500 mgrs (iniciar 1 día antes)

1 c/8 hrs por 10 días

Clindamicina caps 300 mgrs (iniciar 1 día antes)

1 c/8 hrs por 10 días

Levofloxacino tabs 500 mgrs (iniciar 1 día antes)

1 c/12 hrs por 10 días



NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"
Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán.
nafate@ablacioncancer.com
[Cel:\(999\)244-12-12](tel:(999)244-12-12)

Deflazacort tabs 30 mgrs (iniciar 3 días antes)

Tomar media tab al día por 10 días

Cita: (not set) **Hora :**